

ANTONII DE HAEN

*Consiliarii Aulici, ac Medicinæ Practicæ, in
Alma ac Antiquissima Universitate Vin-
dobonensi, Professoris Primarii,*

PARS UNDECIMA

RATIONIS MEDENDI

I N

NOSOCOMIO PRACTICO
VINDOBONENSI.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud PETRUM VAN DER EYK,

M D C C L X V I I.

1767

1871

1871

1871

1871

1871

1871

E L E N C H U S C A P I T U M.

C A P U T X I I I.

De Febris intermittentibus. Pag. 295

C A P U T X I V.

De Morbis acutis. 335

C A P U T X V.

De Ileo Morbo. 352


C A P U T X V I.

De Vario Hydrope. 389


C A P U T X V I I.

Anatomica quædam, & Tabularum explicatio. 449

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library



RATIO MEDENDI IN NOSOCOMIO PRACTICO VINDOBONENSI.



CAPUT XIII.

De Febris Intermittentibus.

§. I. II. III. *Febres Intermittentes tres pertinaces, quarum prima, alteraque, quodam Decocto curatae, sine Cortice Kina; tertia partim eodem, partim Cortice. De triplice tumorum genere, quos febres intermittentes generare solent. De abusu evacuantium remedium in genere tertio tumorum horum. Duæ Crises indurationis, in Hypochondrio sinistro, per naris sinistrae Haemorrhagiam; imperfectiores tamen, & cum alia crisi metastatica junctæ. Trium harum febrium posterior, tertiana primum fuit, dein quotidiana, ad tertiam usque vicem recidiva. Quædam de incertitudine determinandi naturam febris, a priore ejusdem paroxysmo. Calor naturali calore major in frigore febrili, cum algore, & universi corporis concussione. Intermittentium quandoque æstus major, quam Acutorum. Suspecta crisis, quæ per extrema manuum pedumque fit. Kina nonnunquam parva dosi rebellem febrem curat, reseratque certo sensu Obstructiones.* §. IV. *Omnes notæ febrium*

intermittentium Methodi recensentur, omniaque auxilia, quæ, ab omni ævo, a Medicis, Empiricisque, ad nostra usque tempora, ad febris hujus curam adhibita sunt. Si qua forte remedia desint, hæc postea facile suas erunt ad classes, hic expositas, referenda. Epicrisis ad singulam methodum.

§. I. **M**ultiplices adeo sunt, quas Nosocomium, quasque nonnunquam quidam extra Nosocomium casus suppeditant, observationes, ut quid feligam ex illis, quid ordine prius, quid posterius referam, hæream anceps. Exordium tandem hoc anno a Febribus intermittentibus capere visum fuit, 1^{mo}. quia hæ Febres multam sibi vendicant praxeos partem. 2^{do}. Quia præcedentibus hujus operis tomis rarius egi de illis. 3^{tio}. Quia difficilis sæpe earum Medicina est. Tandem 4^{to}. quia video juniores Medicos, quantiscunque meritis lauream Apollineam adeptos, sæpe vacillantes; & an ne forsitan vulgi Febrifuga, Agyrtarumque Arcana, Methodicæ curæ, quam in schola Medica didicerant, præferenda non forent, anxia mente perquirentes. His universis de causis primum nonnullas intermittentes Febres pertinaciores, symptomatibusve graviores, enarrabo; & adjuncta, quam singulis adhibui, methodo medendi, cunctas deinceps medendi methodos ad suas quasque classes referam, & exponam.

Vir quadragenarius, hortulanus, anno 1765. febre intermittente autumnali laboravit; a primo in alterum paroxysmum quartana, deinceps vero per mediam hyemem usque tertiana. Die 23. Jan. 1766. me convenit, adhuc tertianarius. Molestum patiebatur a febre aurium susurrum, ventris superioris pondus, viriumque defectum. Tempus febrim abigendi ratus, corticem peruvianum non dedi protinus,

nus, sed decoctum admodum solvens, quo & febrim, & febris tollere effectus possem. Formulam adscribam, cum postmodum sæpius ejusdem mentio habenda sit. *Rad. Gram. Taraxaci* ā. *Lib. jβ. minutissime conscissa, & diu tusa, coque aqua pura bihorio: Colaturæ prælo fortiter expressæ Libr. iij. adde: Oxymell. simpl. Libr. β. sal. polychr. dr. vj. Unciam sumat quovis bihorio.*

Siluit ad hæc febris. At vero tinnitus aurium continuabat, tumor sinistri Hypochondrii dolebat, tussisque matutina vexabat. Iteravi decoctum, jusque bis die ventrem, maxime qua durum, fricaret ante fornacem, unguento composito ex *Ung. martiato & Oleo laurin. ā. unc. j.*

Elapsis abinde quinque diebus, antiquas querelas renovavit, febre omnino liber. Indicationi relictæ morbificæ in corpore materiæ satisfactorius, repetivi eadem remedia: sed tormina ventris accesserant molestia. Suspecta hæc sæpe hic. *Citesius, Cabagne-sius, Sennertus*, ex intermittentibus sic natam vident Colicam *Piætonum*. Consilio *Baglivii* diuturno florum *Chamomillæ* infuso hæc divici.

Continuatis sedulo his omnibus, materia febrilis a sede, quam in Hypochondrio sinistro occupaverat, & ex ventre, quem universum torminibus vexaverat, subduxit sese, collumque undique deturpavit tuberculis. Sponte hæc evanuerunt. Mox vero furunculi varias obsident corporis plagas.

Sed aliud quid contigerat notabile. Tumor sinistri hypochondrii remisit quidem, collo sensim tumente; at simul larga admodum *naris sinistræ* hæmorrhagia accessit.

An descripta hæc sæpius ab *Hippocrate* crisis Splenis infarcti? videtur; sed multiplex hic morbi universi crisis: & quidem Splenis, Hæmorrhagia sinistræ

stræ naris; totius autem materiæ morbificæ, tumoribus colli, & furunculis.

Triplicis generis tumorum, febre intermittente oriundorum, naturam distinguimus. Primum genus eorum, qui in ventre, nec raro in hypochondrio lævo, nascuntur: nullius illi discriminis; imo ejus genii potius, ut eosdem exoptaret *Sydenham*. Sic enim agens de Febr. interm. Ann. 1661. 1664.

„ Observatu non indignum est, inquit, quod cum
 „ febres autumnales *teneram ætatem* diu cruciarint
 „ nulla spes sit easdem abigendi, donec Abdominis
 „ regio, circa Lienem præcipue, indurari atque
 „ tumefieri occeperit: iisdem enim gradibus, quibus
 „ hoc symptoma supervenerit, Febris etiam fugam
 „ meditatur. Neque ex meliore aliquo Prognostico
 „ morbum hunc brevi abiturum dixeris, quam si sedula
 „ animadversione suboriri hoc symptoma perspexeris. *Idem porro in Crurum tumoribus
 „ obtinet, qui in adultis aliquando spectantur.*

Hoc sic se habere, ut *Sydenham* monuit, quivis experiuntur Practici; quodque de tenera ætate, quoad ventris tumorem scribit, & adulta habet ætas; sed crurum œdema frequentius. Vix curamus hæc; utpote aut sponte ad reditum virium, aut levi frictione, disparentia.

Alterum tumorum genus est, quo vir noster laborabat; quippe quod viscera vel thoracis, vel ventris, altis infarcit obstructionibus: quibus debellandis multo sæpe labore, multoque est opus tempore: præcipue quando Icterus, quando Hydrops, quando Rachitis, adjunxerit sese. Huc mirifice eam curam, quæ viro huic adhibita est, conferre, experientia plurima constat. Quod si oppilatione viscerum maximam partem soluta, superstes ægrum debilitas tenet, Aquæ Marte divites, Mars ipse, ejusque

que varia præparata, Cortex Cascariglias, Peruvianus, Tamariscus, & quæcunque alia ex ditissima *Boerhaviana* classe secundi generis cardiacorum petuntur, hanc debilitatem emendant: potissimum si aer, si regimen, si corporis motus, si frictiones, eundem collineant in scopum.

Tertium tumorum ejusmodi genus illud est, quod neglectis in principio febribus, natisve a febre obstructionibus, materiam irresolubilem, tam alte infixam in visceribus, habet, ut in scirrhus hæc canculosque abeant; ut Icterus niger, isque irresolubilis, nascatur; ut Hydrops sive simpliciter Ascites, sive Cysticus, adjungat se: unde demum ab intermittente febre via ad lentam sternitur, calamitosamque sæpe mortem.

Hoc in statu nihil vitam, tolerabiliorem alias, diuturnioremque, reddere calamitosiorem, breviorumque consuevit, quam multus evacuantium usus. Vel enim nihil, vel parum, vel multum, operabuntur. Si multum, vires prorsum demunt, quandoque in indomabilem causam non agunt; interea dum humores minus pravorum, qui vitam sustentassent, attenuando corrumpant. Si vix, aut nihil, hæc remedia evacuent, dissolvunt humores tamen, causamque hydropis adaugent. Cap. XIV. luculento exemplo hoc confirmabitur.

§. II. Anni 1765. Dec. 3. juvenem 18. ann. suscepimus intra Nosocomium, cujus en historiam. Improbo labore dimidii anni, victu autem miserrimo, incidit demum in febrim quotidianam, cujus id singulare, quod frigus 12. ferme horas duraret, tumque demum ardor subsequeretur & cephalalgia.

Hanc febrim octiduo passus, narrat se septies sursum, quaterque deorsum, ab assumpto Emetico, multa ejecisse, nono morbi die venam sectam esse,

nariumque subsecutam hæmorrhagiam ; omnia autem citra vel minimum morbi levamen.

Die 15. morbi libra sesquialtera vini, aqua commisti, pota, frigus febrile domari conatus, incidit mox in Dyfenteriam quatuor dierum : qua Rhabarbaro cessante, æstus immoderatus frigoris loco experiebatur.

Suscepto in Nosocomio valida febris advertebatur, pulsus durus, anxium pectus, cephalalgia vehemens, calor 103. graduum in Thermometro *Fahrenheitiano*. Unde sanguinis uncia X. de brachio dextroeductæ sunt. Moxque densam crustam sanguis utroque formavit in vasculo. Febris vere Paracraftica, quarto exinde die, sine spectabili aut perturbatione critica, aut evacuatione, sic cessavit, ut diu post levis febricula superesset, dolorque in lævo hypochondrio multum vexaret. Antiphlogisticæ methodo Febris acuta cesserat.

Ab 8. Dec. ad 11. admodum vibrans in pulsu motus observatur, cum Hæmorrhagia unciarum duarum, naris quidem utriusque, sed sinistra potissimum, mane; vespere denuo solius naris sinistra, sesquiunciae. Pulsus Dicrotus, *Solano* narium hæmorrhagiæ index, observabatur nunquam; sed, ut monui, pulsus mire vibrans, nunc utroque in carpo, nunc in alterutro magis, integro biduo fere.

Critica igitur solutio, ut in priore ægro, ita & in hocce, animadversa est, ast imperfecta: cessavit namque lateris sinistri dolor post hæmorrhagiam narium, potissimumque sinistra; at vero ex hoc tempore querelæ perpetuæ exaudiuntur doloris in hypochondrio dextro, qui ad noctem ingravesceret, junctumque sibi molestum haberet ardorem. Dolor porro iste, ardorque, ad finem mensis usque, regularem paroxysmum 3. 4. horarum quavis nocte observarunt.

Remedia hoc tempore mutari sæpius oportuit. Antacida quandoque danda erant, quod manifestum Ventriculus testaretur acorem: nonnunquam antihelminthica, quod vermium præsentiam cum pessimus juvenis victus, tum præsentia quædam Vermium Symptomata, innuerent. Nulli tamen prodierunt.

Nec dolorem ardoremque varii generis Epithemata, Cataplasmata, Unguenta, Emplastra, vel hylum temperarunt. Bilis autem defectum, obstructionemve, quam alba atque argillacea excrementa indicabant, sapo venetus cum Aloës tantillo, paucorum spatio dierum emendavit.

Anno 1766. a 1. Jan. ad 13. usque, cepit pomeridiano tempore frigere, horæ, bihorii, ultraque spatium, rarissime notabili aliquo subsequente calore. Sic ut ob paroxysmum mediam post noctem, huncque pomeridianum, Febris esset quotidiana duplicata. Cortex necessario nunc indicatus, appetitum restituit quidem, diurnumque paroxysmum fregit, æ vero nocturnum minime; qui constanter frigore bihorii, calore, ardore, dolore dextri hypochondrii, per aliud bihorium vexabat. Fracto quinimo diurno per corticem peruvianum insultu, lenta febricula, magna cum inquietudine, successit.

Interim quam demum morbi sedem figeremus, anticipites fluctuabamur. Hepar affectum esse, cum indicare locus, tum alba argillacea excrementa innuere poterant; at bilis restituta functione, nihil eo in loco mutatum fuit. Ventriculus acore affectus videri poterat, vermibusque venter; sed idonea ad hæc remedia incassum data erant. Et ut symptomata nos de sede naturaque morbi certiores non fecerant, multo adhuc minus viscerum situs: quem adeo varium, adeo sæpe alterum pro altero collocatum, olim deprehenderamus, ut convicti essemus,

nos in viuo homine situm viscerum sæpius non, nisi conjecturando, assequi. Id saltem patebat, juvenem duram suam, ac miserabilem vitam, impune non gessisse; gravemque atque pertinacem in eo latere, quæ miram hanc febrem aleret, ingeminaretque, adesse originem.

Quapropter die 16. Jan. cepi ipsi dare Decoctum saturatissimum graminis, &c. ut ægro priori; Epigastriumque bis die inungi, ac fricari curavi, unguento quod ex ung. Arthanitæ & Martiato à unc. j. Gumm. ammon. aceto soluti dr. iiij. compositum erat. Quod unicum remedium internum externumque, diutissime autem continuatum, frigus nocturnum alterna primum nocte, tandem integrum, superavit; paulatimque primo dolorem, postmodum ardorem, fugavit. Sub hac cura rediit adhuc album atque argillaceum excrementum; continuato tamen remedio brevi evanidum; cum alvo tandem terna quaternaue singulo die, torminosa sæpe, nunc liquidiore, nunc compactiore, semper autem flava, pulcre curatus est; sic ut 15. Febr. ædes maternas repeteret, Decoctoque ibidem per Mensem adhuc usus, firma atque robusta valetudine frueretur.

§. III. Rusticus 18. annorum, gracilis, temperamenti biliosi, in pueritia tussi convulsiva, diuturna admodum, male habuerat; exinde vero sanissimus, corpus jam ante ætatem obfirmatum, atque induratum, rustico labore, habebat. Medio Junio proxime elapso, febre tertiana sic corripì cepérat, ut priores tres paroxysmos hora 9. matutina experiretur, reliquos quinque ad 3. in aurora. Frigus 3. aut 4. imo semel 6. horas, cum sensu interni externique algoris, universique corporis concussione durabat; calor molestus, haud vehemens tamen, simile fere temporis spatium emetiebatur. Unicum vero symptoma, toto tempore febris, valida scilicet

ac sicca tussis, frigoris æque quam caloris tempore, vexabat ægrum: cæterum nulla unquam cephalalgia, nullæ nausæ, vomitusque, non ventris tormina, nec ullum consuetum febrium intermittentium symptoma, affuerunt. Febris vero paroxysmo absoluto, Cephalalgia oboritur, quam in noctem usque patitur, si lecto inhæreat; brevi vero amittit, si exsurgat. Absoluto paroxysmo, mox fames adest, & urget; totoque die intercalari sanissimus, summo cum appetitu comedit, digerit, & naturaliter quotidie egerit.

Rogatus nullisne esset medicamentis usus, respondit pulverem a Chirurgo datum in primo paroxysmo fuisse, qui nihil operaretur: die autem post primum paroxysmum libero electuarius sumfisse, quod bis vomitum, bis movisset alvum. Tandem, sexto paroxysmo ingruente, a vetula spiritus vini haustum, multo cum pipere, propinatum esse, cum ea tantum mutatione, ut frigus pro more adestet, ei-que solito intensior calor succederet, septimus autem & octavus paroxysmus more solito pergerent.

Sanus autem, si quis unquam, se nobis stitit altera ab octavo insultu die, petiturus auxilium. Ipso autem hoc die hora matutina nona, ea scilicet hora, qua tres priores paroxysmi adorti erant, febris rediit; ab eodemque die, eadem præter propter hora, quotidie adfuit: sic ut 9. Julii, dum suo de pago rediisset, eundem in ipso *nono* quotidianæ febris insultu videremus. Insultus porro hi nullo modo differrebant ab iis tertianæ; tussis in utrisque molesta, cum absentia quorumvis aliorum febris symptomatum, cum Cephalalgia post absolutam febrim, quæ pro more jacenti diu perstabat, surgenti vero exulabat brevi; cum appetitu mox a febre valido. Unica tamen hæc observata disparitas, quod licet in utraque fere æquale esset caloris frigorisque tempus,

tempus tamen durationis universi paroxysmi febris quotidianæ dimidium tantum esset ejus, quod tertianæ expleverat paroxysmus. His bene consideratis, febrim in quotidiana æque diuturnam patiebatur, sed jam in duas divisam: in tertiana octo horarum, horarum quatuor in quotidiana.

Hic attente omnia consideranda sunt. Quæret forte quispiam an, a datis ad tertianam remediis, tertiana in quotidianam transierit? Sciat autem is quotidianæ paroxysmum jam adfuisse, antequam misturam diluentem, atque attenuantem quam ad tertianam dederam, degustasset. Hanc ille posthac in quotidiana, post paroxysmum, sine ulla morbi mutatione assumsit.

De industria noto quosvis hujus quotidianæ febris paroxysmos eorum simillimos fuisse, qui febrim tertianam constituissent; eo quod Medici nimis universaliter videantur differentias, ut vocant, essentielles, inter utriusque hujus intermittentis febris paroxysmos, agnoscere. Notavi pariter horas invasionis singuli paroxysmi utraque in febre; quia etiam justo generalior est eorum assertio, qua ab ipsius primi paroxysmi invasionis hora, dieique tempore, internosci doceant, cujusnam generis intermittentis futura hæc febris sit. At vero nos & in hoc juvene, & in innumeris aliis, talem observavimus horum signorum inconstantiam, ut lex firma ex ejusmodi observatis condi nequeat: sed de hac quæstione postea latius.

Juvenem tunc in Nosocomio detinui, usque ad Augusti finem: sic ut quæ nunc enarrabuntur, sub nostro contigerint conspectu.

Quotidiana hæc febris novem consuetos paroxysmos absolvit; in decimo vix levem percepit admonitionem æger.

Observavimus *momento* ante paroxysmum nonum,
&

& levem illum decimum, juvenem cum pulsu lento, pleno, forti, pancratice valentem: frigoris invadentis momento eundem concuti, deque viscerum suorum conquerentem algore. Solus apex nasi, non lobi aurium, nec frons, nec genæ, nullaque pars externa universi corporis, frigebant attactu, quantumvis de eorundem frigore vehementer conquereretur. Ipsumque Thermometrum *Fahrenheitanum* gradum 101, scilicet 4. 5. 6. gradus caloris supra naturalem, signabat. Pulsus interea æqualis, fortis, naturali ejus modice tantum celerior. Vix læsa respiratio.

In termino illo, qui finis frigoris est, principiumque caloris, calor thermometri idem fuit. Respiratio tunc celerior fortiorque.

In æstu febrili notabat Thermometron 104. gradus, qui in multis acutis nec major esse, nec diu tantus perstare solet. Pulsus jam vix eo celerior, qui in frigore febrili, sed paulo fortior.

An frigus unice a minore attritu? Unde ergo tanti frigoris perceptio, tremor, concussio, quando calor, thermometro exploratus, aliquot gradibus calorem transcenderet naturalem?

Medicamenta autem data ipsi hæc fuere. In frigore febrili bibit singula hora calidum vasculum decocti *Avenæ*, cujus binis in libris manipulus florum *Sambuci* infusus, ac mellis puri uncia duæ commistæ erant; idemque in subsequente æstu continuavit: paroxysmo autem absoluto, evacuavit quotidie libras duas *Aquæ avenæ*, mistas cum unciis duabus *Rob. Sambuci*, & dragma *Nitri puri*. Continuavit hoc ultimum remedium diu a cessante jam febre, eo quod levior ventris durities, quæ sub febre quotidiana percipi ceperat, hujus sub usu disparere deprehenderetur.

Liber itaque a febre rusticus, integra videbatur
frui

frui sanitate; id unice alienum a sanitate habens, quod pro læte rubicundo colore, qui, ipso, ejusque fratre, testibus, vultum in sanitate ornaverant, color nunc conspiceretur ferme ictericus, quamvis cæterum nulla signa Icteri adessent, jamque omnino mollesceret venter.

Cessante febre hac, mox arena copiosa, & in urina, & ad vasis latera, observari cepta, multoties posthac in urinis comparuit, flava aliquando, potissimum autem subrubra.

Contigit autem, quotidiana febre penitus cessante, ut juvenis perciperet dolorem in parte pulposa pollicis pedis sinistri, nec nisi tertio die eundem indicaret nobis. Parvum tumorem tunc vidimus, suppurantem. Crisin forte Naturam huc versus molientem suspicati, cataplasmate emollivimus eum, bi-duoque post aperuimus. Effluentē vix semicochlearis quantitate puris, totum mox consolidatum fuit. Unde accidens quidem illud, criticum autem minime fuit, εἶδεν γὰρ ὀλίγον χειρὶ μὲν Galenus dixerat; & quæ sequuntur, id confirmant.

Si tamen criticum naturæ molimen fuisset, suspecta hæc crisis fuisset. *Coacarum* n°. 68. damnaverant *Hippocrates* critica ad extremas manus pedesque conamina. Τὰ, ἐν χερσὶ, ἢ ποσὶν ἐρυθρήματα ὀλέθρεια. Et *epid.* 2. apud *Foësiū* 1003. „Quemadmodum „Timenei forori, ex valido morbo quid ad digitum „abscedebat: εἴχ' ἱκανὸν δὲ δέξασθαι τὴν νόσον; sed quia „digitus non erat locus aptus ad excipiendam materiam morbificam, recidivam femina passa est, „& periit. Et *epid.* 4. pag. 1131. „Undecimo „die, bono, critico, ad dextræ manus digitum „majorem inflammatio, septimoque post abscessum „die mors.” Miserrime morientem vidit *Ill. Præses* hominem, cui pleuriticus dolor tertia morbi die in extremis pedibus resedisset. Nunquid loca hæc

nimis cum tendinosa, tum nervosa, quam ut acrem morbi ferant materiem? An defectu cellulositatis sufficientis non possunt hæ partes morbi copiosam locare, transmittereque materiem? Quæcunque sit hujus observati causa, observatio facta confirmataque sufficit nobis. Sin tamen exempla prostant hominum, post similes crises sanatorum, admittimus ea libenter; cum vel sub ejusmodi critico molimine, Natura viis aliis eliminaverit tunc id, ad quod eliminandum extremitates digitorum ineptæ fuissent; vel casus rarissimus existat, qualem *III. Præses cap. de Pleurit.* describit. Sed rarissima exempla non destruunt Naturæ & Hippocratis leges, quæ, id, quod ὡς ἐν τῷ πολλῷ contingit, continent.

Interim nos dolentem juvenis pedem ad maturationem, seu potius ad exitum materiæ disponentes, nemo condemnet. Nostri enim officii est, si v. g. ad coxam, ad oculum, aliave *inidonea* loca, morbi materies copiosa jam adest, suæque turgescencia immanes creat dolores, exitum ipsi parare quantocytus, ne moram trahendo destruat, quas obsidet, partes.

Sed e diverticulo in viam. Consolidato brevi hoc ulcusculo, color mansit fusco-flavus. Inquietus de illo, exploravi, quid solvens nostrum decoctum, quod priori & alteri ægro profuisse supra constitit, hic efficeret, media ejus uncia singulis horis data.

Interim die nono ab ultimo paroxysmo elapso, inopinato contigit, ut juvenis noster, mox a levi ac frugali prandio, quod ad undecimam antemeridianam in Nosocomio datur, frigore per horam, perque alteram horam calore, corriperetur; conflucta Cephalalgia subsequente.

In frigore febrili thermometron gradum caloris naturalis præter propter notavit, gradum scilicet 95. Orto vero calore febrili 101. gradum, summoque in æstu gradum 105. Pulsus in frigore celer, vix
for-

fortis; in calore non celerior, sed fortior.

Finito toto intra bihorium paroxysmo, dolor capitis duas adfuit cum dimidia horas. Postquam appetitus rediit, cum cæteris optimæ sanitatis signis.

Altero die ad meridiem brevior leviorque paroxysmus. Porro utitur, ut olim, in frigore febrili infuso suo florum Sambuci, & extra paroxysmum Decocto solvente, nudius tertius præscripto.

Tertio die insultus gravior. In sesqui alterius horæ frigore thermometer notavit gradum 101. in calore autem vix integræ horæ gradus 106.

Ad eandem circiter horam febris quotidie rediit, corpus in apyrexia sanum relinquens, usque ad paroxysmum xvij. Eo autem absoluto, æger nocte vix dormivit, anxius fuit, saporemque veluti putridorum piscium conquestus est. Unde ad 8. matutinam sumsit unc. iijß. *Aquæ laxativæ Viennensis*, pariterque ad horam 9. Hora 11. inde alvus compacta copiosa, & hora dimidia post laxa alvus, in frigore febrili adhuc ter, bisque post febrim. Frigus sub actione purgantis trium tantummodo horæ quadrantum, vix ullus calor.

Sequenti die vix observata febris: nulla febris die tertio, quarto, quinto, sexto. Recidiva igitur quotidianæ febris cessasse videbatur perturbatione purgantis.

Sed color ictericus interim perseverabat. Prosequabatur ob id accurate decoctum in 22. diem.

Septimo autem apyrexie die febris quotidiana tertio rediit, trihorio post prandium, atque ita ad eandem fere horam quatuor sibi subsequenter diebus: ea tamen cum differentia, ut solum frigus, vix ullus calor, adesset; quæ quo demum pacto cessaverit, mox patebit, præmissis aliquot observationibus.

In omnibus octodecim Paroxysmis Recidiva primæ

mæ quotidianæ thermometrum semel, ut monui, gradum 95. notavit, cæterum vero semper 99. aut 100. aut 101. Igitur ægro algorem internum, corporisque molestant a frigore concussionem, amaræ conquerentē, calor fere semper 4. 5. gradibus fuit naturali major. In summo calore thermometrum gradum 104. 105. 106. 107. 108. signabat; quales gradus vix unquam, nisi paucis admodum horis, febres acutæ, peracutæ, acutissimæque, notare consueverunt. Patet inde intermittentes febres magnam in solidis, fluidisque, inducere mutationem, lentos humores coquere quidem, ac vasa, certo modo inertia, stimulando animare, debitumque in motum sæpe excitare posse; verum quoque humores aut nimis dissolvere, aut diffatis subtilioribus, inspissare; fibrisque, quæ, quo agant, non stimulo, sed restaurante cardiaco indigeant, summam flacciditatem, invincibilemque atoniam facile conciliare. Cum id tot exempla confirment, limitato sane sensu vis intelligenda proverbii est: *De intermittente, ac præsertim de Quartana, non sonat Campana*. Unde & regula petenda est, intermittentem febrem aut relinquendi sibi, aut abigendi; ut mox patebit.

Sitis in paroxysmis his, frigoris tempore maxime, intensa sic, ut bihorii spatio Libras 4. 5. 6. infusi sui evacuaret.

Notavi superius paroxysmos tres priores Tertianæ febris hujus juvenis ad 9. matutinam, quinque posteriores ad tertiam in aurora invasisse. Quotidianam primam exacte servasse horam nonam matutinam, quæ non ultimorum, sed priorum Tertianæ paroxysmorum erat hora invasionis. Quotidianæ vero Recidivam priorem adortam juvenem ad meridiem esse, primo quidem mox ubi pransus esset, reliquis autem diebus sine prægresso prandio. Tandem constitit quotidianæ recidivam alteram bihorio trihorio-

ve serius invasisse. Confirmant hæc, quæ supra monui, de incertitudine genium febris, naturamque determinandi, ex tempore primæ invasionis.

In hac demum altera quotidianæ recidiva, seu intermittente febre quarta, lassitudo perpetua animadvertebatur, virium notabile appetitusque decrementum, nocturni sudores, insomnia, inquietudines tantæ, ut, ne tandem hæc febris cum corpori noxia foret, tum morbos inferret alios, justam nobis incusserit formidinem. Sistendam ergo arbitrati, dedimus ægro dragmam corticis Peruviani ad 6. vespertinam; alteram dragmam ad 10., tertiam sequenti mane ad 6., & ultimam ad horam primam pomeridianam. Febris nec eo die, nec sequentibus, ad assumptam quotidie mediam Chinæ unciam, unquam rediit.

Stupenda autem erat, quam a primo die assumpti Corticis observabamus, mutatio. Mox enim vires exurgebant, redibat appetitus, animus erigebatur, bona alvus, bonæ urinæ, æque nonnunquam pulcre hypostaticæ, comparebant; &, quod maxime notabile, pertinax subictericus color sensim disperebat, intraque decem dies plane aberat. Sic ineunte Septembri perfecte sanus Nosocomio exivit, corticem per unam, alteramve septimanam adhuc sumpturus. Domi suæ continua sanitate fruitur hucusque.

Numquid cortex Chinæ, febrim virtute febrifuga tollens, simul sua restaurante facultate systema biliosum emendavit, ut remediis solventibus æger postmodum non habuerit opus? Videntur ejusmodi existere casus: sed ne nos iidem justo audaciores reddant, caveamus. Omnino enim credibile videtur Decocto resolventissimo, quatuor prope septimanas usurpato, viscerum ac potissimum Jecinoris, multum reſeratas obstructions fuisse, ut demum superveniens virtus chinæ roborans, opus reliquum

absolverit. Febris enim tertiana, quotidiana deinde bis recidiva, & cutim pertinaciter defœdans sub-ictericus color, non merum, non simplicem, non causa materiali carentem, febrilem motum notabant, sed vitium quoddam jecorarii systematis, quod primo virtute solventis remedii multum emendatum, demum penitus vi restaurante Corticis devictum est.

§. IV. Plures profecto ejusmodi historias elapsus proxime annus Academicus suppeditavit: verum cum earum relatio fastidiosa forsitan prolixitate displiceret, sermonem abrumpo, meque ad necessaria quædam Corollaria converto; quæ suggessit varia methodus febres intermittentes curandi, & ab aliis, antequam ægri ad nos venirent; & a me, postquam curæ meæ traditi essent; adhibita.

Methodos has varias, divisas in hæc, quæ fieri in paroxysmo oporteat, & in illa quibus extra paroxysmum opus sit, optimus *Boerhaave* compendiose recenset *cap. de Febr. interm.*

In frigore febrili vult *ut aperientibus, salinis, alcalicis, mineralibus, diluentibus, oleosis, blandis, calore, motu, fotu, frictione utamur*, hunc in finem dedimus ægris nostris infusionem calide potandam florum Sambuci in aqua Avenæ, cum melle & nitro; in calore autem *Aquosa, calida actu*, commendat, *cum subacidis aperientibus nitrosisque permistis, vel & Cichoraceis, similibusque blandis aperientibus, quiete.* Tandem sudoris tempore prodest *Ptisana vinosa, jusculis carniū, decoctis temperatis, sudori urinæque reddere materiem; sicque hæc non vi caloris, medelæ, stragulorum, exprimere, sed copia aucta promovere, quam blandissime & diu.* Quæ æger noster ultimus in frigore febrili sumferat, cum in brevioribus ejus paroxysmis quoque prodesse, caloris, ac sudoris tempore, continuavit eadem. Mutamus hæc in aliis, prout ægri mutatione opus habere videntur.

Quæ autem extra febrilem insultum facienda sunt, sic enarrat: Primo quidem Emeticum dandum: *Quin abundanti colluviei in primis viis . . . vomitorium sæpe prodest tollendæ, dando ante Paroxysmum eo spatio, quo ante hunc effectum præstet. Id faciendum cognoscitur ex victu, morbis, symptomatibusque prægressis, nausea, vomitu, ructu, tumore, halitu, sordibus linguæ, gutturi, palati; anorexia, amarore oris, vertigine tenebri-cosa: & absoluta operatione dato opiato, ut sedatus ante febrim tumultus sit.*

2. Purgans; quod vir magnus iisdem cum indicationibus, tum cautelis, quam Emeticum, dandum censet.

3. Suadet utrumque hoc remedium minus evacuandi, quam stimulandi, scopo. *Ut & prodest idem dum stimuli instar movet utrumque. Utrumque autem repudiat, deficientibus his binis indicationibus. Ali-ter nocet, inquit, dum debilitat, liquidissima elicit, digestionem hic imprimis necessarias, turbat, sicque diuturnitatem morbi, vel & mortem producit. Dura, sed vera, in eos sententia, qui emetico, & purgante, vel alterutro, omnem intermittentem febrem aggrediuntur!*

4^{to}. Sudorifera. *Frigus & febris sudorifero hic tollitur sæpe, dum aliquot ante tempus cognitum futuri paroxysmi horis, liquido aperiente, diluente, leviter narcotico, repletur corpus ægri: deinde una hora ante malum excitatur sudor, & continuatur, donec binæ ultra tempus initii paroxysmi elapsæ sint horæ.*

5^{to}. Venæ sectionem; quam non nisi casu prodesse statuit.

6^{to}. Tenuem, exactamque diætam, casu tamen unice proficuum.

7^{mo} Corticem Peruvianum: *Si autem febris autumnalis vehemens, corpus ex ægritudine debile, morbus jam aliquo tempore duravit; neque adsint signa internæ inflam-*

mationis, neque collecti alicubi puris, neque obstructi admodum hujus illiusve visceris, cortice peruviano abigetur.

8. Epithemata, & Epicarpia.

9. Inunctiones spinæ dorsi.

10. Adstringentia epota.

Commentari hæc decem curationis capita animus neutiquam est, cum exstent consummatissimi Illustrissimi Præsidis in hæc commentarii: lubet autem universam praxim percurrente, examinare in quavis sive Methodo, sive Empeiria, quid boni, quod imitere, insit; quid mali, quod evites; quid ineptum, quod abjicias; quid demum periculosum, quod damnes. Recensionem hanc junioribus medicis, quibus hæc scribo, utilem fore puto.

Ordinem inverto, inchoaturus ab Articulo sexto, qui de tenui exactaque Diæta agit. In quavis enim indicatione ea, quam vitalem vocant, perpetuo obtinet principem locum.

Igitur *Primo*, ad febrim intermittentem curandam, Authores quosdam Diætam exquisitam atque tenuem commendasse meminit *Boerhaavius*. *Celso* referente *Heraclides Tarentinus* hanc diætam vehementer commendaverat; ipseque *Celsus*, licet *Heraclidæ* hac in re non assentitur, videtur primis 14. diebus, tentasse eandem.

Hippocratem hujus sententiæ non fuisse, prima Aphorismorum sectio fidem facit: *Tulpius* Quartanariis funestam fuisse exemplis evicit: *Boerhaavius* casu tantummodo profuisse narrat.

Illud interim verum ab altera parte est, plenior Diæta homines non raro impetus febriles augere, ipsamque perpetuare febrim; nec facile curari eos, qui suos liberos a febre dies epulando, commessandoque, transigunt: regula ergo statuenda est, ne in alterutrum inclinando quis peccet.

In omni seu acuto, seu chronico morbo, indicatio vitalis cæteris prævalet indicationibus. Si vires vel copiosiore nutrimento, quam digerere subigereque queant, opprimantur; vel si debiti defectu nutrimenti fatiscant; merito veremur, ne morbus Naturæ prævaleat, succumbatque ægrotus. Quamobrem, si bene appetat ille, si bene digerit, egeritque, victu utatur eo, qui ad has facultates conservandas requiritur. Viribus sic manebit aptus, qui crudam morbi materiem concoquat, expellatque concoctam. Sanus si laute, si multum, comedere consueverat, plura utique illi erunt, quam isti, qui tenuius, concedenda. Qui bis ter comedere, dum valebant, soliti, etiam his ob consuetudinem consulendum: plus hyeme, ob maiorem voracitatem, quam æstate: plus hominibus nationis voracioris, quam illis, qui frugalioris sunt. *Et quibus semel, aut bis, & plura vel pauciora, & per partes, (offerri conducatur) videndum. Concedendum autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati.* Aph. Sect. 1. n. 17. Ipsaque tota hæc sectio pulcherri-
mas regulas continet, quas secuti Practici, ordinata recte Diætâ morbi curationem promovebunt.

Peccant itaque adversus has Hippocratis leges, morbosque peiores periculosioresque reddunt, qui nihil nisi tenuem diætâ crepent, ne ægri morbum, ut ajunt. nutrant. Hippocratis præcepto, & exemplo, ægris nostris, febre intermittente laborantibus, alimenta damus talia, tanta, totiesque, quam & consuetudo, & facilis eorum tolerantia, concedunt. Sin vero pluribus assuetis jam præ vi morbi viscera iisdem ferendis non sint, nos, & præparatione tenuiore, & parciore quidem, sed frequentiore exhibitione, id reparare ac supplere conamur. Ægris, qualis noster juvenis erat, carnes teneriores, olera, levia farinacea, quibus a puero assueve-
runt,

runt, viniq̄ue modicum, quo vix carere nostrates queunt, concedimus, quamdiu viscera hæc commode ferunt. Contrario autem modo in Nosocomio fit, si homines paucioribus, tenuioribusque assueti sint, ne majore solito copia Viscera onerentur. Ceterum hac elapsa adhuc æstate Medicinæ Auditores viderunt languentem, acuto in morbo, Coctionem, cauta plenioris victus concessione sic emendatam, ut brevi morbus ad Crisin aptaretur; qua instante, ad ejusdem aureas *Hippocratis* leges, nonnihil iterum de hoc victu pleniore detrahebatur. Cæteroquin id quod *Tulpius*, ut supra memoravimus, idem quivis advertere Practici, exquisitiore Diæta ægrorum vires sic minui, collabique, ut coctioni impares in morbum cum pejorem incidant, tum protractiorem.

Secundo *Emetica* laudantur. Eaque alii exhibent remoto admodum a futuro paroxysmo tempore, ut diu compositus sit, qui corpori inde concitatus fuerat, motus: alii, ut hic monet Celeberr. *Boerhaavius*, paucis ante Paroxysmum horis; quo morbi materiam turbent sic, ut exquisitam intermittentem febrim pertinaciter non perpetuet.

Hippocrati sane ignotum consilium non fuit. Libro de *Affectionibus* pag. apud *Fœsium* 520. Si autem quartana prehenderit, inquit, ἢν μὲν ἀκάθαρτος ἦ, siquidem impurus fuerit, primum quidem caput purgandum, & tribus aut quatuor interjectis diebus φάρμακον δίδοναι ἄνω, καὶ τὴν αὐτὴν τὴν λήψιν, medicamentum sursum evacuans exhibendum est sub ipsam febris accessionem. *Celsus*, & apud *Celsum* *Asclepias*, idem suadent.

Salubre *Hippocratis* consilium imitati quivis sapientes Practici sunt, ubi impurus æger erat. Est duplex hic notanda impuritas: altera est ea, in qua jam ante morbum viæ primæ fordibus scatent; altera quando, etiam citra has prægressas sordes, ea febris epidemicæ intermittentis constitutio est, ut fere sem-

per quid corruptæ bilis ad præcordia colligatur, qualem *Sydenham* Sect. 1. cap. 3. descripsit. Ast vero tertio præter ejusmodi impuritates *Boerhaave* emeticum laudat, quatenus stimulando moveat materiam febrilem, turbet eandem, confundatque; quo, fracto febris impetu, exquisita ipsa, diuturnaue, desinat esse.

Triplex hæc Emeticorum indicatio Medicos movit permultos, ut fere nunquam curam febris intermittens, nisi ab Emetico, inchoarent, & bis, ter, pluriesque repeterent, suamque in curandis intermittentibus febribus ubique jactarent felicitatem. Et ut expertissimus *Thomson* in Tomo 4. Act. *Edimb.* fortunatam suam 20. annorum praxin laudat, qua Emeticum det eo frigoris febrilis momento, quo æger primas nauseas experitur; aut si non in frigore, saltem mox ad nausæ in calore principium; ita innumeri alii hanc methodum, tanquam præstantissimam, commendant, laudant, observant.

Hæc tamen *Hippocratis* consuetudo non fuit, non fuit animus. Cur enim monuisset adeo circumspicere non esse dandum, nisi hominis id posceret impuritas, Emeticum? Nec veretur *Sydenhamus* inter febris protractæ, imo lethalis causas, Vomitoria referre. Ipseque *Boerhaavius* datum Vomitorium præter tres datas indicationes nocere ait, *dnm debilitat, liquidissima elicit, digestionem hic imprimis necessarias, turbat, sicque diuturnitatem morbi, vel & mortem producit.* Hinc toties Practicorum libri; hinc toties nos, hujus Methodi universalitatem lugemus.

Ubi vero id dandi vera indicatio est, ut detur brevi ante Paroxysmum, votorum pluralitas est. Sub ipsam accessionem ab *Hippocrate* datum jam vidimus. *Amatus Lusitanus*, qui multas eo modo feliciter patratas a se curas jactat, *hujus Evacuationis*, inquit, *die paroxysmi ratio assignatur talis, quia commotione agitata*

ata materia, facilius ad expulsionem redditur: quam diuinus Senex contemplatus in quartana, die paroxysmi, pharmacon dare mandat. Adstipulatur Forestus quoque Libr. 3. de Febris, Quidam, ait, in initio hujus febris vomitum provocant, & ante paroxysmum, vel initio paroxysmi: hujus remedii tanta vis est, modo recte instituat, ut multi hoc unico præsidio convaluerint. Dabat Thomson, ut vidimus, illud quoque in frigore, aut calore, ad primas nauseas: Sydenham vero & Boerhaave, videntur in suæ quisque nationis dispositione id notasse, ut si dandum emeticum esset, illud daretur adeo mature ante futurum insultum, ut turbatio corpori inde nata sedari paregorico posset, priusquam adesset accessio. Hinc nulla regula generalis est. Observatio regionis, tempestatis, temperiæ, ætatis, sexusque, adeo ab Hippocrate commendata, regulam determinat.

Tertio *Purgantia* laudantur. *Hippocrates* ea conditione, ut supra, vomitorii, ita & hic purgantis, extitit laudator. Et primo quidem in eodem *Quartanario*, cui ob impuritatem docuerat emeticum dandum esse, *rursus*, inquit, *aliquo intervallo interjecto, aliud Medicamentum deorsum purgans*, ἐν αὐτῇ τῇ λήψει, *in ipsa accessione, dandum erit.*

Subjungit autem mox hæc de *Tertiana* febre; in qua nullum emeticum suavit; *cum febris tertiana detinuerit, si impurus tibi æger videatur, quarto die medicamentum purgans dandum est.* Φάρμακον hic simpliciter dixit, non addendo ἄνω vel κάτω; unde quidem Emeticum æque, quam purgans, quis forte intelligeret; verum cum, notante *Galeno* pluribus in locis, *Hippocrates* nihil ad Φάρμακον vel ad Φαρμακένειον addendo, purgans alvinum intelligat; cumque *Foësius* diserte notet, hanc ejus significationem in confesso esse apud omnes, qui vel minimam habent ejus dictionis notitiam; certo videtur hic de alvina purgatione *Cois* lo-

cutus. Repetitque idem de Tertianæ præceptum iisdem pene verbis *Libr. 2. de morbis*.

Intentione itaque *Hippocratis* in Emetico, & Purgante dandis, eadem exiſtente, condemnantur conſequenter omnes, qui quacunquẽ intermittente in febre purgante opus eſſe contendunt. *Sydenham* & *Boerhaave* limitarunt cum *Hippocrate* uſum purgantis; ultra citraque hos limites utrique condemnarunt idem. Equidem *Sydenham* in intermittente autumnali, cum æger a datis quadrihorio ante paroxyſmum remediis ſudatoriis jam ſudaret, dabat ſcrupulos duos, *Pil. coch. Maj.* in Miſtura ſpirituofa; ut ſudare pergeret; non autem proprie ſic egit purgandi ſcopo, *verum ut binis illis contrariis ſudandi & deſi- ciendi motibus, eodem tempore excitatis, paroxyſmi pro- ceſſum confunderet, atque interturbaret*: de qua metho- do poſtea pluribus. Unde demonſtratum eſt *Sydenhamum*, non minus quam *Boerhaavium*, purgantia in intermittente febre condemnaffe, niſi quando corpora omnino impura eſſent; quo unico in caſu *Hippocratem* purgantia laudaſſe, citatis ejusdem textibus conſtitit.

Confirmatur hoc ex eo, quod cum docuiſſet impura corpora purganda eſſe, deinceps oſtendat quid agendum ſit Medico, ſi pharmaco opus eſſe ipſi non appareat: Hic nulla ſive Emetici, ſive Purgantis, ultra mentio fit.

Juvenis noſter a prima quotidianæ febris recidiva viſus eſt purgante, ante acceſſum dato, curatus. Sed & vera hic aderat indicatio id dandi.

Hoc demum, & non alio, ſenſu, intelligimus fortunatas per purgantia curas, quas tot laudibus cumulant Autores; v. g. *Monavius* in *Epift. 37. Libr. 2. Epift. Cratonis*, aliorumque. Hoc unico ſenſu ſuæ *Agarico*, ut febrifugo, laudes manent, dum *Ve- teres* ad dragmam i. ij. illum brevi ante febrilem

porrigerent accessum; ut apud *Dodonæum*, & in adjectis ad *Dodonæum* notis, videre est.

Quarto laudatur *Venæ sectio*, & merito quidem. Est enim aliquando metus, ne in plethoricis, a valido febrili motu, humor copiosior circumductus, noceat stagnando, obstruendo, inflammando, repagulaque diffringendo sua. Sed ait *Boerhaavius* Venæ sectionem prodesse casu duntaxat; hæud vero ex *Bo-talli*, ejusque sequacium sententia, veluti ad intermittentem febrim curandam per se opportunam. Quapropter illam *Sydenhamus* jure rejicit, veluti infidum auxilium, quod ni febrim illico confodit, ejus curam procrastinat, imo cum cæteris male adplicatis letum accelerat.

Quando igitur suam fortunatam praxin laudabat *D. Chomel*, ex dato, hora ante paroxysmum, largo Chamomillæ cum cremore tartari decocto, institutaque mox inde venæ sectione; cum Plethoricos maxime in cura habuisse credibile fit. An *Gallis* tamen, centenis sæpe venæ sectionibus assuetis, venæ sectio in febribus minus nocuisset? Præcipue cum *Riverius* in Cent. 4. similem curam exemplis, & quidem uno in septimestri gravida, confirmet? Sed credibilius potius profuisse Missionem sanguinis ob Plethoram. *Forestus* v. g. qui venæ sectioni assuetus non erat, dum ipsi post tertium Quartanæ paroxysmum vena ad incipiens animi deliquium solveretur, ne quartum paroxysmum inde haberet, videtur præ plenitudine soluta tantum tulisse a vena secta præsidium.

Aliter vero cum Hæmorrhoidum evacuatione res se habet. Quamvis enim multum absit, ut cum priscis Medicinæ patribus unicam Quartanæ febris ab atra bile duceremus originem, inficias tamen nemo ibit etiam ab atra bile gigni Quartanam. Bilis autem atræ per hæmorrhoidas evacuatione, causa febrigena immediate, atque directè evacuatur, ut sic de-

mum febris cesset. Notabile quod in rem *Forestus* notat Libr. 3. Obs. 41. Hominem Quartanarium, quem cæcis hæmorrhoidibus laborare intellexerat, bono esse animo iussit: nam hæmorrhoidibus apertis a Quartana facile liberari posset, cum & Præceptor meus **BENEDICTUS FAVENTINUS**, in tollendo Quartanam; præcedentibus universalibus remediis, pro indubitato experimento habebat, ut venæ hæmorrhoides secarentur. Secundo refert quoque **GUARNERIUS** se vidisse Præceptorem suum **JACOBVM FOROLIVIENSEM DELLA TURRA**, nobilem quendam curasse solis remediis, quæ hæmorrhoides provocabant.

Verum hic *V. S.* commode in ano fieri non potuit, cum venæ hæmorrhoidales potius exulceratæ essent, & ob hoc ingentes dolores inferebant. Quare accito Chirurgo, qui ulcera curabat aptis remediis apposis: unde tandem hæmorrhoides apertæ sunt, & fluere ceperunt, multam virulentiam effundentes: ita, ut a febre quartana hoc modo liberatus fuerit.

Itaque hæmorrhoidum fluxus primo prodesse casu potest, in universo vasorum systemate abundantibus humoribus, ut de venæ sectione dictum: secundo prodesse potest Quartanæ auferendo proximam causam, infarctum nempe systematis venæ portarum, ab atra bile. Minimeque inhærentes systemati veterum, qui quartanas semper, tertianas nunquam, ab atra bile oriundas statuebant, fatemur tertianas æque quam quartanas, si forte atra bilis in iis peccat, hæmorrhoidum fluxu, aut levare insigniter, aut penitus curari posse.

Quinto recensentur *Sudorifera*. Varia intentione, modoque, dabantur. Ac primo quidem, quemadmodum ex *Sydenhamo*, ac *Boerhaavio* supra dictum est, ut corpus in apyrexia repleretur liquido aperiente; horaque deinde aut bihorio ante invasionem excitaretur sudor, promovereturque eo usque, do-

nec

nec bihorium a tempore quo febris adesse debuisset, præterlapsum esset. Huc porro bene multa auxilia facere credidere veteres, ut mox patebit. Secundo, sine peculiari sudoris ante paroxysmum provocatione, calidis, aromaticisque medicamentis, & attenuantibus, corpora toto apyrexias tempore, replebant, ut attenuatis sic probe humoribus, frigus febrile, tandemque febris ipsa, præcaveretur. Huic scopo legitur *Myrrha* adeo profuisse, ut in febre intermittente curanda de palma cum *Cortice Peruviano* decertaret. Vulgus *Gentiana*, *Galanga*, *Absinthio*, *Centauryo minore*, *Marrubio*, *Helenio*, *Imperatorio*, *Scordio* &c. tota in apyrexia copiose datis, frigus febrile corripit, sistit, ac febrem feliciter sæpe curat. *Galenus* balsamenta commendabat, & *Sinapi*, suumque *Diatrion piperion*. Nunquid *Muisio* laudata sat larga salis ammoniaci dosis, huc non referenda?

Tandem 3^{tio}. mos multorum erat hæc sudorifera non dandi, nisi 1. 2. 3. 4. horis ante expectatam febris invasionem, corpore simul ad sudores calidiore aëre, integumentisque, disposito. Sic Juvenis noster magnam piperis quantitatem cum *Spiritu Vini* sumserat. Antiqua sane, celebratissimaque Methodus! *Celsus* ante accessionem *Allium* comedere jubet, aut piper cum aqua calida bibere. Hoc *Bartholinus Cent. 5. n. 48.* oris septentrionalibus familiare præsidium notat, eoque *Zelandiæ* Episcopum se curasse feliciter. Cyathus *Vini Hippocratici*, quo *Varandæus* ante Paroxysmum utebatur; Haustus *Spiritus Vini* cum aqua *Rosarum*; aut *Vini* haustus, cui *Agrimonia*, cui *Millefolium* aut *Verbena*, aut *Absinthium*, &c. infusa, multorum autorum: *Raji* in *Catalogo Plant. Angl.* haustus *Vini* generosi, cui *Viscus*, *Oxyacantho innatum*, infusum fit: Pulvis magno *Heurnio* commendatissimus, qui ex *Nucis moschatæ ustæ*, nucleis *Perficorum*, & *Amygd. amararum*, à scrupulo, com-

compositus, cum vino ante paroxysmum exhibebatur: Specificum *Hartmanni* in sua *pr. chimiatri. Spiritus salis ammoniaci in aqua Centaur min.*, vel *Cichorei*, ante paroxysmum exhibiti, donec homo sudoribus diffunderet: *Rulandi & Riverii* Methodus, ope *Spiritus sulphuris*, aut *Spiritus vitrioli*, sudores ante paroxysmum eliciendi: *Fonsææ* secretum, pulveris *Betonice* dragmas duas in Ovo dandi, quadrihorio ante accessum: *Riverii* exhibitio *salis Absinthii*, cum *succo Citrei*, sudores cum regimine ante paroxysmum eliciens: *Ægyptiorum* mos dandi dragmam pulveris *Chamædryos*, calido in jure, brevi ante paroxysmum: *Pulvis Pannonicus*, *Specificum Michaelis*, *Præparata Bezoardica* multorum Auctorum, *Theriaca Andromachi*, *Diascordium Fracastorii & Sylvii*, *Philonium Mesue*, *Requies Nicolai*, *Orvietanum*; quæ omnia cum Vino, brevi ante Paroxysmum, corpore ad sudorem disposito, exhibentur: hæc, & similia, Auctoribus commendata, & laudibus sæpe in cælum elata, ad hanc sudatoriam curam referenda sunt.

Quo tandem Clyisma *Ægyptiorum* referam, cujus in sua Med. Methodica *Prosper Alpinus* meminit, compositum ex *Libra Decocti Majoranæ* cum unciis III. *olei laurini*, quo sane, inquit, & in aliis, & in me ipso, olim quartana vexato, summa cum utilitate usus sum, & nonnullos quartanarios tribus tantum Clysteribus sanatos vidimus. An clyisma hoc venis cum bibulis, tum paucis Coli lacteis, absorptum, humorum motum auxerit, pepuleritque sudores? Pertineret tunc ad hanc classem.

Quid demum cogitandum de Decocto *Raparum*, quo Abbatem *Guarnerius* curaverat, & quod in Epistolis laudat *Crato a Craftheim*? An, quia abjecto cortice, primæque decoctionis aqua, rapæ cum nova aqua coctæ exprimerentur, illeque succus cum butyro insulso, ac saccharo mistus, potui daretur, sum-

Sumto simul quovis mane pulvere quinque *nucleorum Persicorum* ; an , inquam , ad sudorum referendum Methodum erit ?

Celeberrimus *Mead* in *Mon. & Præc. Med.* *Quamquam nec illud hic observare alienum erit* , inquit , *me pluries , cortice ipso votis non respondente ; pulvere ex floribus Chamæmeli , Myrrha , saleque Absinthii , adjecto paulo Aluminis , composito , febres intermittentes depulisse .* An attenuando , disponendoque ad sudores , ad hanc quoque Methodum *Meadii* pulvis referendus ?

Pulvis febrilis Pharmacopææ *Viennensis* huc quoque referendus videtur .

Triplici modo vidimus homines a suis Medicis ad sudorem dispositos fuisse : verum quartum multi addebant , eumque efficacissimum . Frictione , balneo , motu , cursu , ante invasionem , imo ipsa , si contingeret , in invasione , homines in profusos sudores solvebant , cum ipsum vulgus , tum quoque Medici . Hoc sedulo faciamus *Celsus* Autor est . Quin & frictionem , & motum , & cursum , consulere plures , una cum calidorum remediorum assumptione . Ita *Platerus Tom. 2. Cap. 2.* Simile quid *Boerhaave* quoque suadet . Estque ars curandi frequentissima Plebejorum & Rusticorum .

Cuncta igitur , quæ ad hanc 5. Methodum retulimus , eo collineant , ut corpus disponatur ad sudores , & ut illi maxime eliciantur tunc , quando febrile frigus instat , promoveanturque bihorio ultra consuetum invasionis tempus .

Profuisse pluribus hanc sudatoriam Methodum ultro fatemur ; sed & aut non profuisse sæpe , aut multis nocuisse , cum scriptores Medici notarunt , tum sæpe vidimus . Prudentia igitur , iudicioque in ea adhibenda opus . Si enim febris salutaris , si homini necessaria , ut sæpe fit , hac autem arte abigatur ; quid non timendum mali a relictis obstructionibus ,

bus, ad quas solvendas salubrem hunc motum Natura excitasset? Nonne juvenem sic demum Hydrope periisse, qui hac arte curatus erat, *Forestus* memoriae tradidit? In comperto præterea est homines hac arte febres continuas, ardentes, anomalas, malignasque, sibi conscivisse. Unde *Bartholinus* loco superius laudato addit consilium esse, quod & non paucis profuerit, & nocuerit multis.

Non ergo Cortex Peruvianus, quod febres intempestive suffocet, solus accusandus est: violentia descriptæ mox Methodi non minus cortice intempestive curat.

An *Arsenicum*, quod frigus febrile, febrimque totam, præcaveat, huc referam? Præstaret referre non debuisse. Quidquid laudis *Lemmery*, *Wepferus*, *Meyerus*, ex relatu aliorum; quidquid laudis *Friccius*, medicus Ulmenfis, libro de virtute venenorum medica; & in Actis Moguntinis *Joannes Christianus Jacobi* propria, ut ferunt, experientia, Arsenico ut specifico febrifugo, tribuant, exemplisque confirmare satagant; testimonia deleterii, nullaue arte cicurandi, Veneni, tot, tantaque *Vienna*, & haud ita pridem Exercitus, dederunt, ut cum magnifico *Werlhofio* de Arsenico agente *Obs. de Febr. pag. 42.* dicam „valeant maligna pharmaca, & plena aleæ, „cum & magis exploratas, & securiores medelas, „quarum præbia, quoad opus sit, augere, & continuare possis, benigna largiatur natura.”

Sexta Methodus ea est, quæ per Epithemata, eaque ad carpos utrosque potissimum, eorumve alterutrum, quandoque, sed rarius ad axillas poplitesque, admota, febrim tollere annititur.

Optimus *Boerhaave* in Mat. Med. duas Formulas dedit, quarum prior magni *Boilæi* erat, qui in Libro de util. Phil. exp. exert. 5. cap. 7. refert ea se a febre quotidiana violenta, usitatis immorigera præsi-

diis,

diis, liberatum fuisse. Est autem hoc : *R. Uvar. Corinth. Summit. Lupuli, Salis marini, ā. unc. ij. Contusa in pulvem applica ad Arterias.* Addit Boilæus, licet aliquando successu caruerit, plures a quotidiana & tertiana id curavisse. Addidit & aliud hoc : *R. Summitat. Rutæ viridis unc. ij. Sem. Sinapi dr. ij. Contusa exhibe ad Epicarpia.*

Famosus hic ab omni ævo *Ranunculus* fuit, maxime *pratensis* dictus. Præterquam enim quod ad Anthraces Bubonesque pestilenciales, ad omnes Glandularum tumores, collique præsertim Scrofulas, hanc plantam contusam Prisci adhiberent, insigni quoque laude eam in cura intermittentium cumularunt. Primam speciem *Ranunculi montani*, quam ob id, *fieberkraut*, appellarunt, contusam adplicabant carpis; monentes sedulo tamen ne diutius applicatam ægri finerent, cum rodendo ipsos nervos, tendinesque, affecisse, plures ingenti suo damno experti essent. Videatur *Dodonæus* cum additamentis *Lobellii, Clusii, ac Ravelingii.* *Sennertus Libr. 2. de Febris, Cap. 20. sub finem*, hominis meminit, qui a diuturna Quartana, Scapulæque dolore acuto, ejusmodi Epicarpio, quod pustulas excitabat, curatus fuit. Pluriesque Epicarpium istud alii Autores referunt ab Agyrtis adplicatum; ut & simile quid refert *Ill. Præses in Comment.*

Rondeletio summis laudibus extollebatur Epicarpium, quod parabatur ex *Foliis Sambuci, Salviæ, Pedis columbini*, (id est, Geranii columbini, sive Geranii alterius *Dioscoridis*) *Fol. Rutæ, ā. m. β. Flor. Calthæ pauxillo, salis comm. m. j. cum Vino tritis.*

Martini Rulandi Epicarpia conficiebantur ex foliis *Rutæ, Salviæ, Bursæ pastoris, tritis cum aceto.*

Felix Platerus sua parabat ex *fol. Thlapsi, Plantaginis, Bursa pastoris cum aceto.* Vel etiam ex *ung. populeo, quocum commistæ telæ Aranearum*; cui *Lotichius* ad-

adhuc grana quatuor Opii addebat. Imo solum Acetum, pane bene imbibitum, *Plater* laudabat.

Heurnius Helleborum, (qualem non addidit) felix *Epicarpium* dedisse meminit.

Crato ad *Camerarium* profuisse notat Epithema Spiritus Vini linteis excepti ad *Ventriculum*: additque se haud carpis duntaxat, verum articulis omnibus, *Urticæ radices* cum aceto tufas admove-re.

Riverius laudat Cataplasma calidum, aromaticum, ventriculi admotum regioni.

Borelli affinis legitur feliciter intermittentes febres curasse foliis *Pentaphylli cum sale*, stratum super stratum positis, initio paroxyfmi ad carpum dextrum.

Boyleus loco laudato supra recenset *Fuliginem Caminorum cum Therebinthina*.

Acta Edimburgensia Tomo 2. *Erigerum* seu *Senecionem vulgarem*, in pul-tem contusum, & *Cardiæ* frigide applicatum, referunt.

Apud *Riverium* laudatur *Epicarpium Emplastri Strobelbergici*.

Curatos aliquos ab *Agyrta* vidi *Epicarpio*, linteo incluso, quod abiturus revelavit: erat *Sinapi* paratum, ut in mensa utimur. Ab alio vidi *Andromachi Theriacam* ad moveri. Vidi quoque febres epicarpiis curatas nonnullis rediisse.

Sed quid his immorer diutius! Finis scribendi non daretur, si memorare vellem *Amuletha* collo, aliisque corporis appensa partibus: ut *Tralliani lapidem ætitem*; ejusdem *Scarabæum* in Linteolo fulvo Collo appensum; *Foresto* commemoratos pilos, de gena detractos Hircorum; *Sanguinem* de primis Virginum Catameniis; *Lacertam viridem* appensam; *Vermiculos ex Dipsaci capite* apud *Dioscoridem*; *Araneam vivam* nucis inclusam putamini, collo donec moriatur appensam, vivamve locustam; *Francisci Jöelis Cantharides*; aut *Nicoli Florentini*, & *Tiengii Amstelodamensis*

annulum, qui in auriculari digito gestatus, abigeret Quartanas; *Ranam vivam* pugno inclusam donec moriatur, tumentemque manum reddat; ut silentio præteream adhuc plura, quæ superstitionem sapiant, ut *Scedulas Lucæ*, & similia potius tacenda.

An revera omnia hæc Epicarpia, Epithemata, Amuleta, febrium intermittentium absolvere, ut ferunt, curationem? *Boilæi* utique, *Rondeletii*, aliorumque clarorum virorum spectabilior fides, autoritasque est, quam ut illis diffidamus: videturque haud contemnenda ea esse irritatio, quam acres fervidæque res carpis, loco utpote tendines complures, nervosque pene nudos gerenti, inferre queunt. Verum si legamus, audiamusque, horum pleraque tunc admota, quando aut longiore tempore remedia alia bene multa, quæ febrim quidem nondum fugare, ad fugam nihilominus disponere potuere, adhibita sunt; aut una cum reliquis, methodice institutis, conjunguntur: si *secundo* bene perpendamus monita hinc inde adjuncta de hisce non applicandis, nisi coctionis signa comparuerint, ceteraque artis præsidia fuerint admota: Si tandem tertio horum scriptorum candidiores consulentes, non minus experimenta fefellisse, quam juvisse, intelligamus; consequitur id, ut 1^{mo} statuamus incertum esse an revera ejusmodi res febrim fugarint: & ut 2^{do} fateamur plura horum ob sui naturam apta videri, quæ fugent eandem. Consequitur tertio, si secundum verum sit, ambiguum esse, utrum hæc adplicata externæ febrim curent, materiem febrilem excitatis pustulis ex corpore revellendo, an vero motum febrilem turbando confundendoque duntaxat? quo posteriore in casu febrim intempestive tollendo vehementer nocere illa posse, ex præcedentibus patuit.

Septima Methodus comprehendit inunctiones & frictiones thecæ vertebrarum, brevi ante futurum

febris insultum. *Guarnerius* laudator extiterat hujus praxeos ; ejusque exemplum *Forestus* in recidiva Quartanæ septuagenarii sui Avunculi secutus „ spi-
 „ nam dorsi inunxi , inquit , a nucha incipiendo ,
 „ usque ad clunes descendendo , oleo anethino &
 „ chamæmelino simul mistis , & post inunctiones
 „ pannos lineos calide apponendo. Cumque ter
 „ hanc inunctionem in ipsa accessione absolvissemus ,
 „ miraculi instar non solum rigor cessavit , verum
 „ etiam febris in septuagenario desit.

Felix Platerus iisdem oleis , quibus *Forestus* , spinam dorsi inungebat , sed simul interna remedia , frictioni soli non físus , dabat.

Cardanus curat. 24. hora frigoris spinam unguento inungebat quod ex *Gentianæ succo* , *Oleo scorpionum* , & *Anserina compositum pinguedine* erat.

Riverius valde laudabat talia minus tanquam febrifuga , sed potius tanquam rigorem , febris symptoma molestissimum , mitigantia , ægrisque ad Diaphoresin disponendis apta.

Prosper Alpinus Emplastrum , quod Gallo Medico in secretis erat , ut singulare quid laudat , cujus hæc erat formula : *R. Farinæ tritici cribratæ , thuris masculini , ā. unc. II. f. cum succo Menthæ Emplastrum* , quod linea petia exceptum , calidum ante accessionem adhibeatur ad spinam dorsi , ad caudam usque , & quoad sponte decidat teneatur.

Et profecto confirmat experientia nostra laudes istas. Jam triginta anni sunt , quod summo effectui in quartana rebeli has frictiones institui. Tota Methodi hujus intentio cum ea methodi sudatoriæ supra expositæ , parte convenit , quæ frigus præcaveat , eliciat sudorem , sicque totam denique jugulet febrem. Tuto itaque in pertinaciori intermittente , quam fugare & licet , & expedit , adhibetur.

Quæsitum olim fuit an Inunctio & Frictio cum Mer-

curio fuget Quartanam? Creditum hoc antiquis Medicis fuit, quod viderent homines Lue Venerea & Quartana laborantes, ab utraque sanari 1^{mo} Decocto saturatissimo *Bardannæ*, in Vini & Aquæ a p. æq. facto, cui sub finem addebant *folia sennæ*; quod Decoctum sub stragulis calefactis sudores per horam unam alteramque fortissimos eliciebat, postque sudorem purgabat, & 15. aut 20. diebus continuis dabatur: postea vero detractis *foliis Alexandrinis*, & absque regimine ad sudores, dabatur adhuc per 30. 40. dies: quo modo a *Petro Pena* Chirurgo, *Henricus III.* Galliarum Rex a Lue celtica curatus legitur apud *Formium*. Hac porro Methodo etiam curari Quartanarios *Velschius* memoria prodidit.

2^{do} Ex *Varandæo*, *Borello*, *Riverio*, usu Decocti saturati *Rad. Chinæ* & *Antimonii*, patet curatam Luem gallicam fuisse: sed & eodem Decocto Quartanas brevi curari memorat *Aræus Libr. 8. de curandarum febrium ratione*.

3^{tio}. *Frictione Mercuriali*, ut in magna collectione de Autoribus Siphyliticis a *Luisio* edita, patet, Lues venerea curabatur feliciter: sed & simul observaverat *Ballonius Libr. 2. Epid.* & Luem, & Quartanam, hac inunctione una curatas esse. Unde eo pervenire nonnulli, notante *Velschio*, ut eodem remedio & Quartanam, & Luem Neapolitanam, indigere crederent: alii vero id saltem opinarentur, si Venere laborantes homines, simul paterentur Quartanam, eos & ab hac, & ab illa, instituta frictione mercuriali, liberari.

Hanc porro observationem generaliter veram non esse docuit *Ill. Præses* in Comm. ad §. 9. „Quartana Purgantibus, inquit, Vomitoriis, Sudoriferis, frustra tentata, imo per mediam salivationem, ut vidi, constanti typo pergens, tollitur cortice Peruviano.

Videntur ergo hæc sic concilianda esse, ut Quartana in homine Venereo, non a Lue Venerea, sed a causis communibus, epidemicis, oriunda, Mercurio non curari credatur; Quartana vero, quæ non ab his causis, sed ab ipsa venere ortum habet, una cum lue venerea, frictione mercuriali tollatur.

Octavo laudatur & *Adstringentium* usus. Dedit in sua Mat. Med. *Boerhaavius*, duplicem horum formulam, quarum prima est Decoctum admodum saturatum ex herbæ totius *Plantaginis latifolii unc. X.* & *Rad. Tormentillæ rec. unc. II.* Decoctis cum unc. XL. aquæ; cuius æger uncias tres singulo bihorio sumat: altera formula pulveris est, quem *Dr. I.* *Alum. rup. dr. II.* *Nucis myrist. & gr. XII.* *Boli armenie* componunt, hora ante paroxysmum sumendum.

Fuit etiam priscis hæc culta Methodus. Expedit in *libr. 2. de Morbis.* apud *Foësum pag. 471. 472.* videre iussum *Hippocratis*, de aggrediunda Tertiana post tertium insultum purgante, si id indicetur: sin vero non indicetur, Acetabulo *Radici Pentaphylli* in aqua tritæ: febre vero nec sic abeunte, sudorum ope internorum externorumque auxiliorum provocatione.

Dioscoridis & *Aëtii* monumentis constat idem. Laudata hic deprehendimus præter *Tormentillam*, aliasque, quæ formulæ *Boerhaavianæ* continent, *Agri-moniam*, *Genicula Verbenæ*, *Pentaphyllum*, *Semina Heliotrophii* &c.

Prodesse ejusmodi remedia egregie queunt, quando ægri a febre debilitati sunt, aut ex propria Diathesi solida flaccidiora, aquosiores humores, nervosque simul valde irritabiles, habent: roborantur quippe hinc solida, fluida condensantur; hominesque hoc pacto vel febrim melius sustinent, vel irritabilitate imminuta, novo vix afficiuntur insultu.

An ideo cortex *Quercus*, *Tamarisci*, *Capparidum*, febrifuga audierunt? An cortex *Peruvianus*, licet occulta sua virtute febrim æque in arido, ac in succulento corpore, curet, tamen etiam in hac octava Methodorum classe vi sua adstringente febrim abigat? Ruri profecto qui aptis præfidiis carent, vires corticis *Quercus*, aliorumque *Adstringentium* hunc in finem innocue explorare posse videntur.

Ultima tandem methodus ea est, quæ cortice *Kinæ*, seu *Peruviano*, febrem intermittentem sistit. Longo sermone hic opus non est, quum egregii viri *Morton*, *Sydenham*, *Richa*, *Torti*, *Collegium Wratislaviense*, *Mead*, *Huxham*, *Pringle*, *Werlhoff*, *Boerhaave*, & cum maxime Ill. L. B. van Swieten in Comm. ad Cap. de febre intermittente, nec non in iis, quæ ad Caput de *Hæmoptœe*; & de *Phthisi*, adnotata ab illo sunt, clara in luce rem collocarint. Quod si quis peculiariora quædam observata adjunxerit, ad quæ colligenda Nosocomium nostrum occasionem suppeditavit, clare intelliget:

1^{mo}. Corticem *Chinæ* saluberrimum remedium esse omnium febrium, quas abigere & licet, & oportet. Intermittentes igitur hic principio recensemus, quæ morbos tales conjunctos non habent, qui febre, ceu medicamine, indigeant.

2^{do}. Febres hemitritæas, quæ consuetis medicamentis cito non obediunt, in malignas, perniciosasque, brevi abirent.

3^{tio}. Febres illas, quæ internas suppurationes, ut puta *Pulmonis*, *Hepatis*, *Uteri*, *Renum*, aliorumque viscerum; quæque abscessus *Coxæ*, aliorumque articulorum, comitantur: eo quod humorum corruptioni, a resorpto acri nascenti, medeatur cortex, pus pro ichore aut sanie bonum conficiat, vires refocillet ægrotantis, & morbum sic aut diuturniore

tempore tolerabiliorem reddat, aut fortunatiore casu integre curet.

4^{to}. In febribus malignis, putridissimis, five continuæ remittentes eædem sint, five etiam continuæ. Ad confirmationem horum vide collectas observationes in *Rat. Med. Tom. 1. p. 145 ad 160. & pag. 219. dein p. 243. Tom. 2. toto capite primo. & pag. 177. cet., item a pag. 250 ad 254. Tom. 3. five Part. 9. pag. 108. Part. 10. pag. 226.*

In his porro febribus cunctis quantam Kinæ dosin exhibere oporteat, Medici judicio relinquere, quam definire, malim. Si febris intermittens tam vehemens, diuturna que sit, ut homo eidem sustinendæ vix ultra videatur; si sit Apoplexia, Colica, Pleuritis, Nephritis &c. periodica, de natura febrium intermittantium, remittentiumve, qualem *Morton, Sydenham, Huxham, Lauter* graphice descripserunt; si Malignarum febrium, si Variolarum, Morbillo-rum, & malignæ nonnunquam Scarlatinæ, si denique febris continuæ malignis stipatæ symptomatis, discrimina urgeant; Cortex Kinæ liberaliore dosi, uncia scilicet i. vel iß. tempore aut intermissionis, aut remissionis, exhibendus erit; quo futurus paroxysmus efficaciter præveniatur. Sin autem febris ejusmodi naturæ sit, ut eandem sensim frangi expediat, media uncia, minusque, detur: quamquam & minutiore tali dosi cortex febrim quandoque inopinato demat, ut in historia nostri juvenis p. 310. conspicuum fuit; qui unica media uncia febre exemptus omni erat, & eadem dosi quotidie continuata exemptus mansit; licet in eandem indigestione voluntaria meruisset illabi.

Primo tempore notæ in Europa Kinæ limitatio longe dosis erat: quod utrum præstantiori tunc temporis transmissio Cortici, an aliis causistribuendum sit,

fit, non inquiram; copiosiore saltem dosi nunc indigemus. Dum autem rite capta sit exhibendi ejusdem indicatio, hæcque indicatio urgeat, consueta dosi haud sufficiente, ad duplam, triplam, quadruplam, & ultra, dosin adscendamus oportet, ni velimus gangræna & morte ægrum brevi perire.

An quædam cum Cortice mista, vim ejusdem ita intenderent, ut longe minore dosi efficeret id, quod majore, sed solus datus, non præstaret? Necdum mihi experimenta sufficientia sunt, ut affirmare hic tuto quid auserim. Interim abesse nequeo, quin formulæ copiam lectoribus faciam, quam nuper mecum communicavit vir nobilissimus, & si quispiam mortalium unquam, fide dignissimus, qua ipse in longæva sua vita sæpius sibi febrim primo stitit, alterove, paroxysmo; & qua ipse, ejusque familia, & plures eorum, qui sic curati erant, homines numerosos ab intermittente febre, penitus, ac statim, percuraverunt. Est autem hæc: *R. Cort. Peruv. unc. β. Ocul. Cancr. dr. iij. Antimonii diaphoretici, Concharum calcinatarum ā. dr. ij. Rad. Gentianæ albæ dr. j. M. F. inde Pulv. n°. xij.* quorum æger mox a cessante paroxysmo unum sumat, & sic unum quovis quadrihorio, donec omnes duodecim absumserit: unde nocte singulo quadrihorio expergefaciendus sit ad capiendum pulverem, eosque etiam debeat assumere qui supersint, licet alter paroxysmus instaret, aut jam sæviret; donec duodecim absumserit. Repetitione nunquam fere opus est. Tantum levissimo purgante opus est lapsis 15. a febre diebus.


Occasione monitus hujus de levissimo (nam gravius resuscitandæ feбри esse posset) purgante 15. die dando, monere juniores Medicos debeo *Sydenhami*, aliorumque præstantium Medicorum præceptum, dandi purgantis aliquo temporis spatio a quiescente

febre elapso, salutare, imo fere necessarium esse, ne fiant recidivæ, aut alia mala. An hoc, quod de materie febrili aliquid supersit? An vero potius ideo, quod renatus a febre nimius sæpe appetitus quid indigesti collegerit, quod, ni blande expelleretur, aut febrim regeneraret, aut alia incommoda crearet? *Sydenham* mensem expectat, antequam hanc indispensabilis necessitatis purgationem det, ne maturius dando febrim resuscitaret sopitam. In hac formula 15. dies determinantur duntaxat. *Ill. Præses* duas modo expectat, ternasve septimanas. Tuto hunc sequimur, modo dies 14. recidivarum adeo ferax, præterierit. Consultumque est idem pluries posthac repetere.

Terminabo hoc caput necessario hoc corollario. Ex nonnullis supra recensitis, & aliis sæpe numero observatis, Medicinæ Tirones mecum animadvertunt a primo febris intermittens paroxysmo certam Diagnosin peti non posse. Ad trutinam enim signa omnia revocantes, a quibus *Galenus Libr. 2. de Crisib. cap. 4.* sic interstingui febres intermittentes censuit, ut qui ipsa prima invasionis die ejus determinare speciem nesciat, is nomen Medici non mereatur; ita de exceptione creberrima convicti fuimus, ut certam inde regulam cudere non potuerimus. Quare alienus quidem a sententia *Campegii, in Campis Galeni historialibus*, hoc a *Galeno* fuisse arroganter dictum, scribentis; nihilominus ejus sententiæ sum, quod intermittentes febres, nostro & tempore, & regione, iis, quæ a *Galeno* referuntur signis, persæpe interstingui sese non sinant. Contingere equidem potest; ut certo quodam tempore quævis Quartanæ iisdem ferme symptomatibus, eadem fere diei hora, paroxysmum ordiantur: fieri potest ut omnes tertianæ in eadem anni constitutione, diversis quidem a quartana, simillimis vero inter sese, phænomena

menis inchoënt, omnesque eadem præter propter hora, v. g. vespertina: Quotidianæ omnes suo pariter modo. Verumtamen hæ febres ipsæ observatæ aliis annis, seu epidemice, seu sporadice obtineant, sic in diversis variant, ut nullam certam determinandi suum, ex primo paroxysmo genium, relinquunt legem.

Tandem quod verbo supra jam monui, ex omnibus hisce observationibus perspicuum fit, intermittentes febres haud ita expertes periculi esse. quam vulgo quidem fertur. Plures Medici cum *Harvæo* notarunt hominem, quem febris intermittens perimat, frigoris tempore mori. Dum anno 1558. paucæ modo quartanæ, cæque facile sanabiles, *Delphis* observarentur, invenit *Forestus Hagæ Batavorum*, scilicet ad unius modo horulæ a *Delphis* distantiam, a quartana legitima, epidemica, multos mori. Et omnes illæ febres intermittentes quas vidimus demum in viscerum indurationes, in extenuationem, in icterum, in hydropem, mortemque demum, commigrantes; tandem & istæ, quarum pag. 332. meminimus, quid aliud clamitant?



C A P U T XIV.

De Morbis acutis.

§. I. *Pleuritis, in qua dolor ab inferioribus ad superiora thoracis transmigrat, nedum morbi cum levamine, sed aggravamine potius. Pathologica discussio de bonitate, aut pravitate hujus transmigrationis. Phænomena sanguinis, aliena a communi observatione, incompletam esse sanguinis historiam docent. Sed & ipsa hæc Pleuritis tota mirabilis; quod nec resoluta, nec*

intra consuetos dies critice soluta, tamen citra gangrænam, citra suppurationem, scirrhumve, spatio duorum mensium demum sic soluta critice fuerit, quemadmodum alias intra duas septimanas. Remedia adhibita. Laus Olei Lini. §. II. Peripneumonix historia. Repetitio moniti de incertitudine Phænomenon sanguinis in acutis; siquidem & dissolutus ille, & compactus, eodem tempore e vena fluxerit. Pulsus Peripneumonicorum durus. Cur Peripneumonix factum die 7. iudicium dubium esset? Examen practicum sudoris. Sanitas restituta visa per integram septimanam, deinde Recidiva letalis. Mira denuo phænomena sanguinis. Varia de calore hominis viventis, & recens mortui. Singularis lucta mortis. Anatome. Epicripsis morbi. Quid proprie malignitas in morbis acutis? An contra Boerhaavium semper verum, quod lata pulmonum cum omnibus, sive plerisque vicinis, concretio innocue feratur?

§. I. **A** cutorum morborum complures nos elapso anno exercuerunt, quorum plurimi exacte fatis leges Coctionis, criseos, criticæque evacuationis, secuti, Hippocraticarum Observationum, Præceptorumque, & stabilitatem, & æternitatem, abunde nobis confirmarunt; nonnulli vero aut nonnihil, aut notabiliter, a consuetis illis legibus deviantes, deviam quoque Naturam, ab Hippocrate *Libr. Epid. 1. pag. 941. 945. Epid. 3. pag. 1085. Epid. 7. pag. 1229.* quo ultimo in loco *Fullonis in Syro, & Nicoxeni in Olyntho* historias refert, descriptam, vivis depinxere coloribus; unus tandem, alterque, quid, Naturam superante morbo, contingere debere Hippocrates docuerat, clare demonstrarunt.

De classe priorum non est quod verba faciam; cum certam, & tutam, & felicem Medicinam, Hippo-
cra-

craticis deberi præceptis, quivis *Hippocratrice* edocti, norint: utilitatis plus habebitur naturæ deviantis prosequendo errores; ejusdemque, ubi insecuta mors fuerit, succumbentis ruinam speculando, addendoque accuratam eorum historiam, quæ in cada- vere detecta fuerint.

Juvencula 20. annorum 5. Aprilis 1766. post inso- litam octo dierum lassitudinem, postque debitum ca- tameniorum absolutum fluxum, sæva pleuritide si- nistri lateris correpta, altera necdum finita die in Nosocomio suscepta est. A fine diei secundi, usque ad quinti fere finem, quinquies secta ipsi vena est. Crustam pleuriticam gravem omnis sanguis habuit.

Ante quartam V. S. dolor fere omnis a latere in- feriore ad sinistrum sterni latus, humerumque, trans- migraverat, quæ Clarissimi *Trilleri* observatione, bo- na metastasis est; sexque suorum eadem evasisse notat: *Ill. Præses* scribit suorum periisse neminem, quibus illa contigisset: *Hippocrates* Libr. de *Vitæ Acut.* ut malam consideravit eandem. In nostra ægra tam prava erat, ut tussis omnis, ac fere omnis respiratio, cohiberetur, Et bonam, & malam hanc transmi- grationem doloris, pluries in praxi observavi.

Quæ causa hujus differentiæ? Ex laudatis mox magnis viris *Trillero* & *Ill. B. van Swieten*, bona fuit transmigratio hæc doloris observata 6^{ta} die; non tol- lens quidem morbum, sed bonam crisin prænuntians: Ægra nostra medio quinto die supernos hos est exper- ta dolores. In *Cl. Trilleri*, & *Ill. Præsidis* ægris transmigrationem hanc morbi comitatum levamen videtur, cum post eandem venam ultra non secue- rint: Ægra nostra ad doloris ascensum suffocabatur fere. Hinc debui mox largam evacuationem sangui- nis facere, ex *Hippocratis* laudati mox textus præ- cepto: *Neque copiosum sanguinem detrahere cunctandum est.*

est, inquit. Ratio ergo patet diversitatis observationum.

Dolor porro ægræ nostræ sexto die a superiore parte thoracis denuo ad ejusdem mediam inferioremque migravit plagam, morbi cum augmento: quare & quinta sanguinis missio institueretur oportuit.

Sanguinem nunquam huic juvenculæ miserant; hinc a prima & altera ejus missione animo linquebatur. Sed & hinc sanguis nonnisi guttatim juxta brachium fluxit. Nihilominus crustam pleuriticam brevi formavit, $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$ crassitie totius insulæ habentem.

In tertia V. S. sanguis continuato jactu exsiliit, donec effluxissent uncia septem: guttatim deinde uncia septem aliæ exstillarunt. Sanguis tamen hic æque densam firmamque crustam, quam ille, formavit. Animo non defecit.

In quartæ V. S. ultimum vasculum jactu veloci sanguis fluxit, in alterum, & primum, guttatim. Attamen vas primum omnium densissimam crustam gessit, fere talem & alterum, longe tenuiorem tertium.

In V. S. quinta omnis sanguis aut guttatim, aut brevi quandoque lentoque jactu effluxit, ut perpetuo brachium lamberet; in vas ultimum omnium lentissime. Intra horam omnis sanguis suam jam formaverat integram crustam: eamque omnium densissimam compactissimamque, medietatem totius massæ habentem, ultimo in vase, in quod omnium tardissime erat exceptus.

Observationes Sydenhami & Boerhaavii, de crusta densiore ex velociore jactu cruoris, deque tenuiore exstillante eodem, sunt verissimæ, aliisque etiam practicis confirmatæ: verum ut in femina hac, ita in perplurimis aliis, observationes contrariæ adeo

numerosæ sunt, ut neque ex prioribus, neque ex posterioribus, cudi ulla regula possit. Dudum simile quid observaverat *Trillerus*.

In vase medio sectionis quintæ crassamentum sanguinis, seu insula rubra, vix scissile, in vase tertio facile solubile.

Obscurant hæc omnia sanguinis obscuram historiam; quam inceptam olim, sed abruptam, dato otio retexam.

Calor usque ad 40. morbi diem mane, quam fero, minor: mane quippe fuit 98. 100. 101. graduum; vespere 102. 103. 104. 105. exinde autem mane ac vespere æqualis 98. 99. 100. 101. graduum.

Sputa usque ad 44. morbi diem mere aquosa, & spumosa; exceptis diebus 8. & 9. quando leviter suppurulenti quid habuere; exceptis quoque diebus 18. & 19. in quibus semicocta nonnulla apparuere. Die 44. cepit quotidie plus cocti quid in multis sputis videri; ad 51. semipurulenta jam erant; ex illo die sæpe minus, aliquoties probe, cocta, die 58. 59. 60. 61. copiosa, coctaque: exinde sensim tussis & sputa minuebantur, & cum restituta sanitate optima, die 71. & seq. nihil tussis fere, excretionisve, ultra observabatur.

Alvum coctam die morbi 8. habuit, subinde talem adhuc postea; passim vero tenuem, crudam: ad finem vero morbi, cum sputis coctis, & coctior alvus fuit.

Sudorem nec levantem, nec judicantem, habuit die uno critico, nempe quinto; duobus diebus minime criticis, scilicet 10. & 26.

Quoad urinas; unam bonam hypostaticam habuit die 10. unicam & 14. 16. 17. 18. & 19. quatuor; unam 20. & 21. duas 22. tres 23. quatuor 24. Et excepto die 34. in quo omnes summæ cruditatis erant; excepta quoque una alterave urina per sequentes

tes dies; omnes urinæ pulcras subsidentias exhibuerunt: sabulum rubrum nonnunquam habuerunt.

Igitur nulla critica evacuatio sputorum, quæ morbum solveret; nulla quoque evacuatio critica per alias vias emunctorias: siquidem quomodocunque coctæ adparerent aliæ evacuationes, tussis perpetua ac molesta, pulsus semper naturali major observata celeritas, calorisque justo altior notatus gradus, morbi non evacuatam esse materiem abunde testabantur.

Interim pluries quærebatur Diagnofis & Prognofis; quæfita fane sæpius, inventa tamen non est.

Confulebamus graviffimum longumque *Hippocratis* textum 402. *Coacarum*: addebamus *Boerhaavii* de Pleuritide caput; in quo, quidquid in praxi tota notum est, concinnitate, & perspicuitate admiranda, collectum reperitur: at vero nihil ex iis ad casum nostrum determinabile erat. Pleuritide nec resoluta, nec critice soluta, aut Gangræna, aut Scirrhus, aut prava Metastasis, aut suppuratio timenda Phthifisque, est. Sed horum morborum omnium phænomena ad nostram ægrotam adplicantes, applicationemque hanc crebro, serioque repetentes; non reperiēbamus vel unicum horum morborum, quo eandem laborantem diceremus. Febris enim proprie dicta non adfuit; non ejus post partum, motumve exacerbatio; non genæ rubentes; nec sudor, nocturnus maxime; nulla major emaciatio, aut hectica dispositio; nulla difficultas cubandi in latus utrumque, dorsumque; hinc nulla timendarum a non soluta Pleuritide ægritudinum inveniri in ea poterat. Dolor, febris, inquietudo, quæ in his morbis augentur, brevi rupturo abscessu, hic ad 40. diem non observabantur, ubi cocti quid prodire cepit.

Igitur Naturam hic multum a consueto suo tramine deviare, in confesso erat; quod enim juxta ordi-

narias ejusdem leges expectari oportebat, non est fecutum. Est certe longe major aberratio nostro in casu, quam in eo *Anaxionis*; qui a Pleuritide, sine alio insecuto morbo, die 34. judicabatur, *Epid. 3. Sect. 3. aegr. 8.* Femina enim nostra, citra ullum nati ex Pleuritide alius morbi signum, cepit ab ipsa Pleuritide judicari die 51. & perfectius circa 60. diem ita ut perfecte sana die 71. domum rediret.

Si quis forsan rogaverit quo genere remediorum usi fuerimus, ut morbus adeo pertinax, & diuturnus, sine alio morbo perfecte judicatus sit? ea ordine dabo. Missus sanguis quinquies fuit, ut enarravi. Optimi *Trilleri* exemplo, præter V. S. ex brachio lateris affecti, eam quoque pedis tentassem: cum vero nostra ægra linqueretur animo prioribus ex brachio V. S.; crebriusque homines animo linqui soleant pede, quam brachio, venam secti; eam brachii perpetuo tudi. Loco dolenti primum fomenta, ac cataplasmata, admota sunt; his minus opitulanti-
bus emplastrum, quod ex $\frac{3}{4}$ Meliloti, & $\frac{1}{4}$ Vesicantis compositum, applicabatur; morboque pertinaciter furente, vesicans utrique impositum cruri fuit. Mirum quippe tibias inter pectusque consensum in morbis miratus *Hippocrates* fuerat; confirmaverat *Baglivius*; & celeberrimus *Trillerus* Vesicantia Pleuriticorum admota cruribus deprehenderat perquam utilia. Enemata multa pro re nata immissa sunt, laxantia, emollientia, paregorica. Decocta & infusa herbarum, nunc emollientium, nunc attenuantium, expectorantiumque, cum Melle, cum Oxym. aut simplici, aut squillitico, stibioque diaphoretico: numerosæ mixturæ ex Aquis pectoralibus, cum eodem stibio: Kermes mineralis ingens quantitas: Mucilaginis paregorica mista ad noctem; aut & bono effectū pilula gr. iijß massæ pil. de Styraçe, una, altera, tertiaque: oleosa multa tum
ore

ore, anoque corpori ingesta, exteriusque corpori applicata, ac maxime oleum Lini; quod teste *Tournefortio Lettres du Levant* N^o. 19. „ Armenii domi „ perpetuo fervant, adhibentque, ac propterea „ Pleuritidem, cui inconstans clima impense favet, „ & qua alii impetuntur, raram experiuntur: jamque scripserat *Gesnerus* oleum Lini loco olei amygdalini epotum, egregium remedium in Pleuritide esse. A die morbi 34. ad 71. usque, usa est alternatim Mistura cum oxym. squill. stibioque diaph. non abluto, & Infuso pectorali; paregorico pæne omni nocte, quum alias tussis omnem fugaret ab oculis somnum. Plerumque gr. iijß pil. de Styrace sufficiebat.

Cura autem ventriculi peculiaris habenda erat, qui multis ab annis miserrimo victu depravatus, a principio morbi, etiam jam antequam in Nosocomium inferretur, sæpius de die in vomitum prorumperet. Paregorica juvabant, & post primum morbi impetum repetita sæpe purgatio; quæ sic adornabatur: R. Rhei. dr. ii. Vesperi affunde aquam fervidam, sequenti mane momento coque, colaturæ unc. iv. adde syrupi Melissæ unc. i. Aq. Cinamomi unc. ß. cujus mediam partem ilico; & si non operaretur, trihorio post alteram fumeret.

§. II. Faber lignarius, Bavarus, 45. annos natus, qui multo itinere pedestri, multis aëris injuriis, sub dio in itineribus dormiendo, toleratis; victuque præterea duro, firmam corporis compagem, duratamque reddiderat; citraque morbos notabiliores ad hanc ætatem pervenerat: id modo in Anamnesi retulit, quod a 20. annis, quavis hyeme, longo laborare catarrho soleret, ab eoque bis ter sic afficeretur, ut duobus tribusve diebus cogeretur lecto inhærere; quodque surdaster a decennio esset.

Cum proxime elapsa die 1. Aprilis ex suburbio
in

in urbem cucurrisset anhelus, tenuissimæ suppellectilis subhastationem deprecaturus, lassitudinem talem in reditu patiebatur, ut in media via paulisper interquiescere, ac confidere, cogeretur; vespere tussim solito frequentiore, & cephalalgiam experiretur; noctemque transigeret irrequietam.

Die 2. Aprilis, cunctis subhastatis, nudus cum uxore & infante ædibus expellitur, mendicare coactus: ipsoque hoc die gravi Cephalalgia, frigore, æstuque corripitur: die 3. Aprilis pariter. Aprilis 4. die remedio quodam sublevatus, gravi demum febre prehenditur sub noctem. Paulo mitius quinto die; 6. autem gravius.

Adiit tunc Nosocomium Hispanicum; unde gestatorio ad nos delatus est, Peripneumonia laborans, quintus morbi dies decurrebat.

Consuetam methodo inflammatoria emendatio observata tanta est; ut sexto die humorum coctio, septimoque critica evacuatio, & sudore, & urinis omnibus hypostaticis, iudicium videretur attulisse; ita tamen, ut, ablata febre, tussis quædam sicca perseveraret. Sanitatem cæterum integram septem dierum spatio videbatur adeptus.

Notavimus in hoc morbo *primo* sanguinem de vena dextri brachii die 5. missum, solutum omnino fuisse, cum crusta subviridescentis coloris, flava, tremula, non coriacea.

Cogitare hic quis posset Peripneumoniam eo usque jam pervenisse, ubi toties eam *Baglivius* miratus erat, cum sanguine scilicet soluto, aquoso: verum eum Peripneumoniam statum negabat pulsus fortis ac durus; negabat morbi ipsius conditio, ut mox patebit.

Sanguis octo elapsis horis ex lævo brachio detractus, mox a principio habuit & crustam durioram,

& firmitus crassamentum, sic ut examinando non, quemadmodum prior, diffunderet.

Incautis ex conspecto priore sanguine contraindicare Morbus & sanguis videri poterant; hoc incrassantia, attenuantia illo, naturaliter indicante. Nos vero multiplici experimento edocti, ut adhuc nuperrime in relata pag. 338. Pleuriticae historia, solam morbi indicationem explevimus.

Confirmavitque secundo missus cruor inspissantium indicationem, si eam essemus sequuti, erroneam futuram fuisse.

Monere autem hac occasione debeo, sanguinem primis a missione horis certum de se iudicium perpetuo haud praeberere: videri quippe principio dissolutum omnino, postmodum vero naturaliter, imo praeternaturaliter, incrassari: unde si breviori tempore ante lectionem sanguis ægrorum fuerit detractus, exhibeo quidem illum Auditoribus, & per pellucida vasa cum ipsis contemplor; nonnunquam vasculum unum vertendo, dividendoque examino; reliqua vero vascula in sequentem servo demonstrationem.

Notavimus *secundo* in hoc morbo, in quinto Peripneumoniae die pulsum magnum, fortem, eundemque durum; die sexto debilem, inaequalem omnimodo; die autem septimo fere naturalem. Unde confirmatur id, quod Part. 9. Cap. 2. §. 9. tot argumentis urfi; scilicet pulsum debilem in Peripneumoniae definitione inveniri non oportere.

Advertimus *tertio* coctionem, quæ quocunque morbi die fiat, semper bona est, nostro in ægro die sexto manifestam in humoribus, functionibusque plerisque; pulsus enim debilis & inaequalis, eodem die magis procedente, emendabatur; nullam vero sputorum coctionem vidimus.

Advertimus *quarto* sudoribus universi corporis in die septimo, vere critico, morbum judicatum videri potuisse; maxime cum eodem die, binisque sequentibus, urinæ fere omnes hypostaticæ essent.

At vero sudor idem die septimo animadversus, fuerat jam notabili diei sexti parte observatus; unde suspectus ille, infidusque. Quin & aliud quid sudorem hunc reddebat suspectum; Custodes ægrorum hyemalia lectorum tegumenta necdum mutaverant; nec attenderam ego. Cum porro caloris; ineunte Aprili, 63. gradum jam notaret Thermometron, egoque casu tegumenta ægri debito graviora deprehenderem, subdubitare cepi num hisce potius, quam Naturæ, adscribendus sudor non esset? Præcipue cum jam hinc inde quædam Sudamina comparere viderentur.

Hinc stragulorum crassorum alterum auferens, tenuius substitui; sudore autem æque profuso, abstuli & hoc tenuius. Continuabatur sudor in initium usque diei septimi: deinde subsequēbatur mollis aliquot horarum transpiratio; tandem in medio septimo die sudor multus spatio quinque horarum: sub quo sudore, & altero, tertioque die postea, quæ sexto die comparere sudamina ceperant, evanuerunt.

Hinc ad leges *Hippocraticas* omnia examinantes, hærebamus principio ambigui, utrum sudor diei sexti, ut infido die prodeuns, condemnandus esset; an vero minus pravus, utpote eo, quo dixi, modo, genitus, foret habendus? Attamen modicis sub stragulis animadversus die septimo sudor quinque horarum, una cum hypostatica urina, cum absentia febris, cum notabili functionum emendatione, judicatorius haberi posse videbatur. Equidem rigor sudori non præcesserat; sed alvus solutior, legibus *Hippocraticis*, rigoris excluderat necessitatem.

Verum sputorum perseverabat, alvique cruditas.

Amamus profecto coctionem, coctique evacuationem, per omnia corporis excretoria loca cernere; aut saltem si per unam, pluresque vias, excretio cocti prodeat, per alias minime, ut per has saltem non prodeant cruda, optamus. Sed in comperto hoc practicus est, & sæpius in Nosocomio demonstratum, quod prægressis signis Coctionis, ac crises, evacuationes criticæ notabiles sic emendarent vires, ut & hæ fierent aptæ, quæ paulatim reliquas coquerent, & eliminarent, cruditates.

Ambiguum igitur iudicium fuit. Attamen pulchra fere omnium, ac maxime pectoris, functionum restitutio, continuatio urinarum hypostaticarum die 8. & 9. plus dabat spei, quam metus.

Spem autem dies 14. illudit; in quo febris rediit, mutata quidem a priore, sed & ideo perniciosior. Incepit pulsu celeri ac duro, cephalalgia valida, siti intensa, lingua arida ac rigida, comate. Tussis increvit, excernens nihil præter quædam tenuia ac spumosa; semel autem quid mucosi, cum lineis sanguinis. Alvus interim cocta prodibat; urinæ etiam copia, odore, colore, bonæ, sed cum pertinaciter suspenso manente enæoremate. Vena secta est ad unc. ix. quantitatem.

Die altero recidivæ, totius morbi 15., aderant vomendi conatus, inquietudo vehemens, febris singulo bihorio sævitie auctior, moderatior: cocta interim alvus.

Die 3. Recidivæ, die 16. Morbi, febris enormis, intensus calor, lingua aridissima, ac rigida. Secta denuo vena effluxere sanguinis uncia xvij. posteaque vesicantia admota sunt. Expectorantia data, & simul ad æstum vehementem contemperandum copiosum rob sambuci, ac nitrum. Tussis, vomituriatio, Febris, ad hæc mitescebant; Alvus vero, quæ ab aliquot diebus cocta fuerat, jam cruda iterum & tenuis.

nus. Vespere symptomata omnia graviora, insuper singultus, æstus intolerabilis, pulsus celer, plenus, ac valde durus, calor universus, vires bonæ, tertiam in hac recidiva sanguinis missionem suaserunt.

Die 4. recidivæ, morbi 17. inchoante, calor 108. graduum in thermom. *Fahrenheitiano*, qui cum 34. in *Reaumuriano* correspondet. Symptomatibus iterum vehementissimis, cum forti duroque pulsu, quarto misimus in hac recidiva sanguinem, copia xv. unciarum. Calor quidem inde sex gradibus minor, sed præcordia, quæ eo usque anxietas tenebat duntaxat, jam dolor vexat, vomitusque. Sic quidem, ut topicam hic suspicaremur phlogosin. Alvus nocte ac mane reddita quinquies est, flava quidem, sed tenuis, nihil mista; cum pluribus massulis viridibus, compactis, quales in cadorem olei fundo reperire est: oleum porro ore anoque sumserat multum.

Ad finem hujus diei 4. recidivæ, ad diem 17½ totius morbi, unico quadrante horæ ante mortem, calor 100. graduum erat. Lucta mortis horæ duravit quadrantem. In hac lucta pulsus, non qualis esse solet celerrimus ac debilissimus, verum lentus admodum, nec parvus, & vix inæqualis. Plus quippe decies ego, aliique, illum exploravimus. Respiratio autem tam lenta, ut semel alta voce trigesies & ter numeraverim inter duas respirationes. Moriens non convellebatur; brachia tantum in rectitudinem exporrigebat. Oculi bihorio a morte veluti hominis viventis; nihil enim opacati aut corrugati erant. Hoc phænomenon etiam altero die a morte observavimus in aliis.

Iteravimus denuo experimentum mensurandi mox a morte caloris, spatio 2½ horarum, singulis 4½ minutis gradum examinantes, & in charta notantes. Thermometrum nostrum indiget 7½ minutis ut calorem

rem hominis indicet, addendo gradus duos ad notatum in eo gradum. Si 15. minutis applicatum, beneque tectum manet, haud ascendit ultra numerum priorem, cui duo gradus additi fuerant. Notabat autem gradus hos: 88. 95. 96. 98. 97. 98. 97. 98. 98. 97. 99. 98 $\frac{1}{2}$. 98. 98. 98. 98. 97. 95. 95.

Supereft examen sanguinis in recidiva miffi. Sanguis primæ miffionis, mox ubi in vafa exceptus erat, contractam habuit ac densam cruftam, eamque toto in ambitu fimbriatam.

In fanguine fecundæ miffionis crufta non contracta, non fimbriata, fed ut in morbi principio, crufta, & craffamentum, cum omni vitreæ fcutellæ ambitu cohærebant. Elapfis horis quinque, cepit in vafe fecundo cum Crufta, tum Craffamentum, fe ab uno vaforum latere feperare, feque contrahendo exprimere ferum. Elapfis horis 14. idem observari ceptum in vafculo primo; nondum vero in vafe tertio & quarto. Crufta quarti vafis viridescit, fere transparet, crassitudinemque mediæ totius insulæ habet.

In fanguine tertix miffionis, post quietem 10 $\frac{1}{2}$ horarum, nec contractæ cruftæ, duræve; nec tamen glutinosæ. Crassamentum 1. 3. & 4. vasculi dissolutum; vasculi secundi valde tenax. Passim, quo crufta minus in lardum contracta est, eo minus solet & contractum, & durum esse ejusdem crassamentum.

Tandem ultimæ venæ sectionis sanguis, post horæ 1 $\frac{1}{2}$. quietem, tribus in vasis collectus, habuit cruftam densitate crassiore quam esset altitudo crassamenti, tremulam vero, nondum consistentem; quomodo posteriore examine habuerit sese, doleo referre non posse, eo quod id chartis mandare neglexerim, nec sat accurate suggerat memoria.

Notavimus itaque primum recidivæ sanguinem eo prioris morbi magis fuisse phlogisticum: deinde & so-

solutum sanguinem, & compactum in eadem venæ tusione prodire: præterea sanguinem unius scutellæ longe plus indiguiffe temporis, quam aliûs, ut se contraheret: denique ab omnibus his V. S. pulsum plenum fortemque permanfisse, ad usque breve mortis luctamen.

Calorem soli attritui non deberi, quod toties urfi, repetita exploratio cadaveris ultra bihorium producta, confirmavit denuo.

Sed quanta vis in febre caloris! In hac recidiva plus quatuor libris sanguinis detractum est, dum interea calor, naturali calore humano semper superior, deprehendebatur. Quanta humorum aut copia, aut rarefactio! Post demtas 50. sanguinis uncias, pulsus ad mortem usque plenus ac fortis fuit.

Anatomen elapsis 23. a morte horis instituimus. Oculi jam opaci & corrugati. Venter nihil inflatus. Caro musculosa multa, firma, exiguus adeps.

Aperto Ventre Viscera sic sita, ut Hepar ingens, ampliusque Ventriculus, totam anteriorem universi epigastrii capacitatem explerent; & ut intestinum Colon, sub his depressum, umbilico fere accumberet. Dolor igitur Colicus fallere nos potest, coli ad umbilicum situm vix suspicatos.

Colum hoc arctum valde, & sub Hepate, & sub Liene, se longa sui parte supra sese reduplicabat: ut causa magnorum morborum existere potuerit, haud extiterit tamen. Vide Tab. I. Fig. F.

Ileum intestinum semipedis longitudine ex Inflammatione jam purpurascebat, variis præterea in plagis levius inflammatum.

Hepar ingens lobo minore explebat mediam Hypochondrii *sinistri* latitudinem: alteram mediam hujus Hypochondrii latitudinem Splen, triplo major solito, occupabat.

Ventriculus duas liquidi mensuras, scil. octo li-

bras medicas, mensura capta, continere valens, suo minore, eaque sinistriori parte supra, seu potius ante, lobum minorem Hepatis, & ante Lienem collocatus, reliqua sui parte eminebat juxta jecinoris crepidinem, suoque Pyloro infra Jecur decurrens, abibat in Duodenum: quod quoque digiti dimidii longitudine horizontaliter versus Spinam decurrens, descendere demum incepit. Inflammatio aderat in ea Omenti portione, quæ Duodeno pro Mesenterio est, uti & in ipso Duodeno.

Idemque Ventriculus a fundi sui parte illa, quæ costis sinistris accumbit, per totam fere superficiem externam posteriorem, admodum inflammatus fuit, & magis adhuc in eadem superficiem internæ plaga.

Renes boni, magni. Vesica urinaria lotio turgida.

Pulmones firmissima cellulositate concreta sic cum Pleura, cum Diaphragmate, Mediastino, ac Pericardio; ut multis in locis sine horum, aut Pulmonis laceratione, divelli non possent; hocque æque lævo, quam dextro in latere: in sinistro autem latere tantum modo versus costarum arcum, spatium duos fere pollices longum, latumque, erat ab accretione liberum.

Cor sinistrum vacuum; dextrum sanguinem, non coagulatum, habuit; sinus dexter polypum album, qui lente extractus, massam polyposam pedis longitudine ex ambabus jugularibus ducebat, cum rami, quo jugulares inter se communicant, abrupta portione.

Bona dura mater: Pia autem sanguine valde infarcta tota; maxime autem ad lobos cerebri posteriores. Polypus quasi vermis in sinu longitudinali. Ventriculi cerebri superiores ne guttulam aquæ continuerunt; nihil aquæ tertius ventriculus, nihil quartus. Totum Cerebrum siccissimum. In capitis

detruncatione, nihil ex illo; nihil ex theca vertebrarum; nihil ex cranio, dum ferra dividebatur, extillavit.

Ex quibus omnibus patet infidam, infido in die, crifim fuiffe, quæ fudoribus, die sexto inchoantibus, apparuit: partem materiæ morbofæ coctam folummodo fuiffe, & crifi evacuatam; at vero magnam crudi copiam alte infixam manfiffe, quæ primo alternoque quaternario quieta, fymptomata nulla excitavit; inchoante vero tertio quaternario moveri cepta, corpus vehementer turbavit, fanguinem inflammatorie corruptit, inflammatione dira affecit piam Matrem, Ventriculum, Inteftinorum varias plagas, quarum una in latam gangrænam verfa, inter caufas mortis recenferi potuit. Sanguis idem ad mortem ufque inflammatorie fpiffus, per minima vafa impenetrabilis, inter mortis caufas certe erit annumerandus.

Hæc demum vere maligna febris fuit, vero fenfu eo, quo τὸ κακὸνθές intellexerit *Hippocrates*, poftque eum *Galenus*, omnes *Hippocratis* fectatores, & ex cunctis his compendiofè *Boerhaavius* *Inf.* §. 919. Moneo hoc ideo, quod videam a nonnullis eum morbum proprie, uniceque, haberi malignum, qui humores diffolutos habeat, qui varias maculas, papulasque, expellat, qui ab ipfo morbi initio notabilem virium projectionem comitem habeat: dum interea vera malignitatis in acutis fignificatio denotet caufæ morbi vehementiam; graviolem functionis cujusque, maxime autem vitalis, læfionem; pertinacem adverfus felectiffima, optimeque indicata artis præfidia, refiftentiam; ac fymptomata non tantum ejus morbi confueta, fed variata, aut omnino alia, aut plane anomala.

Situs magnitudoque Jecoris, moles ingens Lienis, Coli intefitini tranfverfus decurfus adeo profundus,

monitum confirmant, quod toties repetivi de morborum in visceribus sede circumspēcte, ac sæpe dubitanter tantummodo, determinanda.

Pulmonis arcta, ac indissolubilis cum omnibus vicinis partibus concretio, malum videtur a longa die natum. Quare & 20. annorum spatio, præ pectoris affectione; laboriosas hyemes transgisse videtur. Et in ultimo morbo nimis adhærentes pulmones cruori phlogistico suscipiendo, trajiciendoque ineptiores, letaliter demum infarcti fuerunt. Centena fane exempla sunt, quæ me impediunt assentiri illis, qui latas hæc pulmonum adhæSIONES inculpate a mortalibus ferri asseruerint.

Siccitas insolita Encephali, an non a defectu secretionis, ad quam phlogisticus sanguis arteriosus plane ineptus fuit?



C A P U T X V.

De Ileo Morbo.

§. I. *Ileus morbus 6to. die letalis, cum auxiliorum adhibitorum recensione. Epicrasis morbi. Anatome cujus notabilis pars exhibetur Tab. I. Fig. E. De aqua frigida in Ileo. In Ileo letali etiam alvus reddi potest. Varius in hoc morbo Gangranæ gradus. Omenti absentia Colicæ causa. Conspectus a morte haud infrequens ibi cordis utriusque perfecte vacui.* §. II. *Ileus letalis alius, natus post triennem, & quidem primo periodicam, sub finem autem continuam, Ventriculi Tympaniam. Cum hoc Ileo etiam tenuium Intestinorum & Tympanitis, & Inflammatio. Memorabilis in hoc Ileo Hernia Entero-mesocolica, una cum monstroso Ventriculo, Tab. II. Fig. I. II. III. exhibita.*
Epi-

Epicrisis totius hujus historię. Viscera a morbis sua sede exturbantur. Gangræna sine signis suis letalis.

§. III. *Ileus morbus octavo die letalis, assumpto etiam Mercurio. Anatome. Figura exhibens duodecim viros Coli intestini flexus. Vid. Tab. III. Fig. Epicrisis. Varię considerationes super causa proxima mortis in hoc homine, & in aliis hoc morbo detentis.* §. IV. *Ileus morbus curatus, assumpto Mercurio. Quædam de Fumo Tabaci immisso. Mercurii per 14. dies in corpore mora.* §. V. *Ileus morbus assumptis vij. unciis Mercurii curatus. Inquisitio varię doseos Mercurii in hoc morbi a variis exhibitæ. Quæstio agitur num a Mercurio hic morbi nervorum timendi; eaque occasione de Auro deglutito loco Mercurii. An Mercurius frigore noceat? demonstratur frigore potius prodesse: & sic convenire cum Methodo altera Hippocratis curandi Tetanum. De acribus umbilico applicandis. De Machina Italica.*

§. I. **I**leus frequens morbus, semper terribilis, creberrime letalis, quamvis a me in Tomis prioribus periodici hujus operis sæpius recensitus sit, tamen ob recentiores, eosdemque notabiles admodum casus, de integro me cogit de sua ipsius Tyrannide, deque Homicidiis suis, nonnulla propalare.

Juvenis 19. annorum, ileo morbo elapsa æstate periit. Vivo non adfui: quantum autem expiscari ex illis potui, qui eum & noverant, & amicitie causa in morbo inviserant, hecticus ante quadriennum a Medico habitus fuerat, idque dimidii spatii anni: exinde paulo rectius se habere visus, tussi non frequenti quædam tenuia reddere consuevit, linguam fissam perpetuo conquestus est, ac frequentioribus Colicis doloribus obnoxius vixit.

Anno 1766. Augusti Mensis die 5. consueta sua
Co-

Colica , & modica febre , nocte corripiebatur. Clysmate mane die 6. Aug. immisso, mitior dolor, vespere denuo sævior fuit. Dato tunc emolliente decocto, cui Chamomillæ flores infusi, principio levare visus est, deinde autem minime.

Die 7. Aug. Medicus ordinarius arcessitus, præscripsit Misturam ex *Aq. Flor. Chamomillæ unc. vj. Magnesiae nitri dr. iij. Salis polychr. dr. j. Syr. Althææ unc. β.* cujus sumsit cochlearia tria singulo bihorio. Jussitque Abdomen inungi unguento composito ex *Ung. Dialth. & Flor. Calend. ā unc. ij Camph. scrup. ij.* Præterea immitti clyisma emolliens præcepit. His non levantibus, decoctum emolliens cum *Tamarindis* bibit ad noctem; postquam alvus, quæ nulla eo usque fuerat, liquida copiosaque prodiit.

Die 8. Aug. Febris magna, duro cum pulsu, fixoque ad latus Ventris dextrum dolore. Mistura dicta *Hoffmanniana* data est; Decoctum *hordei* quoque, cui admistum *Oxymel*; nec non pulvis, quem componebant *scrup. duo Magn. Nitri, gr. v. Nitri puri, & gr. x. pulv. Haly:* erat mane hic pulvis, & vespere sumendus. Varia insuper & Cataplasmata, & Enemata præscripsit.

Die 9. Aug. æger summo mane frigidam aquam clam bibit, brevi autem post ventre immaniter doluit, vomuit, contremuit, friguit. Interea dum Medicus expectabatur, sumebat consilio amici *dragmam Rhei*, & Misturam compositam ex *Mentha cum opii granis duobus*; repetivitque clyisma. Tensus jam venter erat ubique; minusque latere dextro, magis in medio, dolebat. Tandem Medicus accedens, primam demum Venæsectionem instituit, *Hoffmannianam* Misturam continuaret, suasit, *Hordeique Decoctum. Emulsum* præterea dedit, *cujus Libræ dr. vj. Syr. Diacodii additæ.* Repetivit denique Enemata &

Cataplasmata. Nox pessima. Pulsus celerrimus, parvus, durus.

Die 10. Aug. Exp. Medicus Misturam dedit compositam ex *Aq. Scorzonæræ unc. vj. Magnes. nitri dr. ij. Salis. polychr. scrup. ij. Nitri puri scrup. j. Camphor. gr. ij. Syr. Althææ unc. β.* cujus duo cochlearia quovis trihorio sumenda essent.

Deinde *℞. Auri fulminantis gr. vj. Arcani duplic. scrup. β. Nitri puri gr. v.* Eo die ter hic pulvis sumtus est.

Die 11. Aug. pulveres *Auri fulminantis* repetiti. Accessit ad morbum Ventris Peripneumonia. Ad septimam vespertinam moritur, expletis ferme sex morbi diebus.

Cadavere potiri, nonnisi elapsis 42. a morte horis, potui; hinc calida hac tempestate jam fætuit immaniter.

Et in periscindendo Abdomine, clauso adhuc Peritonæo, multus,isque fætidissimus, aër, ex tunica adiposa exhalabat, bullasque veluti Emphysematosas formabat; quales alibi, sed longe copiosiores, observasse me retuli *Tom. 2. cap. de Ileo.*

Aperto abdomine omenti longitudo, ut ut explicata, apparuit vix pollicis lati; ita ut nuda hic hæserint intestina.

Colum intestinum defiguratum sic, ut verbis describi nequeat: unde Tabula I. Fig. E. idem depinxi.

Ad omnes hæc miras Coli reduplicationes inflammatio levior detegebatur: materies autem inflammatoria sanguinis transsudando genuerat crustam, qua illæ Coli Reduplicationes secum mutuo agglutinantur.

Obex autem durus in hisce Reduplicationibus nullus est repertus.

Ileum intestinum duobus potissimum in locis dire-

in-

inflammatum reperiiebatur, ac colore hic purpureo, illic livido, gangrænosum. Scilicet in latere dextro infimo, longitudine duorum pedum; & in eodem latere, sed altius, ac secus umbilicum, longitudine pedis. Fuerantque ambo hæc loca doloris in ileo morbo sedes. Crusta flava, quæ in Colo, etiam hic, multas tegebat intestinorum plagas, inflammatas potissimum illas, gangrænosasque: aderatque & ad Mesenterium.

In plagas ilei intestini inflammatis nulla inventa coarctatio est, nulla Introsusceptio, nec, quæ transitum denegare potuisset, dura materies: æqualem hic cum cæteris intestini partibus intestinum habebat diametron.

Ventriculus, valde expansus, habebat a facie sua anteriore, pauxillum sinistrorsum, in suæ altitudinis medio, transversam plagam, longitudinis latitudinisque digiti integri, Zonæ instar, inflammata, ut in pulcerrima injectione: in qua & hoc notabile, quod multis valde in locis exiles extravasationes exhiberentur, quæ, inter hæc pulcre veluti injecta vasa, plurimas quasi peticulas, seu petechias, referebant.

Hepar ingens lobo suo majore in medio epigastrio terminatum; minore autem lobo diaphragmatis inferiori laterali regioni, ope ligamenti fortis membranæ, versus arcum infimarum costarum, connexum.

Pulmones, utroque pectoris in cavo, ab omni cohæsione cum vicinis liberrimi, cinereo colore in paucis, livido multis in locis, antè ac lateraliter, conspiciebantur: postica vero facie universa ex rubicundo fere nigrescentes, ac facile ad levem contrecitationem diffuentes. Quin & pulmones undique pressi, veluti per poros liquidum transsudabant:

hoc

hoc præcipue in lobo dextro superiore ac medio ;
duri autem ab infarctu non erant.

In pericardio liquor non aquosus , sed obscure ruber , paulo forte solito copiosior.

Cor utrumque perfecte vacuum , ut vix reliquiæ tantilli sanguinis versus ejusdem orificia superessent.

Diagnosîs morbi Ileus inflammatorius est , ex Colica periodica natus ; seu Colica periodica in letalem Ileum versa. Qualisnam autem Colicæ species fuerit , hominem , dum viveret , contuitus nunquam , non ausim determinare.

Quæ causa proxima ilei letalis ? Incertum est utrum hæc in inflammatis , gangrænosisque Ileî plagis , an vero in complicati Coli hæserit locis. Equidem elapsis 42. a morte horis nihil quo intestinum sive coarctaretur , sive obturaretur , inventum est : verum , quamvis non semper , sæpe tamen , relaxantur ejusmodi constrictiones , seu spasmodicæ , seu inflammatoriæ ; aut suapte sponte , aut gangræna in morte , imo ante mortem : ut pluries in incarceratis herniis vidi. Sed complicatæ Coli superioris ac inferioris partes , dum hoc intestinum in principio morbi tensum repletumque esset , potuere citra spasmos , inflammationesque , viam aëri , fæcibusque , præcludere omnem : si jam , ut multis in Colicis , *Pictorum* maxime , fit , musculi abdominales convulsiva contractione arctaverint abdomen , in complicatis hisce Coli partibus causa morbi proxima eo facilius locata fuisse intelligitur.

Ex iis , quos a diro hoc morbo DEO dante , vel curavi , vel hominum illo affectorum interitum procrastinavi , didici tutiorem certioreque eam methodum esse , quæ *tempestivis* V. S. quæ multo oleo , quæ purgantibus opio interpolatis , quæ clysmatibus fumi Tabaci mature valde adhibitis , & si opus est , epoto mercurio , instituatur ; quam quæ mistu-
ris

ris dictis *Hoffmannianis*; quam quæ sera, imo ferissima sanguinis missione, auroque fulminante, tentetur. Aurum fulminans si bene paratum est, nihil agit; non bene paratum, morbum auget. Nec laudavit id, quamvis ab aliis datum, *Cl. Hoffmann. Cap. de iliaco dolore*. Clysmata fumi Tabaci, licet pluries fallant, maxime quando aut causa plane invincibilis obtinet, aut nimis sero ad hoc auxilium confugitur, continuata tamen observatione restituunt multos. Exempla manifesta attuli olim, & in mea vicinia nuperrimum habetur.

An *frigida*, quam æger clam hausit, nocuit? Præstantiam gelidæ aquæ in hoc morbo experimentis evici *Tomo 2. Cap. de Ileo*. Sed sero nimis æger noster eam bibit. Gangræna videtur quarto morbi die in priore loco doloris jam nata fuisse, eo quod, evanescente ibidem dolore, frigus, tremor, pulsusque cum debilitate frequens, observarentur.

An fæces liquidæ ac copiosæ, finiente altero morbi die missæ, boni augurii non erant? Et Iliacos, & Herniosos, cum ejusmodi dejectionibus tam servari, quam mori, pluries vidimus. Vel enim obex solutus totus est, redditusque talis peristalticus motus Intestinis, ut antiperistalticum viribus superet; vel prodit tantum vi enematum aut pars, aut totum stercoreum, quod infra locum ubi causa proxima residet, hærebat; morbo nihil inde levato: vel tandem gangræna, partes relaxans, nata est; quæ si parva, inchoataque tantum, aliquando adhuc curabilis est; si magna, atque completa jam est, mortem infert. Vide quæ *Tom. 1 & 2. Et Parte 9. de Ileo & Hernia* notata sunt: maxime vero *Tomo 2. Capite 17. toto*.

Omenti defectum inter Colicæ causas haud absurde quis memoret. Omenti enim est, intestinorum respectu, tegere illa; fovere, ac lubrica servare.

Hepar etiam hic totum fere Epigastrium explens, imo sinistro in latere forti ligamento accretum cum Diaphragmate, confirmat toties datum monitum de necessaria prudentia in sede morborum ex solo partium situ determinanda.

Rarior observatio est hominis, pectore olim sic laborantis, ut multo tempore Phthisicus crederetur, posteaque semper tussi aliqua laboraret; cui tamen pulmones ab omni cohæsione perfectissime liberi invenirentur. Cæterum Peripneumonicorum referebant pulmones: Peripneumonia enim periit, jam in Gangrænam tendente, ut in Acutis toties. Vi inflammationis sanguis omnis inflammatorie corruptus, ineptus demum fit, qui pulmones permeet; vel & organum respirationis, debilitate a morbo genita, ineptum fit, quod humores, quamvis per se adhuc permeabiles, sat efficaciter transmittat.

Cordis vacui thalami utriusque sat frequens est observatio, ut in prioribus patuit, ut in hoc casu patet, & in §. seq. patebit; inane ostendens conamen omne vitales actiones, eas Cordis præcipue, systemate irritabilitatis explicandi.

§. II. Delata in Nosocomium fuit 16. Dec. 1766. vidua 57. annorum, cujus hæc Anamnesis. Ante elapsos ab hinc 30. annos viro perfectæ ætatis nupsit, ac primo quidem anno peperit, deinceps vero nunquam. Gravida vehementer vexata hæmorrhoidibus fuit; easdemque, post puerperium adhuc valde molestas, cum Medici consilium de aperiundis illis sprevisset, fistulam ani contraxit: a quo tamen malo operatione fortunata liberabatur.

Sexennium est, quod febre acuta laboraret, in qua integris sex diebus deliravit, & a qua non nisi post quatuor ærumnarum exactas septimanas emerfit. Meminit sitis, eodem in morbo inexplebilis, ut a continuo potu temperare sibi non posset, quan-

tuncunque ne sibi irreparabile forte damnum inferret, assiduo moneretur. Quare etiam ex acuto hoc morbo in Hydropem intercutem brachiorum, crurum, ventris, lumbique, incidit. Ab illo tamen quopiam, quod ignorat, infuso, brevi curata fuit; ac sana integro postmodum triennio, flatu incommodo excepto, vixit.

Vitam sedentariam perpetuo, & hucusque, egit. Menses semper regulares in 45. ætatis annum habuit.

Triennium est, ex quo singulo fere sesquialtero mense latus abdominis lævum, mox sub costis, intumesceret sibi, tumore paulatim ultra medium ventrem porrecto, ibidemque veluti in acumen asurgente. Non doluit tumor, sed dum femina jocando ventrem tumentem sæpe percuteret, resonuit. Perstabat tumor tres quatuorve septimanas, perque alias duas tresve subsidebat. Disparente tumore copiosos commodosque emittere flatus potuit; eodem vero redeunte, nullos.

A medio pene elapso abhinc anno, urinam reddere cepit adeo acrem, ut sibi inde pudenda roderentur; copiosam quidem, sed frequenter urgentem, cum sedimento copioso, alboque; in medio limpida, & quid crassi in superficie gerentem.

Medius quoque annus erat, ex quo in deglutiendo id incommodi pati cepit, ut deglutita ad certum quendam locum hærent, quem nos conjectabamur eum esse, in quo Oesophagus Diaphragmatis fissuram transiturus est: sic ut nonnunquam ipsi per aliquot minutorum spatium interquiescendum esset, antequam ingerere quidquam de integro auderet.

Octiduo ante morbum, de quo mox, tristis, præterque morem morosa, levi quoque ac continua tussi, vexata fuerat.

Tandem 12. Dec. tota die inhorruit, citra vel inter-

termistum, vel subsecutum, æstum. Appetitu caruit. Quo eodem modo & die 13. Dec. se habuit.

Die autem 14. Dec. hora noctis prima Ventris ipsi tormina oriebantur, haud eo, quo solebant loco, verum in Ventre medio, ita ut centrum doloris umbilicus esset, una cum ructibus nauseisque. Prælo quasi sibi præcordia premi, ac contorqueri, conquebatur, & ex ventre quidpiam versus pectus conscendere, a quo Singultus primo, deinde Vomitus. Toto hoc die Vomitus cum reliquis symptomatibus continuavit, nec minus nocte. Quid vomitu reddidisset rogata tenuem, regeffit, aquosamque materiem.

Die 15. Dec. omnia hæc continuarunt. A biduo alvo carenti immissum Clyisma fuerat, quod duram eduxit materiem: repetivissentque, ait, idem, ni a priore Clysmate male habuisset.

Die 16. vomens in Nosocomium Hispanicum invecta carpento est, moxque inde ad nos, gestatorio.

Auditis feminae querelis, mox Ventrem examinavimus. Dolebat ille & in loco antiquo, a margine sinistrarum costarum, jamque adusque Ilei ossis cavum; & in plaga nova, medio nempe ventre: qui dolor ab umbilico, ceu centro, ad semipedis in ambitu latitudinem diffundebatur; centro veluti acuminato.

Nullam aquæ fluctuationem, *tactu* deprehendimus; sed potius, non quidem *sonitu*, sed *adspectu* tumoris inæqualis, ac divisi, adesse Tympaniam iudicavimus. Dolor ab attractu augebatur.

Principio quo apud nos fuit, haud vomuit, sed exprobravit; nec singultivit vere, sed eructavit. Febricitantem acutè a die 12. Dec. conclusimus ex inflammatione ventris. Cumque febris cum pulsu duro, eoque pleno incresceret, uncias xiv. sanguinis

de brachio dextro misimus. In vasculum primum sanguis optime fluxit, levem duntaxat crustam formans: in alterum vas lente fluxit, & crustam modicam, priore tamen densiorem; in vas tertium celerime fluxit, & densiorem prioribus crustam exhibuit.

Enema ex *emolliente Decocto*, cum mellis & olei *Lin.* à unc. ii. & *Nitri dragma*, injiciebatur; unde alvus post horam, cum multis parvis scybalis, & portione una majore. *Emulsi Libra cum uncia Syrupi Diacodii* dabatur, *molliens Cataplasma* toti Ventri circumdatum est, & *Scutum stomachicum*, ex *Uncia Empl. de Labdano*, *granis xij. Camphoræ & totidem Opii crudi*, & *Bals. peruv. q. s.* compositum, regioni Ventriculi admotum est.

Posthæc omnia Symptomata, dolore excepto, mitigabantur, appetitus aliquis nascebatur, & absque insequente vomitu comedit, quod petierat, jus carnis cum panis tantillo.

Venter ad noctem tumidior quidem, sed mollior. Cepitque frigus conqueri internum, cum tepore extremorum; quamobrem plura stragula coniecimus in illam. An frigore hoc nascens ab inflammatione Gangræna notabatur? Sed ipsa febris bidui frigore inceperat, & cum præsentī frigore pulsus parum modo celer, plenusque ille, Gangrænam negabat.

Sitis interim magna continuat. Mala nox fuit ob vomitus continuos, ructus, singultus, anxietates. Urina tamen, quæ prioribus diebus vix prodierat, hac nocte ultra libram prodiit, bene colorata, cum crassiore enæoremate, brevi subsidente; adeoque nullatenus gangrænosa.

Die 17. Decembris ad 6. matutinam reperi calorem ejus ad Therm. *Fabr.* 98. gr. pulsumque & fortem, & durum, & celerem. Calor ergo naturalem fere superans, pulsusque talis, metum removebant

gangrænæ; licet quid adhuc superesset hesterni frigoris internarum partium.

Cum ergo ex enarratis febris aucta videretur, & dolor perseveraret, aliam Venæ sectionem tentavi, quam jacens probe sustinuisset; sed dolorum immanitate, & anxietate victa, subito erexit sese, erecta animo linqui cepit: hinc mox destiti captis sanguinis unciiis quinque. Sanguis hic, qui bene fluxerat, non crustam, sed optimæ consistentiæ crassamentum exhibuit.

Sitis multa perseverat. Enema, heri secundo immissum, hodie ad 5. matutinam cum paucis scybalis; & ad 6. cum materia flava, pultem referente, exivit.

Calor postmodum hominis sani, graduum 96. scilicet; pulsus fortior, durior, frequentior; Respiratio difficilior. Venter tamen mollior, in medio minus, sed per totum æquabilius expansus; in Epigastrio autem plus, quam heri, tumefactus.

Ambiguum profecto morbi statum esse nemo non videbat. Etenim ab una parte inflammationis augmentum in sextum diem jam continuabat, internumque jam ultra 20. horarum frigus, quod necdum omnino disparuerat, metum faciebant gangrænæ urgentem: ab altera tamen parte calor, color, pulsus, suspicionem hanc penitus fugare videbantur.

Ad Ileum igitur solvendum, allaborandum fuit: quæ enim ab enemate materies iterato prodierat, ex solo intestino Colo, haudquaquam a loco inflammato, videbatur prodire; siquidem nec pulsus, nec dolor, mitigarentur; quæque pridie siluerant symptomata, Vomitus, Singultus, Ructus, de nocte repetivissent.

Purgante itaque Chyli, Fæcumque, tentandum transitum ratus, primo Vomitum opiato sopire debui,

bui, *Sydenhami*, & *Hoffmanni* experientiam, meae pluries confirmatam, religiose sequutus.

Cepit itaque quovis horæ quadrante Cochleare hujus Misturæ uti. *℞. Laud. Liq. Syd. gtt. xxx. Syrupi Menthæ unc. jß. Aq. Melissæ simpl. unc. iij.* & propter casus ambiguitatem, *Extracti Cort. peruv. dr. ij.*

Mistura hæc, mirum dictu, quam mox ab initio, perque diem totam, cuncta pacaret; Vomitum, Singultum, Anxietatem, Dolorem! Sic ut ægra exclamaret præstantiorem nunquam in vita sua sibi datam Medicinam fuisse, deque universo morbo unicam superesse lassitudinem.

Minus igitur de Gangræna cogitatum est: quippe in qua pacantur quidem symptomata, sed dum pacantur, simul virium imminutio atque projectio advertitur, celerrimusque cum parvitate & inæqualitate pulsus, vultus præterea oculorumque collapsus, ac frigus: hic vero tota die pulsus decies, pluriesque, & a me, & ab aliis, exploratus, subdurus deprehensus est, & plenus, æqualis, & modice tantum celer: nec in vultu, oculisque, quid pravi cernebatur; extremaque calebant.

Toto antemeridiano, totoque pomeridiano tempore, læta ægra fuit, quod tam bene se haberet, quodque eousque, citra periculum suffocationis, citraque Vomitum & Singultum, dextrum in latus cubare non potis, commode jam cubaret in illud; petivitque iterato suam ne auferrem, mutaremve medicinam. Mutandi profecto illam non fuit mihi animus; a qua tam bene se habebat; & quæ spem dabat fore ut pacatis symptomatibus, viribusque adeo constantibus, alvus demum resolveretur, præsertim si molliore frequentique Clysmate sollicitare pergeremus eandem. Poteramus eundem felicem, subitumque ab Opio sperare effectum, quem *Rive-*

rius lætabatur *Cent. I. No. 12.* in suo juvene, cui in ventris acerbissimo dolore, a datis *Laudani opiat* *sex granis*, tanta rerum mutatio fuit, ut intra bihorium dolor omnis cum cessaret, tum non rediret: poteramus sperare, ita fortunatam ægram nostram fore, quemadmodum laudatus mox Autor ibidem *No. 86.* refert Sexagenariam fuisse, quæ in dirissimum hunc morbum tertio relapsa, ceterisque haud relevanda artis auxiliis, *granis Opii quinque* a dolore, & reliquis symptomatibus convalesceret, nec relaberetur.

Sed ô vanas mortalium spes! ô fallacias! Dum ad vespertinam horam seminonam clyisma, cum pauca flava, ac pultem referente materia, ægrota animose deponeret, anxia reddi cepta est, lævumque reclinata in latus oculos in altum defigere, petere qui assisteret Sacerdotem, ac voce demum destitui. Pulsus interea bonus esse perseveravit, Respiratio vix læsa, extrema quidem tepida, Vultus autem calidus mansit. Interim nihil eorum, quæ circa se gerebantur, gnara erat, neque ad validiores clamores vel minimum dedit mentis præsentis indicium. Brevis inde algere cepit, anxie respirare, inæqualem habere, parvumque, & celerrimum pulsum, pauloque ante decimam animam efflavit.

Toto hoc tempore me, lecto adstantem, respirationis occupabat modus. Irregularis illa fuit, sed adeo lenta, ut inter singulas respirationes alta ego voce numerarem unum, duo, tria, & sic porro ad 20. usque, iterum ad 30. ad 34. ad 50. & semel ad 60. quod minuti circiter spatium explet. Inter antepenultimam & penultimam 60. iterum numeravi, inter penultimam & ultimam 30.

Animus fuit thermometro explorare corporis mox a morte calorem; quia vero id ilico ad manum non erat, quinto tantum a morte minuto fere expleto,

admotum est: quovis semiquadrante horæ, adeoque per integram horam octies, idem gradus hosce, hoc ordine notavit. 92. 92. 94. 96. 97. 97. 96. 95. Nec suspicetur quis thermometron continuata applicatione debito plus incaluisse, altioresque proinde notavisse gradus; nam nec in homine sano, quotiescunque ultra quadrantem horæ admoveatur, etiam bihorii ac trihorii spatio, vix altius unquam, quam spatio quadrantis adscenderat, adscendit; deinde, dum sensim cadaver ad calorem Atmosphæræ reducitur, calentis thermometri gradus sensim quoque diminuuntur, ad eumque Atmosphæræ reducuntur: ita ut perpetuo verus ejus, quod exploratur, corporis, gradus notetur caloris.

Dives profecto doctrinæ clinicæ hic casus est: quo autem ad illam contemplandam aptiores accedamus, Anatomen præmisisse expediet, quæ horis 35. a morte expletis publice facta est.

Oculi utriusque corrugata cornea, & opaca; dextri autem minus.

Rigiditas infernorum supernorumque artuum ea major multo, quæ Cadaveris esse solet. Forti tamen ac lenta flexione Brachia, quæ angulum rectum cum Humero faciebant, in rectitudinem porrigebantur, rectaque manebant. Hæc in præcedentibus sæpius ideo notata vides, quod clari Viri certas veræ mortis determinandæ regulas exinde cudere tentarint, frequentiore examine haud sufficienter instructi. Cum oculis veluti vivis, cum Artuum vel nulla, vel maxima rigiditate, certam mortem adesse pluribus demonstrationibus evici.

Panniculus adiposus digiti lati crassitiem habuit. Venter minus acuminatus in medio, minusque tumidus; ita ut corrugata jam cutis, sulcataque, conspiceretur.

Peritonæo aperto, Tympanites & Ventriculi &
Ins

Intestinorum omnium, manifesta fuit, excepta duarum Spithamarum portione in fine Ilei. Hoc & cetera omnia, quo clarius capiantur, inspiciatur Tab. II.



FIG. I. II. III.

- A. Ventriculus tympaniticus.
- B. Ejus os superius.
- C. Totum id, quod de Hepate sub costis visibile fuit.
- D. Fundus Vesiculæ felleæ.
- E. Os Ventriculi inferius, seu Pylorus. In cadavere Ventriculus totum contexit sub se Pylorum: unde hic Ventriculum minus, quam par est, turgidum delineare debui, quo & Pylori sedem, & a Duodeni principio ortam jam Tympaniam, ostenderem. Una patet ad D. plica Ventriculi, ut & alia ejus plica, antequam Pylorum formet: nam ad usque F. Ventriculus est.
- F. Angustatio corporis Ventriculi ad fundum Vesiculæ fellis, ex vesicula transsudantis, colore longe lateque tincta profundissime.
- G. Locus designans umbilicum cadaveris, infra quem Colon intestinum protrusum inveniebatur. NB. Post Pylorum, mox tympaniticum Duodenum apparet; cui Literam, ne figuram obscuraret, non apposui.
- H. Saccus Cæci parvus valde, cum processu suo vermiculari; qui processus hic neutiquam vermicularis, sed digiti instar in rectitudinem porrigitur.
- I. Ilei intestini finis, quo in Cæcum se inserit, angustus admodum, complanatus, & in sua com-

- planatione vix digitum latus. Melius conspici-
tur in fig. II. & III. ab S. ad X.
- K. Flexus Coli Hepaticus, seu dexter.
- L. Humilis Coli situs in Abdomine, qui ut melius
conspiciatur, locus umbilici ad G notatus est.
Coli quoque hic apparet amplitudo.
- M. Colon subito vehementerque inter duos flexus
arctatum.
- N. Flexus Coli Lienaris, qui altior fuit quam in fi-
gura exhiberi potuit, sub Ventriculo quippe de-
litescens.
- OO. Colon valde angustum.
- P. Iterum triplo amplius.
- Q. Coli flexus ultimus, ubi in Rectum abit, cum
relicta ea tantummodo sui Mesocoli portione,
quæ ad intelligenda sequentia requirebatur.



FIG. II. & III.

*Fig. II. anteriorem, Fig. III. posteriorem fa-
ciem exhibet. Literæ duplices ad
utrasque pertinent.*

- RR. Cæci Saccus.
- SS. Angustum Ileum a sua in Cæcum insertione, ad
X. usque, spatio duarum spithamarum.
- TT. Ileum Intestinum hic Tympaniticum, ut etiam
erant Intestina tenuia omnia, ad Pylorum
usque.
- VV. Extremum Coli, cum relicta Mesocoli por-
tione.
- W. Locus ubi Ileum ex tympanitico arctum fieri
incipit.
- XX. Plaga in Mesocolo, in fig. II. notata, desig-
nat

nat locum, ubi Intestinum Ileum suo in Mesocolon ingressu Herniam facit. In Fig. III. inversa, Litera X. Herniam indigitat: utraque autem figura tenuitatem indicat Intestini Ilei, Herniam inter, Cæcumque: constrictum hic valdopere intestinum fuit, sic ut eo educto vix minimi digiti apex per sacci herniosi collum potuerit transire.

In Pericardio vix aqua inerat. Magnum Cor. Sanguis multus grumofus in thalamo ejus sinistro; in dextro autem & copiosior, & polyposior. Pulmo dexter nullibi, sinister inferius superiusque, levi adhæfione cum Pleura nexus: uterque ab anteriore parte colore obscurior, a posteriore solito rubicundior.

Renes parvi, boni: bona Pelvis, Ureteres, Vesica.

Hepar universum sub Costis reconditum, eam lobi majoris si exceperis portiunculam, quæ ad Lit. C. sistitur.

Vesicula fellea ingens, cum Hepate sub costis recondita, fundo suo prominebat infra costas, supra monstrosi Ventriculi plicam, ut ad Lit. D. pingitur. In mundando, dum collum ejus fauciaretur, bilis bene multa effluxit in ventrem; nihilominus adhuc ultra uncias duas ex vesicula eduximus bilis fere nigræ, solitæ spissitudinis.

Plica quam Ventriculus in F formabat, transfundante bile profundissime tincta erat, ad duos in latitudine, ad tres in longitudine, pollices. An sic bilis intra sanguinem resorberi, hocque pacto lcterum creare possit?

Intestinum Ileum pluribus in locis leviter, propius ad Herniam multum, inflammatum fuit.

Atque hæc de visis & repertis in Cadavere sufficiant;

cient; ut ad morbi pathologicam discussionem, Anamnesi in memoriam revocata, accingamur.

In Anamnesi ea coram stitimus, quæ ab annis retro 30. contigerint. Nemo anamnesticam nostram prolixitatem queratur. Solemus enim ægrorum anteaactam vitam scrupulose semper inquirere, ne quid nos fugiat, quod ad determinandas mali causas, naturamque, facere utcunque possit. Ea intentione responsa illorum Literis mandamus, atque bis, ter, pluriesque, examen repetentes, non pauca sæpe corrigimus, desiderata complemus, ac sic perficimus totum.

Quæ ab annis 30. contigisse femina narravit, ad rem præsentem facere non arbitror; sed quidem illa, quæ a Sexennio. Etenim valida febris acuta, in qua, ad sitim inextinguibilem enormem aquæ copiam fatetur abliguriisse sese, monitisque, ne ita ageret, iteratis, ob sitis intolerabilitatem non obtemperasse; videtur corpus vehementer debilitasse, intercutem creasse Hydropem, tardam reduxisse salutem, nec vires ad illibatam sanitatem requisitas post se reliquisse; præsertim cum sedentaria vita, quam coluit femina perpetuo, corpus ab ægritudine infirmatum non roboret, sed debile, & iners, & flaccidum, relinquat.

Fundamentum itaque morbi, seu causam prædisponentem, vita sedentaria una cum superstite hac debilitate posuit: Flatus ac Borborygmi, quibus femina post acutum illum morbum obnoxiam se fuisse narrabat, hanc Ventriculi Intestinorumque, inertiam probant; huic deinde dispositio tympanitica in sinistra, eaque superiore abdominis parte, se adjunxit: causa suscitans prædisponentem, ut cum eadem morbum, seu causam proximam, constituat, forte haud e longinquo quærenda illi erit, qui perpendit
se-

Jecum viscera cava illuvie nimia sic extendi, ut multam faciant suæ contractilitatis jacturam: qua ex re consequitur id, ut iterata sæpius distendente causa, interea dum ipse vitæ modus corpus debilitat, hæc ipsa viscera vix ultra propellant contenta, hinc distendantur immaniter; & cum propulsis contentis aër semper præsto est, qui in loco calido occlusus vehementer rarefcit, hinc in Tympaniam incidant.

Hæc porro Tympania Ventriculum præcipue occupasse videtur, siquidem tumor sinistro in latere mox sub costis, ad usque medium Epigastrium, resedisse fertur.

Itaque Ventriculus flatu turgens, videtur primum fuisse ab Hepate, ne dextrorsum extenderetur, præpeditus, unde tanto magis anteriora corporis extendit: & quia observaverat femina a superioribus paulatim ad umbilicum se extendisse tumorem, patet etiam ventriculum hunc debilitatum magis magisque, tandem ab aëre ita expansum fuisse, ut totam hanc plagam occuparet.

Sed demum mulier ajebat tumorem dextrum quoque implevisse latus. Scilicet Tympanites ita crevit, ut pedetentim pepulerit sua de sede Jecur, inque superiora truserit; unde sic Hepar se sub costis recondere cogeatur.

Porro cum id lente admodum factum sit, Bilis excretio in Intestina inde multum passa non est; eo quod ductus communis, ductus Cysticus, & Hepaticus, sensim elongati, sine notabili turbatione pervii manserint: nisi postremo forte vitæ tempore, dum Vesicula bile tanta turgeret.

Ultimo in morbo haud Epigastrii, sed & Hypogastrii est tumor conspectus; Hypogastrii tamen maxime in sinistro latere; quia prope herniam credibile est maximam Ilei expansionem contigisse.

Intestinorum ultimo in morbo nata Tympanites, Herniæ effectusne fuerit, an ejusdem causa?

Pro utraque sententia militat ratio. Primo namque Hernia omnem ex Ileo Intestino transitum negans, in causa fuit, ut hoc Intestinum ab aëre, & alimentis, medicamentisque, vehementer expandetur. Et confirmari hæc sententia videtur, eo quod inferioris ventris tumor nonnisi cum signis Ilei morbi, sive Herniæ, comparuerit.

Ab altera parte, si a Tympania Ventriculi sensim, ut fit, Intestina Tympaniam quoque sibi contrahant, causæ Volvulorum, & Herniarum habebuntur in multis locis, iisque potissimum, ubi Intestinorum gyri supra se se mutuo reduplicantur. Ponamus Intestini Ilei ejusmodi plicam in pelvi fuisse, & vacuatis Intestinis Colo ac Recto, evacuataque Vesica urinaria, Ileum ante hanc plicam plurimo aëre tumuisse: si Coli finis, si Rectum Intestinum, si Vesica urinaria de integro sua quæque materia amplificentur, utique turgens Intestinum Mesocolon remove, in eoque, non satis retrocedente, Herniam generare potuit.

Notat autem Anamnesis Tympaniam non fuisse perpetuam, sed quovis sesquimense rediisse, sic ut una alterave septimana sileret. Quæ causa hujus? Si Catameniiis suis, hisque quolibet sesqui altero mense redeuntibus, eo tempore adhuc ægra gavisa esset, quæpiam ratio phænomeni haberetur: imo si Mensibus cessantibus supervenisset hæc Tympanites periodica, causam hujus nonnullam ex menstruorum continuante nisu explicare forsitan anniteremur: Sed novem anni a mensium defectu ad principium Tympanias decursi, non admittunt ejusmodi explicationem.

Nunquid *Sanctorii* observatio de menstrua hominum Plethora lucis hic afferat quidquam? Quippe quæ

quæ hujuscemodi irregularitatibus aliquando subiecta sit, quibus ea Feminarum menses qualibet 4^{ta}. 5^{ta}. 6^{ta}. 8^{va}. septimana habentium Plethora, seu universa, seu uteri saltem topica, obnoxia est? Hac ratione causam quandam insultus hujus Periodici caperemus, modo constaret *annosiores* viros, feminasque, ejusmodi Sanctorianam Plethoram menstruatim pati. Verum quidquid de hac excitante causa sit, de eademque conjecturemur, veram certamque definire eam cum non valeamus, quæstionem totam in medio relinquemus. Cogimur in similibus ignorantiam nostram candidi fateri. Hodie vir sexagenario major, convenit me, qui calculum non medio-crem, eumque asperum valde, in Vesica habet; ut quatuor Medici, unusque Chirurgus, absque ulla difficultate, primo Catheteris tentamine deteximus; interea dum a longo admodum tempore calculi cruciatus triduo tantum patiatur, triduoque denuo, nullo adhibito auxilio, liberrimus sit. Multa similia in *Rat. Med.* exempla protuli.

Duos autem veluti alios, novosque morbos, mulier nostra interea tolerare, medio ante mortem anno, debuit; quorum alter urinæ rodens acrimonia fuit, alter difficultas deglutiendi. Cum neutrius mechanicam in cadavere causam detexerimus, priorem ab humorum Cacochymia mucosa, acri, ad ouropoieticum systema determinata; alterum a portentosa Ventriculi expansione, in anteriora vehementer assurgentis, Oesophagique proinde finem distrahentis, vel Diaphragma quo loco Oesophagum transmittit comprimantis, suam duxisse arbitror originem.

Tandem Febris videtur duorum dierum frigore, die 12. Decembris incepisse, tertioque ejus die vel Hernia entero-mesocolica accessisse, quæ Intestini Ilei inflammationem, tympaniam, gangrænamque

ge-

genuerit ; vel Hernia talis ex Tympanitide Intestinarum genita accesserit : quæ ipsa Hernia tam sua constrictione , quam nata Intestini Ilei ante Herniam Gangræna , mortem 4^{to}. die intulit.

Sed quæstio gravis ex eo nascitur , quod femina gangræna periisse videatur , interea dum in vita pulsus , pluraque alia phænomena , longe abesse gangrænam clamitarent. Quippe defuerunt hic , quæ in Gangræna provecta eousque , ut mortem & minetur , & inferat , signa enarrantur : Virium projectio , Pulsuum cum celeritate parvitas , Frigus extremorum , Oculorum collapsus , Faciei , Labiorumque præcipue , livor &c. Utique si cum omnibus hisce , aut saltem præcipuis , videatur æger quisquam sibi de futura salute blandiri , non est , quod propterea Medicus fallatur , indolentiæ partium , olim dolentium , causam ex Gangræna , eaque letifera , oriundam ratus : at vero nullo pravorum signorum præsentem , cessante etiam , quod affuerat , frigore , ægrotam nostram Gangræna interfec tam esse , ut & ultima vitæ horula , & anatomicus docuit conspectus ; res profecto est , quæ , ut ut illam hinc stupemus , illinc subtiliore ratiocinio quodantenus explicare periclitamur , novum saltem hunc medendi Canonem cudere jubet , ut , quantumvis disparentibus Gangrænæ signis , fallacem , infidamque quamcumque emendationem esse statuamus , quamdiu haud redierit perfecta salus.

Exp. D. De Knobloch , natione Russus , qui biennii , ni fallor , spatio , indefessa diligentia collegia mea omnia frequentavit , hujusque feminæ & morbo adstitit , & Anatomæ , Dissertationis suæ inauguralis (quam laudatissimam fuisse , licet necdum acceperim , reor ,) materiem , me annuente , inde sumsit , dum ætate elapsa in Alma & Inclita Universitate Leydensi gradum Doctoratus acciperet.

§. III. Sartor 73. annos natus, plurima æstatis & autumnii parte anni 1766. Diarrhœa, ac subinde Dysenteria laboraverat, incassum numerosis medicamentis assumtis. Emollientia dein imminuere dejectiones, sed non stiterunt. Agyrta demum arcanis suis pessumdedit hominem, sic ut 19. Dec. inflammatione Intestinorum laborare ceperit, quam biduo neglexit; dein antiphlogistica methodo, purgantibus, oleo multo, opio, mercurio crudo, ter ad libram mediam assumpto, vindicari a morte non potuit, quæ contigit initio diei 27. Dec. Cadaver 30. horis a morte, ejus in ædibus, nonnullis Studiosis & Medicis adstantibus, aperui.

In Abdomine aliquot uncix aquæ rubellæ inerant.

Intestina conspiciuntur in Tab. III. Tenuia erant inflata valde; Crassa autem valde tympanitica. Inflammatio multa iis non aderat, præterquam ad finem Coli, in quo obstructio notabilis mox enarranda.

A. Intestinum Cæcum in dextra pelvi.

B. Flexus Coli I^{mus}.

C. Flexus Coli II^{dus}.

D. Reflexus Coli versus superiora, quam removi parum, quo clarius conspiceretur. In cadavere enim pars D. & E. fere omnino latebat sub B. & C.

E. Flexus Coli, isque iterum sub Hepate III^{tus}.

F. Flexus Coli IV^{tus}. isque Lienaris. Turgens hic Intestinum valde, Diaphragma vehementer trudebat in altum; ut Cordis actio hinc quoque multum perturbaretur, oportuerit.

G. Descensus Coli ab hoc suo lienari flexu.

H. Flexus V^{tus}.

I. Flexus Coli VI^{tus}.

K. Flexus VII^{mus}.

L. Flexus VIII^{us}.

M. Flexus IX^{nus}.

N. Flexus X^{nus}.

O. Flexus XI^{mus}.

P. Flexus XII^{mus}.

Q. Intestinum Rectum.

Maxime notabamus flexus M. N. O. quos usque ad P. aperuimus. Intestinum sub hoc loco toto M. N. O. complanatum fuit, ut in eo cavitas deesset. Pars ejus M. N. L. K. tympanitica compressit hos subjectos flexus.

Expeditum fuit Iter ex Ileo in Cæcum.

Mercurium splendidissimi salis instar invenimus stercoreibus mollibus, non formatis, iisque copiosis, mistum, 1^{mo}. in Ileo prope Cæcum, 2^{do}. in Cæco ipso. Sed homini dragmam Mercurii dulcis, cum aliis purgantibus, datam in hoc morbo fuisse inaudivi: unde forte qui hic ita splendidus inventus Mercurius fuit, Mercurius ille dulcis fuerit.

Dum circa hæc invicem colloquebamur, & Mercurium hunc eluebamur, chirurgi interea cadaver ob immanem foetorem consuebant; absque examine facto necessario Intestinitumentissimi ad C. quo constitisset an forte ibi maxima Mercurii moles non hæreret.

Ventriculus parvus.

Pulmo sublividus uterque; anterieus firmiter, laxius in latere, laxissime in dorso, cum pleura connatus.

Cor utrumque ita vacuum sanguine, ut veluti elotum esset. Grumosus sanguis utriusque in sinu, in dextro magis.

Quæritur utrum solo in abdomine an vero etiam in Thorace, mortis sit quærenda statuendaque causa?

Profecto in solo intestino Colo XII. flexus reperti sunt, quorum plerique ad letalem obstructionem sufficiant. Et ut Colon, ita quoque intestina tenuia tym-

tympanitica erant. Sic ut & crassa & tenuia Intestina, longe amplius, quo apte containerentur, spatium exigent. Ut ut enim Diaphragma & Peritonæum cedunt, tandem resistunt: si nunc totus hic tubus adeo immaniter expansus Clysmatibus hinc, medicamentis, alimentis, potulentis illinc, assiduo adhuc magis repletur; si aër, in eodem tubo adeo multus, mora vehementer rare scat; aër, inquam, qui in Physicis demonstratur decies & sexies amplius, quam primo spatium occupare posse; necesse est omnia hæc tumentissima Intestina inter se se vehementer compressa fuisse, viamque sibi mutuo præclusisse: Hinc ad omnes duodecim plicas, in Colo intestino; ad plicas Tenuium longe numerosiores; letalis obstructio nasci potuisset.

Si præterea vim Mesenterii, quam ex eodem vulnerato, Ruifchius didicit in vitam humanam ingentem esse, perpendamus; an non ab ejus in casu nostro compressione, vellicatione, contorsione, ac fere dilaceratione, horrenda phænomena, ipsumque consequi letum possint?

Gangræna equidem aut Mesenterii, ac Mesocoli, aut Intestinorum, nondum vera aderat: verum & hæc, & illa; quando eorundem arteriarum, venarum, nervorumque interceptiones, nervorum præterea vellicationes, attente recogitemus; universum systema arteriosum, venosum, ac nervosum commovere, Sensorium commune, Vitalesque turbare actiones, vitam demum sufflaminare, possunt.

Sed Vitales actiones lædere, ac sic sufflaminare, ut Cor vacuum utrumque repertum fuerit, & Hepar potuit, & flexus Coli superior, in sinistro latere: valida quippe horum in Diaphragma appressionem, Cor cum suo Pericardio complanari, sicque basi sua flecti potuit, ut sanguis omnis in sinibus colligeretur; hincque vacuus reperiretur uterque cordis thalamus.

Quin & hæc Jecinoris in alta protrusio sola, forte necare hominem posset. Cogita eidem Venam cavam accrescere, hanc una cum illo attolli, violenter distrahi, comprimique; cellulositatem fortem qua vena eadem cum omnibus vicinis colligatur, vellicari, lacerari; Nervos in vicinia decurrentes, ac cellulositate eadem implicitos, una cum Vena cava distendi, convellique; an non præter pessima alia symptomata, capiamus sanguinem venosum, ab inferioribus refluxum, hac lege præpediri ne in cor dextrum fluat? Idemque Hepar, si latum crassumque est, interea dum Diaphragma violenter attollit, an simul non comprimit subjectam Aortam, Venamque cavam, quo universus sanguinis circulus perturbetur?

§. IV. Quinquagenaria Matrona, Cacochymica, Hydropis nonnunquam experta primordia, duro tumore in medio Hypogastrio laborans, frequenterque Colicam clausam, a qua enematribus plerumque liberabatur, perpeffa, tandem elapsa hac ætate, dum sat bene se habens aura rurali *Petersdorfsiensi*, frueretur, sumsit, suadentibus in prophylaxin Amicis, lagenam Aquæ Sedlicensis. Vix vero epota illa, ventrem tormina vexant, nec solvitur alvus.

Auctis cum anxietate doloribus, injici jubet clysterem. Sed nec eo prodeunte, in urbem defertur. Clarus ejus Medicus, postquam multa auxilia artis frustra tentasset, Auri fulminantis vires explorare contendebat; sed nec sex ejus doses quid opis attulerunt. Vocatus fui die quarto in consilium. Conclufum fuit fumi Tabaci experiri Clysteres; hisque non opitulantibus, vivum Mercurium cum multo oleo amygdalino propinare.

Injecto porro hoc fumo, fæcum quidem aliquid prodiit, sed morbi interim increvere symptomata. An Tabacum nostrum vilius fuerit, ideoque non
pro-

profuerit; eo quod clarus *Heysterus*, qui hæc enigmata tanti fecit, optimum ad id commendet Tabacum? Præstantissimum profecto mihi in posterum comparabo.

Igitur die morbi 5^{to}. Mercurii vivi libra data est, qui cum Oleo amygdalino, trino haustu, assumptus mox omnem, ut solet, vomitum stitit, Ileumque morbum copiosa alvo brevi solvit. Rescivi postmodum ab illa, nobilissimoque marito, primis ab assumpto hoc remedio diebus Mercurium alvo liberaliter prodiisse, deinde vero parcius: sic quidem, ut 14. ab ejus assumptione die adhuc globuli Mercurii cum fæcibus conspicerentur. Ex illo tempore & bona, & quotidiana Alvus est. Reliqua ejus incommoda perseverabant, & Hydrops crurum, femorumque: sed perseverante tumore Hypogastrii, atque Hydrope intercute artuum inferiorum redeunte, viribus sensim defecit, ac trimestri spatio a curato Ileo elapso periit. Inspectione cadaveris, ut audio, constitit corpus durum, atque ingens, ex Uteri substantia genitum esse. Forte id annorum aliquot spatio dolorem & obstructionem, Intestini sive Ilei, sive Coli, partem plus minus premendo, creavit, ipsumque demum Ileum: ita tamen, ut Mercurii pondus Intestinum compressum dilatare, reddereque potuerit permeabile. Optimus Hofmannus notavit quoque, Capite *de dolore & spasmo iliaco*, a sex Mercurii unciiis assumtis intra 5. horas alvum prodiisse, & cum illa hujus semimetalli unciam, utraque duas hebdomadas semper ejusdem quidquam in fæcibus conspectum fuisse. Cælum hunc post sequentem historiam commentabor.

§. V. Anno 1752. vocabar ad Coquum Ileo morbo laborantem, a *Colica pictaviensi*, ut videbatur, orto. Pleraque auxilia frustra adhibita erant. Etiam auctoritate *Galenii* ingens Cucurbita admota umbilico

fuerat; postquam non modo non levatus fuit, sed in tantas convulsiones incidit, horæ quadrantem durantes, ut a tribus robustis viris vix teneri, vix gubernari, ne sibi noceret, lectove excideret, posset: ex convulsionibus autem, Epilepticorum instar in somnum stertorosum incidit, algido cum sudore, & omni modo pulsu inæquali. Cum autem æger pridie furibunde delirasset; validissimaque convulsione totus quantus in altum esset sublatus, perfectaue Amaurosi affici cepisset; non est cur convulsionem post Cucurbitam natam, Cucurbitæ adscribamus. Amaurosis hæc, ut &, quæ affuit, Ischuria, Ileum, ex Pictaviensium Colica ortum, designabant.

Post hanc convulsionem vomitus continuus fuit potus, alimenti, & medicamenti. Id autem constanter observatum est, quod cerevisiam, quam clam subinde frigidam hauserat, non evomisset.

Quarto die sumsit unc. iii. Mercurii crudi cum unc. ii. Olei Amygd. Eo non agente, dedi sequenti mane, scilicet die morbi quinto, unc. iv. verum duas tantum deglutire voluit; duas reliquas sumsit die sexto.

Ut *Celeberr. Hoffmannus*, loco infra citando, in sua Matrona magnam ab assumpto Mercurio tranquillitatem observaverat, ita quoque in meo Coquo, a tribus hisce singulis Mercurii dosibus, tres noctes longe tranquilliores sequebantur. Alvus tamen nondum solvebatur, nisi repetito enemate. Ab hoc demum alvus copiosa, sed absque ullo Mercurio. Nilominus vomitus redibat cunctorum, præterquam frigida cerevisiæ. Altero enemate injecto modica prodiit, citra Mercurium, alvus; ut & post tertium enema, quod elapso trihorio ab ultima alvo injectum erat. Doloribus inde crudelissimis obortis, insedit calido molliente balneo ad jugulum fere usque $\frac{3}{4}$ horæ. Quartum postea enema, idque purgans,

gans, injectum est; unde alvus quidem prodiit, sed nullus cum ea Mercurius. Dolorum ferocitas & quintum clyisma, idque oleosum, & olei cum opio potum poposcit. Septimo morbi die, post tolerabiliorem ab opio oleoque noctem, sextum Clyisma injectum est, ab eoque cum fæcibus copiosis pars Mercurii prodiit. A septimo & octavo clysmate, sine Mercurio alvus. Die octavo post nonum clyisma aliquid Mercurii fæces habent. Jam demum ad se rediit mens, gutta serena ablata est, appetitus adfuit, pulsusque omni modo bonus. Nona die spontanea Alvus prima, cum plurima veluti corrosi, ac nigricantis, Mercurii parte. Diebus aliquot subsequentibus examinatae fæces, naturali modo quotidie redditæ, nullum amplius Mercurium habuerunt. Gravissimo hoc morbo soluto, nulla secuta Paralysis est; quod in eos noto, qui Paralyfin, a Colica Pictonum oriundam, dato adscribant opio. Sed hos refutare non est opus, cum experientia abunde evicerit 1^{mo}. non raro Paralyfin jam cum morbi principio nasci; dum de opio aut dando, aut non dando, nulla adhuc quæstio fit. 2^{do}. Nervorum vellitionibus, & distractionibus, prudenti opii usu mitigatis, rariorem longe a Colica Pictonum Paralyfin observari, quam quando falso præconcepta de Opio opinio usum ejus in hoc morbo damnat.

Refractam valde Mercurii dosin dedi, cum quod summopere reniteretur æger, ut ex historia patuit; tum quod eandem, eave minorem, sufficere clarî Viri censuerint. *Riverius*, 1. 2. uncias sibi scribit suffecisse. *Sylvius De Le Boe*, *idea prax. med. Libr. 1. cap. 15. §. 53.* idem confirmat. *Paræus Libr. 21.* uncias iii. sufficere testatur. Alias majorem dosin Medici exhibere solent. *Rhodius Cent. 2. N^o. 80.* scribit unc. v. melle rosaceo mistis, Iliacum deploratum se curavisse. *Celeberrimus Hoffmannus Tom.*

4. part. 2. Sect. 2. cap. 4. obs. 4. Matronam unciiis vi. sanavit. Et *Paræus*, qui tres modo uncias dedit, plus dari posse censuit, laudando *Marinum sanctum Paralitanum*, qui plus simplici vice libram, imo libram sesquialteram, mulieri dederit, eamque citra noxam alvo viderit brevi ejectam. *Zacutus Lusitanus Prax. adm. Libr. 2. observ. 35.* strenuissimo Duci libram optimo cum eventu propinavit. Imo *Libr. 2. de Princ. med. hist.* scribit multos in Ileo conclamato Mercurii libra, cum aqua calida hausta, ab imminente morte liberatos esse. *Kalschmidius in Actis N. C.* libram quoque dedit. Et Matronæ nostræ §. IV. libram generose dedimus, 1^{mo}. quia, non ut Coquus, tergiversabatur, sed ad omnia paratam se exhibebat. 2^{do}. quia metus mortis in procinctu erat, ni extemplo levaretur. 3^{tio}. quia cum insons esse remedium constiterit, tutior magna, quam parva, dos esse videtur.

Verumtamen obstat *Hoffmanni* autoritas, qui caute mercandum esse suadet, eo quod ægri a Mercurio epoto non minus iis, qui Mercurium fodiunt, depurant, aut quomodocunque tractant, Nervorum sibi contrahere morbos possint; idque videtur feminae demonstrare exemplo, cui ultra 14. dies quid hydrargyrii alvo prodiret: „ ultimo vero loco, inquit, id non prætermittendum esse censeo, quod „ collectis licet viribus, somnoque & appetitu redeunte, tremorem in artubus, atque vacillationem & impotentiam in pedibus, ultra mensis adhuc spatium, perceperit: quæ permolestæ affectiones dextro nihilominus Balneorum usu prorsus demum sublatae, & discussæ fuerunt.

Negari utique non potest Mercurium, licet in sanis mox alvo elabatur, licet etiam in Ileo morbo sæpe cito pertranseat, tamen in Ileo, obstructis admodum Intestinis, diuturniorem aliquando moram

trahere. Coquus noster eum sex diebus ventre continuit; Matrōna nostra, & ea *Hoffmanni*, 14. diebus, licet copiosa quotidie alvus prodiret. Utrum duriorē fæce, crassove muco, involutus, in Coli cellulis demoreretur, an in Cæci delapsus Appendiculum sit, quibus a locis partitim lenēque depellatur, determinare non ausim. An in hīce latebris moratus ab acrimonia quadam erodi possit? Sicque Nervos non tantum crudus, sed & acēr factus, lædere queat?

Quod si hæc ita se haberent, annon præstaret aureos globos deglutire? Aurum enim Mercurio tanto gravius, videretur esse quoque tanto ad tæces depellendas potentius; & si diutius in corpore moraretur, non foret Nervis inimicum ita, ut Mercurius. In Ileo datum fuerat frustra horrendum purgans ex granis. iv. Mercur. Vitæ, cum x. gran. Troch. Alhandal. Deglutitis tandem globulis aureis duobus, sequenti die copiosissimæ fæces prodire, & globuli aurei post 36. horas: vide *Burneti Thes. part. 1. pag. 357.*

Sed contra: illustr. *Hoffmannus* unicum modo proferre potuit, quo hanc assertionem probaret, exemplum: deinde merito quæritur, num hoc exemplo id, quod probare conabatur, vere probaverit? 1^{mo}. enim Paralytici morbi centies observantur curatos Iliacos a tergo sequi, si Colica Pictonum in causa fuerit, licet Hydrargyron non potaverint. 2^{do}. *Winklerus* apud *Bonetum*, *Med. Sept. Lib. 3. cap. 30.* exhibet hominem nobis, qui ope succi librarum sex putridorum pomorum *Borslorfsiensium* ab Ileo liberatus, nihilominus contractura membrorum, spatio 18. septimanarum laboraverit. Et 3^{tio}. ægri mei, Mercurio ab Ileo curati, nullos passi sunt Nervorum morbos.

Sed aliud quid timetur, ne scilicet frigore noceat.

Unde & nonnullos id calido cum potu, aut jure car-
nium, ut mox ex *Zacuto* discebamus, ingessisse vi-
demus : & *Henricum ab Heers Lib. 1. obs. 2.*, ne
„ Mercurius frigore suo interranea lædere posset,
„ statim clysterem ex puro cretico vino injecisse,
„ legimus.” Hoc autem experimenta docere de-
bent, quæ an adsint, videamus.

1^{mo}. In *Iliaca clari Hoffmanni*, & in meis, Mer-
curius vomitum aut omnino, aut ad tempus, sti-
tit; & symptomata plus minus pacavit.

2^{do}. *Hoffmannus* ibidem casu V. ægræ suæ iliacæ
dedit pro omni potu „aquam fontanam frigidam pu-
„ ram, aqua *Menthæ* correctam, cujus libræ sa-
„ lis *Abfinthii* dr. j. & succi citrei unc. β. adjece-
„ rat, more *Riveriano*.

3^{tio}. Idem magnus Autor gelidæ usum cum Col-
lega *Naboth*, testatur egregium ejusmodi in morbis
se observasse.

4^{to}. Experimenta, *Part. IX. Rat. Med. Cap. V.*
relata, docent *Ileum morbum Neapoli* aqua gelida
curatum; potum frigidum eidem ægro postmodum,
Viennæ eundem in morbum relapso, unice profi-
cium; *Herniamque* incarceratam gelidæ admotu
fuisse sanatam.

5^{to}. Illustris *Hoffmanni* *Oenopola* vomitu cuncta
rejecit, præter aquam gelidam, cui quidem calen-
tis frustulum panis injectum erat, calorem vero ab
illo servare non poterat.

6^{to}. Idem in *Epicrisi* ad hunc *Iliacum morbum*,
hanc suam frigidam aquam laudat impense, testimo-
niumque *Amati Lusitani* affert, asserentis, „ se atro-
„ cem *Intestinorum* dolorem aquæ frigidæ exhibi-
„ tione subito, & incantamenti instar, sustulisse.

7^{mo}. Idem Autor præterea *Tom. IV. sect. 2. cap.*
5. laudat utrosque *Lusitanos Zacutum, Amatun-
que*,
ut „ qui *Colicam Biliosam*, (nobis dictam *Pictavien-*
„ *sem*)

„ *sem*) cum aquæ frigidæ potu , tum nivis usu ,
 „ curatam meminissent.

8^{vo}. Adjungit ad hæc *Hoffmannus* observasse se se
 „ Paralyfin , hac de Colica natam , frigidioribus ,
 „ quam calidis Balneis , magis auscultasse.

9^{no}. *Petrus Forestus Lib. 21. in Schol. ad Obs. 12.*
 mire quoque utrosque *Lusitanos* laudat , quod aquæ
 „ frigidæ interno , externoque usu , complures & a
 „ Colicis , & ab Iliacis morbis , curavissent.

10^{mo}. *Joannes Crato Lib. 3. cons. 13.* Medicos
 magnos existere ait , , qui frigidissimam aquam adhi-
 „ beant in hisce morbis

11^{mo}. *Burnetus in Thesauro Lib. I. pag. 315.* scri-
 bit *Franciscum Gautier* nonnisi frigidissimis tantum &
 exhibitis , & admotis , ab hoc morbo curari potuisse.

12^{mo}. *Septalius Lib. 7. animadv. pag. 248.* Homi-
 nem ventris dolore ad omnia rebelli tere enectum ,
 ut algidus sudor jam adesset , nullusque ultra per-
 cipiendus pulsus ; aqua multa , etiam nive frige-
 facta , sic mutavit , ut mox in somnum 4. horarum
 incideret , ab eoque somno alvum copiosissimam de-
 poneret , ac integræ restitueretur sanitati.

Ex quibus omnibus , ni fallor , conficitur id , ut
 Mercurius frigoris causa non modo non vituperan-
 dus , sed potius laudandus sit : ut cuncta in genere
 frigida actu , motum convulsivum a loco affecto In-
 testini versus superiora moderando , sedandoque ,
 efficiant , ut motus peristalticus ab irritante in af-
 fecto Intestini loco causa exsuscitetur , animetur ,
 solusque nunc agens , materiæ obstruentis determi-
 nationem versus inferiora promoveat.

Nunc forsitan , cum *Hippocratis* Tetani frigidaæ
 aquæ affusione curandi methodo , hujuscemodi con-
 venirent Observata ? Profecto si toties , aut totus I-
 leus convulsivus est , aut convulsio aliunde acce-
 dens , hunc morbum alias fors solubilem , jam irre-
 so-

solubilem reddit, gelidorum Nervis applicatorum efficacia, videretur ex methodo *Hippocratis* explicanda: & esset quoque huc referenda Historia, quam *Ill. Præses* ex *Act. Edimb. Tom. 5.* profert, in qua ad morem Hippocraticum prudens gelidæ affusio Ileum morbum, qui consuetæ methodo, calentibusque fomentis, minime obaudiverat, feliciter sanavit: quo eodem modo illustris *Westerhoff, Rat. Med. Part. IX. pag. 96.* incarceratam Vetulæ Herniam, calidis fomentis immorigeram, aquæ gelidæ applicatione sanavit.

Est tamen methodus Tetanum curandi *Hippocrati* duplex: altera quidem frigidis, calidis altera admotis; ut demonstravi *Part. X. Rat. Med. pag. 112.* Eodemque plane modo duplex & nostra est: plures enim & calidis epotis, & calidis percuramus fomentis; nec, nisi his irritis, ad frigida audacter confugere solemus.

Quæstio superest an tuto in hoc morbo violenta & acria remedia Umbilico adplicentur?

Varia argumenta videntur huic applicationi patrocinari. 1^{mo}. *Galenum* novimus ingentem Cucurbitam Umbilico admovisse, idque plures laudasse Practicos.

2^{do}. *Ballonius Epid. I.* „ Vidimus, inquit, cui-
 „ dam acerbitate doloris colici detento, placatos
 „ esse dolores, adhibito Umbilico modico empla-
 „ stro caustico, & veluti Escharam faciente, & in-
 „ tus foras evocante. Sic refert ille, licet haud om-
 „ nino id approbare videatur, sed, ad affinia effectui
 „ remedia, aliquanto autem tutiora, ut confugiamus,
 „ hortetur.

3^{tio}. *D. Sennertus Lib. 3. part. 2. Sect. 2. Cap. 2.*
 & quoque *Lib. 5. part. 3. Sect. 3. Cap. 6.* „ Efficax
 „ est ad Colicam Oleum Saponis, quod sic paratur:
 „ R. Sap. Hisp. part. I. Calcis vivæ part. II. De-
 „ still. per alemb. vel retort. Oleum ab aqua sepa-
 „ re-

„ retur , cujus gtt. 6. vel 7. Umbilico cum gossy-
 „ pio imponantur.

4^{to}. Dissertatio *Duispurgi ad Rhenum* prodiit , anno 1763. Autore *Mathæo Bruckner* , de *Colica Pictonum* , cujus in cura commendatur lati , fortisque Emplastri Vesicantis, cum Cantharidibus parati, applicatio , ad locum Ventris plurimum dolentem.
 „ Hoc, inquit , ita agit per Nervos in Emissaria
 „ organorum excretoriorum , ut disponantur ad
 „ transmittendum recrementum. Non extimescen-
 „ dus est ille dolor levis, inde excitatus , ac si do-
 „ lorem dolori adderemus. Nec volumus inquire-
 „ re , an revellendo , an attrahendo , an stimulan-
 „ do , agat illud ? Scire sufficit optatum impetrari
 „ effectum , puto doloris colici imminutionem ex
 „ topico tali, anodyno hic omnium summo. ” Sed
 cum in Colica Pictonum præcipuus dolor ad umbi-
 licum sævit, videtur Autor ille Vesicantis ad Um-
 bilicum intelligere adplicatum : imo posthac id vi-
 detur jubere, siquidem addit : „ Interea dum, hæc
 „ aguntur , nempe cum Vesica elevatur in regione
 „ umbilicali &c. Ergo umbilico applicandum ju-
 „ bet, idque diu tenere apertum ; sin minus , a
 „ latere alterum imponendum esse. ” Ac de-
 mum addit : „ curam tutissimam , citissimam, ju-
 „ cundissimam , *methodo nostra constanter observavi*
 „ *succedere*, qua *Paresis* arceri & præcaveri potest ,
 „ & debet : & quo citius his succurritur, eo minus
 „ periculi.

Non video cur minus in desperato hoc morbo ute-
 remur Vesicantibus, quam in sæva Pleuritide, post-
 quam debitæ & evacuationes, & applicationes, ve-
 hementiam non moderantur doloris : unde cum Ve-
 sicans in Pleuritide sæpe miranda præstet ; cum &
 Acria, & Vesicantia, Autores in Ileo morbo tanto-
 pere laudent ; tuto nos in hoc morbo vesicantibus
 uti

uti posse arbitror; postquam, ut in pleuritide, consueta artis adminicula incassum adhibita fuerint. Et quemadmodum haud in laterum dolore Inflammatorio duntaxat, sed & in Rheumatico, atque Spasmodico, Vesicantium laudamus, extollimusque effectum, ita quoque in varia Ileii natura eadem confore reor.

Est autem aliquid, hac occasione monendum. Oleum Lini clysmate frequentius injectum, Oleum amygd. recentiss. ore assumptum, morbo huic egregie mederi non semel vidi; ipsum autem Lini oleum, cum nauseosum sit, ægrique hi continuo fere vomant, raro ore sumendum dedi: cum tamen id ipsum nunc percipiam ab exp. Viro *Gallesky*, *Tiltsitsensi Medico*, tot tantisque efferri encomiis, dum unum ejus, alterumve cochleare, quavis hora in potu aliquo calido exhibetur; ita quidem, ut etiam post stercoreum vomitum salutem afferret; tuto quoque in posterum explorare expedit.

Machinam Italicam, de qua *Part. 8. § 9.* egi, in hoc morbo tantopere laudatam, Brutis tantum applicui, non applicaturus hominibus, donec numerosa *Italorum* exempla majorem ingerant fiduciam audaciamque: tum quod semel iterumque sese obtulerit experimentum in Cadaveribus humanis, tantam esse nonnunquam Valvulæ Coli resistantiam, ut ne ingens quidem hujus Machinæ potentia eam potuerit superare; tum præsertim, quod mirandus ac formidandus ille casus, quem *Rat. Med. Part. 9. Cap. V.* retuli, homini profecto, si contingeret, letum indubitato esset illaturus.

C A P U T X V I.

De Vario Hydrope.

§. I. *Paracentesis Abdominis fortunata, quam Lymphæ educ̃ta sperabilem non fecerat. Laus Corticis Peruviani hoc in casu. Phænomena Lymphæ educ̃tæ, & facta cum eadem experimenta.* §. II. *Altera Paracentesis Octennis puellæ. Aliquid circa requisitam corporis in Paracentesi positionem. Remediorum a Paracentesi datorum, Chinæ potissimum, recensio. Experimenta cum Lymphæ facta.* §. III. *Paracentesis tertia feminae 28. annorum. Et quoque optimos a Cortice peruviano hæc est experta effectus. Occasione experimentorum, de Lymphæ captorum, quædam de Lithiasi. Explicatio Textus prognostici ex Hipp. Libr. ij. Prorrh. Quædam de Hydrope Peritonæali.* §. IV. *Paracentesis quarta. Phænomena Lymphæ. Duplex in hac femina morbus, Pectoris, Ventrisque. Incertitudo utrum cum Ascite Cysticus, an solus adesset Ascites? Reditus Ascitis post Paracentesin, & tandem Mors. Anatome. Epicripsis Tumor in Vita manifestus, in Cadavere non invenitur; ad quod explicandum §. sequens adornatur.* §. V. *Tumor Epigastrii mobilis; tumor profundior Ventris veluti emphysematicus, in vita percepti, citra eorundem in Cadavere vestigia. Ascites adfuit. Cur haud instituta in illo Paracentesis? Anatome mirabilis. Epicripsis. Phænomena Lymphæ. Curiosa Membrana inventa in Ventre. Ventriculi degenerationes frequenter prope Pylorum inveniuntur. Quid demum fuerit id, quod nobis tumoris dederit perceptionem? De interna externaque sanguinis transsudatione. De judicatoriis nihil judicantibus.* §. VI. *Cysticus Hydrops, in quo octies est instituta Paracentesis. Enarrantur auxilia, quæ*

quæ interne externeque admota sunt. Mors. Inspectio Cadaveris. Multa in eodem maxime notanda. Et Virgines quoque uterinos quosdam morbos, quos alias viro usæ, pati possunt. De Vermibus quædam. §. VII. Pathologica discussio quintuplicis nobis noti Hydropis, una cum serio examine Imo. Diagnosticorum singuli signorum; 2^{do}. Auxiliorum, quæ peti ad singulum ex Medicina, Chirurgiaque, soleant; 3^{io}. ex demonstratione incertitudinis Diagnoseos, tutior medendi Methodus proponitur.

§. I. **F**emina 25. annorum, convenit me die 15. Maji anni 1766. referens elapso abhinc sesquianno se, in quintum mensem gravidam, febre intermittente correptam fuisse, ab eaque non liberatam, nisi sexta demum a Partu septimana. Lochia parcissime fluxisse; vix detumuisse a partu ventrem; & in octavam usque septimanam sese macram, debilemque, lactasse infantem: febre autem sexta a partu septimana exulante, tumidiorem ventrem sibi redditum fuisse, cruraque tumere cepta: hæc tamen postmodum, non illum, detumuisse.

Deprehendimus manifestam in Ventre fluctuationem. Nonnullis Medicamentis frustra usa erat: & licet a sex retro septimanis Baccarum Juniperi infusum, quod sæpe confert, largiter bibisset, paucam tamen admodum urinam reddebat, multaque siti vexabatur. Menses tamen sub hujus infusi usu redierant, appetitus aderat, & quotidiana Alvus.

Dedi ipsi sale Alcalinum in Vino; Vinum squillicum, aromaticum, &c. a quibus dum nihil omnino levaretur, ad Paracentesin obeundam in Nosocomio mansit.

Paracentesi 28. Maji instituta, prodire 68. Libræ aquæ, non fætentis quidem, sed subrubellæ, grumoso sanguine in Vasorum fundo paulatim collecto.

Lympha

Lympha ad ignem parte multa avolabat, parte aliqua coagulabatur; admistu fyrupi Violarum colorem non mutabat.

Emulsio leviter paregorica mox dabatur, admista uncia unica aquæ Cinamomi simplicis, a qua molesti post operationem flatus commode discutiebantur. Pressione aquarum ablata, promota mox urinarum secretio & excretio est: sic ut decima postea hora urinæ libram mingeret, deque die in diem copiosius, cum crasso sæpe sedimento.

Et hoc die, & toto tempore, quo in Nosocomio fuit, calor 96. 97. graduum, calor utique hominis sani, fuit. Mox bonus ab operatione appetitus, quamque passa inexplebilem erat, sedata sitis fuit. Intra 15. dies adeo convaluit, ut repeteret pagum suum.

Eventum adeo felicem aqua, ventre educta, sperare vetuerat. Copia namque magna cruoris singulo in vase, quo eam effluentem exceperamus, subsidebat. Hinc partis cujusdam Diabrosin, facileque insequuturam Gangrænam, similes olim captæ observationes vereri jubebant.

Ut autem, quoad ejus fieri posset, hanc infaustam Prognosin averruncaremus, dedimus feminæ mox a conspecta postridie hac Lympha, unciam integram Corticis Kinæ quotidie; domumque redeunti semilibram ejus procuravimus illi, ut unciam mediam quotidie adhuc sumeret.

§. II. Octennis puella, parvæ valde staturæ, rachitica, Variolas quinquennis passa, sana exinde, ceperat ineunte Octobri 1766. abdomine tumescere, & intra 14. dies ejus esse molis, quam nobis medio Januario 1767. in Nosocomio, cum manifesta fluctuatione, monstravit. Cum ab egregio solertissimoque Medico *S. Rathberger* optima ac selectissima remedia, summa quidem cum prudentia, incassum

vero, exhibita essent, autor matri fui, ne inani medicatione vires ultra dilapidarentur, ut paracensesi aquam extrahi sineret. Annuit. Jan. 21. eam instituimus.

Instrumentum triquetrum difficulter intravit, nec sine dolore solito majore. Causam rimati,prehendimus eam hic esse, quod jacente corpore lympham minus in pubem gravitans, superiora versus fugiat, si Venter totus lympham non expandatur. Unde si quis postmodum evacuandus Hydrops est, qui universum ventrem non tendat, corpore erecto puncturam faciemus; ut a gravitante aquarum in Epigastrio mole tendatur maxime is, qui pertundendus est, locus.

Libræ duntaxat sex effluxere Lymphæ, nihil fæctentis, ad ignem coagulabilis, ex flavo viridescentis, turbidioris, ac sensim ejusmodi floccos suspensaque filamenta contrahentis, ac si serum, aut lympham, in filamenta jam coagulata, in reliquo humore fluctuaret. Alvus, & urina, quæ pigræ antea, ac parcæ fuerant, mox libere, copioseque, fluxerunt. Dedi illi libram Emulsi cum uncia Syrupi Althææ de die, similemque nocte cum uncia Syr. Diacodii. Nulla fitis. Appetitus, somnus, pulsus, vires, bona. Urinæ plerumque major, quam assumti liquidi copia; sic ut videretur, liberatis ab aquæ compressione visceribus ouropoieticis, id, quod reliquum lymphæ, infimo in ventre fuisset, & absorptum, & renibus feliciter excretum fuisse.

Decima exinde die, quo restaurarentur omnia, & Recidiva averruncaretur, Cortex Peruvianus ipsi datus, eoque 3. septimanarum spatio sic usa puella est, ut decoctum unciæ mediæ Corticis absumeret quotidie. Convaluit egregie, ita ut Matri brevi restitueretur; ac medio ab illinc elapso anno sese nobis belle valentem stiterit.

Lympham Paracentesi eductam, in tribus majoribus vitris servatam, quotidie examinavimus, & necdum putrem eam 4. Febr., die post operationem 15., invenimus. Quin denuo hoc 15. die lympham nitido in cochleari igni exponentes, more feri sanguinis, & sani, & recens educti, in massam scissilem, albuminis ovi instar, coagulari deprehendimus. Cum Syrupo Violarum tamen viridescebat, virore post biduum evanido toto. An signum alcali hæc viridescentia? Flavi colores solent hunc syrupum viridem reddere perpetuo. Sed & serum non, aut vix, flavum, quod quorundam hominum sanguini misso adest, syrupum viridem reddere vidimus. Et ovi albumen, minime coloratum, syrupi viridem reddit colorem. An igitur cuncti humores animales latens quoddam Alkali possiderent, quod syrupus violarum præprimis indicaret? Attamen serum hydropicum §. 1. hujus capitis syrupi haud mutavit colorem: an hoc, quia pauca tantummodo parte coagulabile erat? Verum cur omnis ab hac miscela virore natus, intra biduum evanuit? Sed quoque in misturis color, eisdem a syrupo hoc conciliatus, brevi mutatur.

Die 12. Febr. qui a Paracentesi 23. erat, ipsa hæc Lympha, eousque conservata, manifesto efferbuit cum aceto. Alia ejus portio ad ignem coagulata fuit: indurescebatque præterea in scissilem massam glutinosa illa materies, quæ in Lympha hac primo diu suspensa, ad fundum denique subsederat. Liquor proinde animalis, qui quiete, in aëre aperto, 23. dierum spatio, & putrefactus, & alcalinus erat, vim adhuc plasticam suam, seu coagulabilem, servat; ubi tamen humores putredine resolvi, ac sua coagulabilitate privari, vulgo creditur. Doleo me tentamen cum syrupo Violarum hoc tempore neglexisse.

§. III. Femina 28. ann. procera, torosa, venusta, convenit nos die 25. Octobr. 1765. enarrans sequentia.

Decennium erat ex quo nupserat. Vix nupta autem, dolore, atque ardore Abdominis immuni, cepit torqueri spatio nocturno; qui, ut alvo pertinaciter clausa ceptus, ita quoque enemate passim solvi solitus est. Quotannis hucusque idem malum repetivit, semper autem ad enema consuetum conticuit. Quinquennium numerat ex quo intumescere cepit Abdomen, paulatimque sibi visum est augescere. Passa quoque totis hisce annis Cephalæam gravem, frequentemque, est. Gravida nunquam fuit. Catameniorum perpetuo ordinatum fluxum habet. Album fluorem primo sex menses passa, citra ullum ardorem, doloremque, postmodum vero tantum circa menstruum tempus. Mane solet tussire, crassamque ejicere, glutinis instar, materiem. Alvus bona. Facies sana, pulchra. Nullus unquam crurum pedumque tumor. Decies & octies, dierum 9. spatio, *Baadenfi* balneo usa citra levamen est; nisi quod recuperaverit, quem amiserat, appetitum: at tamen angī a pastu solita, appetitum explere non audet. Non fitit unquam fere in vita sua. Sedentaria est.

Ex observationibus, quas occasione alia §. VI. recensebo, Hydropem aut saccatum, aut peculiarem inter Peritonæum ac musculos abdominales locatum, suspicari quis posset; sed manifesta fluctuatio arguebat Ascitem. Quamobrem remediis in Ascite plurimum laudatis, ac potissimum Vino, bulbo recenti Squillæ, Aromatibusque, medicato, morbum debellare ultra duos menses annis, spem aliquando magnam fovi salutis; verum malo rursus increfcente, Paracentesin suasi; quam cum repudiaret, rem commisit naturæ, nec rediit.

Tandem die 29. Julii hujus, quem vivimus, anni, se rursus stitit, monstrose tumens, maxime hypogastrio, Paracentesi subitura: quam elotis pridie intestinis, die 3. Augusti perfecimus. Ascites enim haud minus jam, quam olim, ex fluctuatione manifestus apparuit: quin & nunc raram Alvum, ac paucam conquerebatur urinam.

Figura hæc abdominis, monstrosius nunc ad Hypochondrium penduli, atque ad media femora descendens, revocabat nobis in memoriam Ventris effigiem, quam *Job van Mekerem in suis Observationibus* dederat, una cum phænomenis, eorum, quæ femina nostra patiebatur, consimilibus: circa quæ egregius vir *J. B. Morgagni* haud minore cum judicio, quam experientia, commentatus est: & circa quæ ipse postmodum fusius disseram.

In Paracentesi ægra doluit transeunte instrumento, minus principio, quam fine, antequam totus venter esset penetratus.

Aqua limpida, inodora, non colorata, librarum 54. pondere effluxit; ultimo in vase leviter tincta cruore, eo quod aquam omnem vacuare conati, vulnus utcumque irritassemus.

Ut omnes, ita hæc femina, nullam debilitatem, nullam anxietatem, nullam vultus mutationem passa est. Quippe causa horum incommodorum prævenitur, hodierno more adaptando machinam Aqualiculo, quæ illum totum pro ratione educæ lymphæ molliter, æquabiliterque, stringat. Et quod omnes passim numerosi flatus ac borborygmi torquent, nostra non est passa, cujus rei mox forte ratio patebit.

Cum nunquam sitiret, vix bibit die libram emulsi, & Panadellam in nutrimentum sumsit. Nihilominus sex & ultra libras urinæ misit. Pulsus,

somnus, optimi. Atque ita a principio operationis bene se habens, domum rediit 13. Augusti.

Verum quemadmodum prioribus, sic & huic mulieri, Corticem Peruvianum dare cepimus jam tertio ab operatione die, mediæ uncix quantitate spatio nocturno; ne scilicet operationem Gangræna sequeretur, ut vires conservarentur, fluida compingerentur, ac demum adstringerentur, roborarenturque sic solida, ut omnis recidiva, quoad ejus fieri posset, averruncaretur. An igitur quod ægri nostri tam belle se se post Paracentesin, habeant; quod quovis pravo Symptomate careant; quodque tam cito ad negotia sua redeant; Corticis Peruviani usui magnam partem adscribendum est?

Lympha asservata in spatioso cubiculo, in quo, ope venti admissi, calor Atmosphæræ, foras calidissimæ, vix 70. gradum excederet, ut non in educatione factuerat, ita nec toto quatuor dierum spatio factorem ullum contraxit: his demum elapsis sensim factere cepit; omnium vero primum illa, quæ ultimoeducta, sanguinis id pauculum, cujus memini, gerebat. Porro idem ille sanguis pauxillatim disparabat, atque lympham pellucidam relinquebat, minimeque coloratam: hæcque iterum lympa, corrupta demum penitus, exhibuit nobis copiosam arenam, ad latera vasis affixam, eodem plane modo, quo toties in Urinis ægrotantium contemplamur.

Confirmatur inde Lithiasin haud unice ab urina, verum etiam ab aliis generari humoribus; mirumque propterea non esse, quod quocumque humani corporis in loco calculos Medici, atque Anatomici, invenerint. Nec minus capitur causa, ob quam ruber noster sanguis rubedinem pedetentim amittere possit; sic ut demum pallidus humor, vix coloratus,

in

in internis palpebris, labiis, internis naribus, totoque ore interno, appareat.

Lympha hæc & principio, & post quatrimum, & cum demum foetebat, in puro cochleari igni imposita in massam scissilem coibat. Confirmatur hinc observatio §. præcedentis.

Redeamus paulisper ad Diagnosin nostram, quæ vel cum Hydrope ascite Cysticum, vel Hydropem peculiarem, Peritonæum inter musculosque abdominales, designare videbatur; eoquod in utraque hac specie, collectis sententiis *Nuckii in Adenographia*, *Gullmanni Tom. 3. actor. C. N. Obs. 105.*, *Maucharti. Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 14.*, *Drelincurtii in Resp. ad Epist. de rec. med. st. Littræi Acad. Sc. Reg. Par. 1707.* plurimumque aliorum Autorum, id evidenter constat, quod mensium naturalis fluor, faciei nativus color, appetitus, vix sitis, crura non tumida, virium integritas, priore saltem tempore, observari soleant: quæ profecto omnia in nostra femina aderant. Sed dubium brevi solvebatur; ut mox patebit. Eductis Paracentesi aquis, Venter quidem nobis minus justo concidisse videbatur, verum cum Machina quæ, suppositis hinc inde pulvinarculis, abdomen arcte constringere debebat, conveniens ejusdem impediret examen, nostrum suspendimus eodem tempore judicium; donec post Octiduum, machina ablata, tumor ventris appareret, & quidem Cysticus ille, & magnus, & fere medio in abdomine, sub umbilico sinistrorsum locatus, quoque corporis situ vario volubilis in omnem, maxime in sinistram, partem. Sic quidem ut Hydropem cum Cysticum, tum Asciten, una in ventre femina gereret; & hoc punctura ablato, illum adhuc pateretur.

Hæc data a claris scriptoribus signa Hydropis, five Cystici, five inter musculos abdominales,

Peritonæumque locati, ea ipsa sunt, quæ magnus *Hippocrates*, diffuso suo textu *Prorrhēt. Lib. II.* ad felicem in Hydrope Prognosin absolute requirebat. Eadem signa nostræ ægræ in Hydrope & Ascite aderant, & Cystico. Ascites hinc bonum exitum per Paracentesin habebat: sed Hydrops cysticus, si ex bonis istis signis internoscatur, non sustinet tamen bonam Hydropis, quam *Hippocrates* curabilem facile existimabat, prognosin; utpote quæ serius ocysus in interitum vergat. Neque etiam bona eadem signa bonam sæpe Prognosin in ea Hydropis specie formant, quæ Peritonæum inter musculosque est: quandoquidem distinctos prope Umbilicum tumores crebro habet, a quibus degenerascens ejusmodi Hydrops sæpe nascitur, & a quorum malignitate mortem inferre solet. Ergo bona hæc signa faustam quidem prognosin & in Hydrope αὐτὰ σαφὴν, & in Ascite formare sæpe solent; rarius vero in Hydrope Cystico, & eo, qui musculos abdominales inter & Peritonæum fit.

Mulier nostra, quæ, ut retuli, Corticem Kinæ mox a principio sumsit, sumere illum ad medium Augustum, summo emolumento, optimisque cum excretionibus, continuavit. Dolore Colico tunc, cum modica admodum fæcum urinarumque excretionem laborans, purgante *Aq. Lax. Vienn.* bis sumto, datisque Paregoricis ac Mulcentibus, brevi convaluit: ita tamen, ut novi Ascitis post hanc Colicam principia iterum animadverti videantur. Ut autem urinæ fluor, qui post hanc ultimam Colicam parvus erat, promoveretur, sumsit remedii compositi ex Bals. peruviani dr. jβ. Vitelli ovi n. i. & syrupi Glycyrrhizæ unc. iij. cochleare parvum omni trihorio: hujus auxilio urinæ laudabilissimæ, cum virium, cunctarumque functionum restitutione, tumorisque decremento, hucusque profluant.

§. IV. Convenit me in Nosocomio femina 33. annos nata, die 26. Nov. 1766. narrans ab ipsa sua infantia difficiliore respiratione se laborasse; sanam cæterum ac vegetam octo infantes se feliciter enixam esse, atque lactasse; ita tamen, ut dum infantem octavum lactaret, nonnihil sanguinis cum sputis reddidisset. Elapsis autem 15. ab hinc mensibus, se passam esse abortum, ac sanguinis octo integris septimanis perseverantem fluxum: quo vix cessante, denuo concepisse se, ventremque in eadem graviditate præter consuetum graviditatis morem intumuisse; tussi deinde, ac vomitu, floridique expuitione cruoris laboranti sibi, Venam tussam esse; quo effectum, ut sputi sanguinis cessaret quidem violentia, sed idem tamen cum glutine nonnunquam adhuc prodiret. Nec ventrem solum præter graviditatis morem extumuisse, sed tribus ante partum septimanis & crura tumida fieri cepta. Medio demum Septembri se peperisse quidem feliciter, vix vero ventrem concidisse, octiduo primo infantem lactasse se se, monente autem Medico, ablactasse. Die a partu octavo, more vulgi Austriaci, Templum se adiisse, recrescentibusque brevi viribus, & ventrem sic a data medicina collabi cepisse, ut jam durum quoddam in eodem corpus, cum a se se, tum a medico, deprehenderetur: verum triduo post in molem priore duplo majorem extumuisse abdomen, idque ita pertinaciter, ut nec priora, nec alia selectissima remedia, nec ipsa, quæ diu affuisset Diarrhœa, quidquam profuissent. Respirationem laboriosam nunc sibi esse, Tussim acrem, noctes insomnes.

Hac facta ab illa, maritoque, Anamnesi, ad formandam Diagnosin, & Prognosin, multo non erat labore, opus: ex enarratis quippe facile constabat, quemadmodum in casu proxime priori, Ascitem, &

simul aut Cysticum esse Hydropem, aut alius generis tumorem; defectu autem bonorum signorum, quæ supra recensuimus, ambiguum valde esse Hydropis utriusque Prognosin.

Cum manifesta perciperetur Lymphæ fluctuatio, cum vita feminæ miseranda, ac fere intolerabilis esset, viresque palliantem saltem admitterent Paracentesin, quin & eandem expeteret ægra; 27. Nov. instituimus illam. Haud ultra 30. Libras educere potuimus. His eductis, mox durum corpus, & inæquale, dextro in latere, pone Umbilicum, deprehendi. Thermómetrum in oblongo vitro Lymphæ, mox eductæ, immersum totum, notavit gradus 99. quos eisdem ipsa mulier paulo ante operationem notaverat.

Lympha educta flava, & limpida, dum & mox a Paracentesi, & octiduo post, igni imponeretur, sic disparuit, ut levis modo, ac tenuis, pellicula relinqueretur. Conservabatur omnis Lympha in 15. vitris majoribus, -quorum in uno alterove subaciduli quid odore advertebatur die 8^{vo}, die vero 11^{mo} quid putridi, absque ulla tamen cum aceto effervescentia. Cubiculum in quo servabatur hæc lympa gradus caloris 62. 64. perpetuo notabat, nisi forte semel iterumque paulo vehementius accenso fornace.

Urinam, post operationem, paucam semper ægra reddidit; &, contra id, quod cum in nostris urinis fanis, tum in iis febricitantium, quotidie observamus, urinæ ejus, in 12. diem asservatæ omnes, nec mihi, nec mecum examinantibus multis aliis, vel minimum exhibuere fætoris; quamvis indies magis fuscescerent, sedimen formarent, imo situm quendam, eæ priorum dierum saltem, contraherent. Sedimen urinarum quatuor priorum dierum lateri contrito, ut Hydropicorum sæpe est, simile fuit; reliquorum autem dierum subflavum.

Quo tempore urinæ sedimen lateri trito simile, eodem tempore febricula adfuit. Cortice actutum tunc dato, & febris cessavit brevi, & sedimen rufum. Febriculam hanc pulsu, haud vero thermometro, cognovimus: hoc enim perpetuo calorem signavit naturalem.

Flatus post operationem affuere quidem, sed haud molesti. Dolorem a die quarto a Lumbis ad inguina tendentem quæsta est.

Quæ præcedentibus, & huic data emulsa sunt. Miscui cum Cortice Peruviano diuretica: hæc nihil operabantur; illius vero ope & febris filebat, & renascebatur appetitus, somnusque, & pectus liberum fuit, & cessantibus antiquis torminibus Ventris, alvus quater, quinquies quotidie, cum levamine, commodeque, posita fuit; vires tandem eo creverunt, ut tota fere die extra lectum esse amaret.

Cum omnibus hisce emendationibus, lymphæ die 7^{mo} reditum percepimus, ita ut tamen durum corpus, de quo supra, adhuc deprehenderemus.

Itaque duo morbi principes videntur adfuisse: alter pulmo debilis, ac, cum tussi, sæpius quid sanguinis sputis commisti, semel sanguinem purum floridumque, ejiciens: id quod a diathesi jam infantia, a repetita toties graviditate, partuque; nec minus a tot infantum lactatione, oriri potuisse facile capimus. Alter morbus, Ascites; quem in graviditate nona, a nimia per abortum hæmorrhagia eam reor contraxisse: qui & ipse Hydrops ascites, utrum a tumore quopiam præternaturali cujusquam in ventre visceris originem duxerit; an vero præter Asciten verus Hydrops Cysticus adestet, coram Auditoribus determinare non potui.

Crescente immaniter Ventris tumore, Paracente-
fin alteram suasi, viribus egregie constantibus: ma-
luit

luit vero illa proprios repetere Lares, aptisque ibidem medicamentis uti.

Posthac sæpius se stitit coram, statum exhibitura suum, auxiliumque petitura: hyeme vero asperiore solus maritus venit. Tandem vi morbi victa maritum urisit, ut in sella gestatoria in urbem, & nosocomium, se se ferret; quo a me examinari, & sive medicamentis, sive altera Paracentesi, suis levari miseris posset. Marito id renuncianti præ letali ejus debilitate dissuasi. Dies 17. Martii calamitatum finis fuit.

Die 18. Martii, elapsis 30. a morte horis, cadaver examinaturus accessi, non modicam Medicorum ac Studioforum inveniens catervam. A diuturna ponderosi corporis decubitu, ab humorum putredine, vitæque diu minima, consumserat Gangræna lumbos, femora, nates: purpureusque color crura, ventremque, deturpabat.

Tumidissimus sane ac monstrosus Aqualiculus fuit: extantibus cum Sterno costarum infimarum cartilaginibus plurimum extrorsum. Eratque adhuc ita tumidus tunc Venter, licet non in Paracenteseos loco, sed pone illum, facta sponte apertura inveniretur, qua liquor de ventre extillasset, jamque, moto pauxillum cadavere, ingenti jactu erumperet.

Spontanea hac apertura cultro dilatata, aqua copiosissima profiliit, eaque limpida, subflava, fætida admodum. Mensurare eandem, ac ponderare, defectus in his ædibus vasorum, instrumentorumque, vetabat.

Evacuatis illis, animus erat tumoris duri, quem in vita toties deprehendebamus, examinare originem, naturamque; verum nihil ei simile reperiimus. Quid ergo Mulier, quid nos, dum videbamus ingens

gens ibidem corpus toties deprehendere, revera deprehendimus?

Cunctorum intestinorum superficies gangrænosa apparuit. Ipsa vero intestina, in hoc spatiosissimo ventre, spatium haud majus, quam in parva puella expleissent, occuparunt: Aquarum quippe prodigiosa moles intestina omni ex parte in parvam compegerat massam.

Sed antequam loco quidquam moveremus, obstupescibamus eam gibbi Diaphragmatis altitudinem; quæ Thoraci, pro corde pulmonibusque locandis, vix spatium relinqueret. Haud enim, ut sæpe, gibba Diaphragmatis pars mammarum æquabat altitudinem, verum una costa in sinistro latere, duabus costis in dextro, altior fuit: Sic ut Cor ad jugulum fere hæreret, Diaphragmate æque altissimo, quo loco ad Pericardium connascitur, quam alibi.

Aqua haud Intestina duntaxat, sed & Ventriculum, & Jecur, & Splenem, versus dorsum compresserat sic, ut ipsa hæc aqua ante omnia hæc compressa viscera, interque eadem & trusas extrorsum infimarum Costarum cartilagines, musculos abdominales monstrose expansos, elatumque valde diaphragma, amplissimum sane spatium occuparet.

Quamvis brevis adeo Thorax, inferius scilicet plurimum repandus, nihilominus præ Diaphragmatis altitudine jecur totum intra Thoracem delituit; lobo majore dextrum, mediaque parte sinistrum, non dico Epigastrii, aut Hypochondriorum, verum ingentis illius cavi, ab elato Diaphragmate formati, omnino explens. Vid. Tab. II. Fig. IV. Lit. H.

Hepar pallidum totum; & dum discinderetur, non tactu, sed visu, apparuit granulofum.

Modice plena vesicula fellea duriusculi quid intra se gerere credebatur; perscissa autem bilem exhibuit, non spissam modo, sed & grumofam, & ut

Hip

Hippocrates Bilem atram depinxerat, fæci olei similem.

Splen magnus valde ab aqua quoque versus postica pressus, pro maxima parte infra lobum sinistrum Jecinoris locatus erat; mollioris ille substantiæ, digitisque in pultem facile conterendæ. Lit. G.

Ventriculus magnus sub conspectum non venit, nisi Colo Intestino remoto; sic ut oblique deorsum tenderet inferiore valde abdominis loco: id quod facile ibi fieri potuit, ubi Ventriculus Diaphragma, hic non elatum, pertransit, Oesophago pollicem & ultra infra Diaphragma elongato; ut pluries in cadaveribus observamus, & ut clarus Vir *Morgagni* haud raro observavit. Lit. F.

Colon, cæteraque Intestina, in locum, id quod mox monui, longe arctiorem, collecta erant, cunctaque livebant: tenuia parum, imo solito minus, expansa; Colon vero valde amplissimum a Cæco usque ad plexum in sinistro latere ad C.; ubi vero de suo plexu devolvebatur, ad D. angustius inaniusque fuit: Nec flexum Hepaticum, nec Lienarem fecit, at vero sic decurrebat, ut ad A. ex Cæco Intestino oblique ascenderet ad B. inde oblique sinistrorsum ad C. quo in loco supra se se reduplicatum erat: emergumque inde ad D, non ad latus lævum abdominis extremum, sed secundum Lumborum spinam deorsum tendebat, formatum ad E Intestinum Rectum.

Boni Renes: Ureteres solito multo ampliores.

Uterus feminae, quæ decies pepererat, illo Virginum haud major erat: Ovaria bona. Monstruosum sane saccum apertus totus Aqualiculus referebat: & moles omnium Intestinatorum ad sese mutuo compactorum, vix molem intestinatorum pueri æquabat. Laminæ perfcissi crucialiter Peritonæi, in latera reflexæ, explebant fere totam latam valde Tabulam,

in qua Cadaver repositum erat; quod, quoad ejus facere potui, in Figura exhibui. Quamobrem eo magis doleo nos, præ vasorum defectu, effluentium aquarum mensuram, quæ omnem forte fidem superasset, capere non potuisse. Vide Lit. KKKK. Quæ autem Literis II. notantur, sunt oblongæ ac leves eminentiæ, quæ a retroflexis cum Peritonæo integumentis formabantur, formantes quasi latera abdominis.

Atque hucusque Diaphragma insolitam suam servabat, quam prius mirati fueramus, altitudinem: dum vero Thorax incidebatur, mox idem quadam veluti vi deprimebatur: quin & albidi valde Pulmones spatiosiores longe locum mox occupabant. An pulmonibus in statum violentum compressione redactis, ea infedit, superfuitque, expandendi se, atque naturalem in molem se ampliandi, potentia?

Numquid atmosphæricus aër, glottide in Pulmonem illapsus, mox ab ablata externa pressione, eousque extendit eundem?

Modica sinistri Pulmonis cum Pleura cohæsiō, dextri nulla; id quod in compressione adeo forti, & diuturna, vix expectari potuisset.

Paucæ guttulæ rubellæ in toto Pericardio.

Cor dextrum primo incisum, congrumato sanguine plenum fuit; lævum quoque, sed dextro minus.

Hydrops igitur fuit Ascites, a nimia quidem cruoris in Abortu jactura ortus, qui una cum insequente mox graviditate inchoans, cum graviditate aliquantum, post partum vehementer auctus, remediisque haud auscultans, Paracentesi evacuatus quidem, sed, causa remanente, renatus fuit. Aqua hæc, Paracentesi educta, non plastica, ad ignem fere evanescens tota in auras, haud tamen putrida, putredinem valde sero contraxit; quemadmodum & Urinæ, post Paracentesin missæ, solito tardiores contraxere putre-

tredinem. Ipsa hæc Hæmorrhagia ut causa, quemadmodum vitalem liquorem ita profundit, ut demum sensorio communi deficere videatur id, quod Nervorum prospiciat actionibus; sic quoque vasa eandem ob causam debilitat, redditque desidia in agendo. Unde humorum tenuium, haud compactorum, pars aquosa per flaccida, desidiaque vasorum oscula, in cava corporis effunditur; ibidemque, quod vasa inhalantia ad resorbendum inepta sint, colligitur, ac ventrem explet. Eductis his Paracentesi aquis, defuit tamen Sanguini id, quod Cerebro debuisset dare: mansit flacciditas vasorum, inertiaque talis, ut ne optima quidem Cardiaca & replentia, & adstringendo roborantia, apta hisce vitiis reparandis eousque fuerint. Unde mox novus oriretur tumor necesse fuit. Hunc forsitan altera, tertia, compluresque Paracenteses, sustulissent; ita ut sic vel mors procrastinata fuisset, vel etiam, auxiliis aptis solida fors restaurata, inque sua fluida rite agentia, penitus hanc Hydropis causam delevissent. Jam vero Paracentesi neglecta, aquæ eousque ventrem inundarunt, omniaque impleverunt, ut viscera vitalia ad suam functionem redderentur inepta; ut Intestina compressione fierent gangrænosa; ut gangræna etiam a defectu circulationis oborta, corporis extrema corrumperet, & sic denique ægra summis pectoris anxietatibus, viriumque defectu, suffocaretur.

Supereff ad duri tumoris, & ab ægra, & a nobis, toties percepti, ac nulla sui in cadavere vestigia relinquentis, examen nos convertamus. Possibilene est molis corpora tantæ, sponte scilicet sua, fatiscere sic, ut nullæ eorum reliquæ, nulla omnino vestigia, postmodum advertantur?

Ad hanc quæstionem ut respondeam, Historia enarranda alia est; postquam duos hosce parietes una fidelia dealbare conabor.

§. V. Mulier a die 17. Maij, anni 1757. ad medium fere annum 1759. nos sæpe convenerat, varia variis conquesta diebus, dolorem autem præcipue, pondusque in medio Epigastrio perpetuum; postquam pluribus antea annis eodem in loco non, nisi imminente Mensium fluxu, doluisset: pondus hoc durum sibi videri, tendi nonnunquam, volvi, moverique, aliquando in duos tresve globulos divisum sibi visum esse, &c. Gravida interim facta, ultimoque graviditatis tempore miserrime habens, die 17. Jul. 1759. in Nosocomio peperit: qua occasione de morbis gravidarum, parturientium, puerperarum, atque infantum, publice egi. Tempore postremo graviditatis, ipso in puerperio, postque idem, dum illam propter infantis incommoda aliquot septimanis in Nosocomio detineremus, hoc de pondere, atque dolore, vix conquesta est. Brevi autem postea, siquidem lactare infantem non posset, cum redeuntibus mensibus periodicum hoc pondus, atque dolor redierunt, & cessantibus tandem, præ annorum L. ætatem, Catameniiis, denuo afflixere perpetui.

Tandem anno 1764. mense Septembri, gravi ex alto in Ventrem casu, validam Hypogastrii contusionem passa est, enormemque dolorem, ad quem non modo nullum auxilium adhibuit, sed &, ad quem summa paupertas cogebat, laborem, ligna in ^{stam} contegnationem quotidie ferendi, perrexit. Victa demum morbo, lecto commisit se, alvo ab octiduo carens, quam demum sale amaro solvisse se ait. Conquerebatur per Epigastrium tubera nodosque, veluti concatenatos, initio percepisse se; in Hypogastrio autem, quo tempore aut alvum, aut urinam, aut flatus, emissura esset, adeo vehementes dolores expertam esse, ut quos toties enormes passa erat partus dolores, eosdem longe superarent. Ad

hæc omnia tandem universi Abdominis tumor accessit. Totoque hoc tempore somnum vix oculis viderat, vix appetiverat, nec nisi urinam paucissimam crudelissimo cum dolore miserat unquam.

Duodecim diebus a lapsu exactis, venit demum Maritus in nosocomium, petiturus auxilium. Vix rem ex illo capiens, palliantia quædam præscripsi, & omnem operam navavi, ut in urbem ac nosocomium deferretur. Die 4. Nov. huc delata est. An moru currus effectum id, ut urinam, quam toto hoc tempore nonnisi guttatim, dolentissimeque reddiderat, copiosam nunc, minusque dolorificam, ac pleno jactu, ex quo in Nosocomium suscepta esset, emitteret?

Ventrem examinavimus actutum. Conspectu ille externo, tactuque, tubera & inæqualitates duras, Tympanias in morem, nobis exhibuit; sonitum vero Tympanias non dedit, sed obscuram potius Ascitis fluctuantis ideam. Non sitiebat, nec cruribus tumebat. Itaque Ascitis atque Tympanitidis suspicio erat; ast dolor tantus, & ante casum ab alto, & post eundem, perceptus, non solet horum alterutrum aut a principio, aut perpetuo, concomitari; præcipue ad Vesicæ, Rectique Intestini, excretionem. Anxia quoque pectore perpetuo fuit, nec lecto decumbere unquam, nisi elatiore pectore & capite, potuit. Tussis frequens aderat, sputaque glutinosa. Alvus perpetuo dolorifica & dysenterica; flava quidem ac pultiformis, posthac vero tenesmoidea, cum mucositate non pellucida, sed lineis sanguineis notata, quibus Recti successit prolapsus. Frequenter nauseat. Aquarum fluctuatio sensim manifestior fit.

Ex principiis artis de Paracentesi hic cogitandum non erat, sed pro crebritate ac varietate symptomatum, sæpe contraindificantium, agendum. Varia dedi-

dedimus ad ea quæ potissimum urgerent, iisque so-
lumen multum, instabile tamen, conciliavimus. Et
cum in Hydropis cura tantopere laudaverint cum
Prisci, tum recentiores Medici, clysmata urinæ
sive Ovium, & Asinorum, ut *Avicenna*; sive Vac-
carum, ut plures Moderni; sive etiam hominum,
ut *Valeriana*; qui Lib. 1. Obs. 2. „ enema ex im-
„ puberis pueri urina parabat, cocta cum tantillo
„ fermento panis, seminis Carthami, cum melle
„ despumato, eoque mirifice Hydropem allevari
„ testatur: nullo enim magis, quam hoc, detu-
„ mescere ventrem, aquosa excerni, & flatuosa
„ discuti, æger sentiebat: estque hic, inquit, Cly-
„ ster mihi in ejusmodi affectibus familiaris, atque
„ probatus. ” Et in *Actis Acad. Reg. Sc. Paris.*
anni 1707. clarus *Lemmery* multa de Juvenæ urinæ
commentatus est, variasque attulit ad hujus usum
conditiones. *Michelottus* quoque apud *ill. Morgagni*
assererebat „ Juvenæ urinam sibi feliciter, nec se-
„ mel, adversus Anasarka cessisse. ” Et ipse *Mor-*
gagni Epist. Anat. Med. 38. „ hanc medicinam ani-
„ malem petenti ægro concessit, & ore quidem as-
„ sumendam, quæ principio quandam ipsi ebrieta-
„ tem concitavit, sed non, quam prioribus, utili-
„ tatem. ”

Duo præterea Viri expertissimi extranei, hanc
nostram ægram invisentes, Vaccinæ urinæ enemata
summopere commendabant, pulcerrimis id experi-
mentis edocti. Unde intra octiduum quater ejus-
modi clyisma injici curavi; sed destiti, cum nullam
evacuationem notabilem promoveret, & singula
vice vehementer dolorem augeret. An forsitan ma-
lum provectius, quam ut admitteret medelam?

Mense Januario 1765. major, quam unquam,
ventris tumor, ambitu quidem mollior, in medio
vero longe durior, & quidem sic, ut in hoc medio

durum corpus inesse perciperetur, quod dextrorsum sinistrorsumque extendens sese, in dextro tandem Hypochondrio terminabatur. Ardor illum ac dolor comitabantur. Sed jam cum tumore strepitum validum plures Medici, ac Medicinæ studiosi, mecum integro adverterunt octiduo, quo elapso, ultra perceptum hujus nihil. Accessit Hydrops intercus. Pectore quoque dolens ac tussiculosa toto quidem morbi tempore, circa vitæ vero finem cum maxime fuit. Gangrænam intestini elapsi, eamque natium, lumborum ac scapularum, licet tribus ultimis vitæ septimanis ægra nunc inscia, nunc involuntaria, lectum putridis fecibus continuo conspurcaret; nos tamen, mutato lecto creberrime, inungendo bis die cunctas, in quas decumbibat, partes unguento, quod ex albumine ovorum cum spiritu Vini paratur; & admoto ad intestinorum prolapsum decocto corticis Peruviani, feliciter præcavimus. 20. Martii obiit.

De morte certi Anatomen, transactis 16. ab illa horis, fecimus, mirati externum corporis, internumque viscerum abdominalium calorem; quamvis cadaver mox a morte in frigida admodum cavea depositum fuisset. Doleo me antea non explorasse cadaveris ope Thermometri calorem, nec illum, aperto ventre, viscerum: unde forte detexissemus, quo usque calor, quem sæpius fere naturalem, bihorio post mortem, deprehenderamus, etiam hic sedecim a morte horis cadaveri, saltem visceribus ventris, perseverasset.

Libras xiv. lymphæ ex ventre eduximus, quæ ex albo fuscescebat, ac plures fuscas pseudomeninges gerebat; ubi autem aliquantisper steterat, gelati quid in superficie sua habebat: In portione Libr. V. postremo educæ, separatis vasis excepta, inerat multum gelati, ei confimilis, quod in educto de-

DE VARIO HYDROPE. 415

venis sanguine, dum in compactam crustam non formatur, semipellucidum, ac sæpe copiosum, contigit crassamentum sanguinis.

Sed Pseudomeninx alia nostram mentem figebat. Non enim, ut assolet, flava erat, sed plane rubra, tenuia intestina tegens, extendens sese supra Colon, ipsumque Jecur, quo usque hoc viscus, ut mox patebit, non erat cum vicinis partibus connatum: emittebatque de sese processum, qui ad Mesenterii centrum, & alium, qui ad Lienem sese affigens, secundum posticum Coli latus in pelvim descendebat.

Hepar concretum undique cum Diaphragmate sursum, & a posticis, anterius cum Peritonæo, deinde cum Colo, ipsoque cum Ventriculo; excepta plaga quadam in ipsius, nempe Jecoris, dextra parte, aliaque sub cartilagine mucronata. Concretio hæc fortis, ac membranacea fuit, hinc vi, illinc non nisi visceris dilaceratione, solvenda. Ruffum Jecur erat, totumque granulofum.

Ventriculus ab Hepate connato solutus, ad Pylorum duos in ambitu pollices durus erat, tuberosus, scirrhusus, hic tres, ibi quatuor, alio iterum in loco sex lineas crassus.

Coli fusco-purpureus color.

Ren sinister durus; dexter tota sua corticali substantia cartilagineus.

In vesicula fellea pauca flava bilis, & calculus unicus, asper, fere rotundus.

Uterus exiguæ admodum cavitatis, substantia sua nonnisi durum cartilagineum corpus.

Circa pelvim intestinum Colon firmissima, ac membranacea concretione cum Intestino Recto coa-luerat, & contractum glomerem cum omnibus, quibus adjacebat, partibus, referebat, sic ut hic omnino immobile hæreret.

Pulmones ambo cum Pleura, cum Diaphragmate, cum Pericardio, Mediastino, mutuisque inter sese lobis, firma ac membranacea concretione, unicum veluti corpus componebant: sinister postica parte gangrænosus totus. In una aliave non connata plaga Thorax uncias aliquot lymphæ collectas gerebat. Modica in Pericardio aqua. Cor suo apice cum Pericardio connatum erat ope processus fere cartilaginei, tres lineas crassi, digitis non dilacerandi. Cordis dextri substantia tenuis, ac flaccida; sinistri digitum crassa, atque ita compacta ac solida, ut absolute non videatur contrahi potuisse: massam quippe referebat præ duritie vix flexibilem. Sanguis grumosus in eodem, quam in dextro, multo copiosior.

Igitur Hydropem Ascitem invenimus, adeo vero mediocrem, ut ventri admodum extendendo par non fuerit; ita ut alias causas inquirere tanti debeamus tumoris, tantorumque phænomenon, quæ cum in viva, tum in denata, circa ventrem animadverterimus.

Ac primo quidem ex tota historia morbi evidens fit ventriculum omnium primum se male habuisse, & ex obstructione, vel ex rosione acrium lenta, in enormem hancce crassitiem, perfectumque denique scirrhum degenerasse.

Sed hujus mali sedes prope Pylorum inventa est. Notemus hic 1^{mo}. *Ill. Hoffmannum* ejus sententiæ fuisse, ut in Cardialgiis Pylorus & potius, & primario, afficeretur. 2^{do}. Optimum *Morgagni* censere haud quidem omnes, sed plerasque chronicas ventriculi degeneraciones, exulceraciones, indurationes, atque scirrhus, in ea ejusdem parte reperiri solere, quæ pone pylorum est. *Epist. Anat. med.* 29. Quare a vero haud alienam esse *Hoffmanni* censet sententiam. Multa quoque nobis suadent duros pendulosque tu-

mores in cadaveribus prope pylorum inventos, plerumque oriri a laceris, & calloforum ibidem ulcerum membranis, eorumve reliquiis degenerascensibus.

Porro aiebat femina a decennio se in medio Epigastrio pati: ac primum quidem periodice ad mensium tempora: sic ut bene fluentibus illis, dolore, tumore, pondere, anxietate, flatu, nausea, caret; mensstruis vero propter ætatem cessantibus, se hisce incommodis perpetuo excruciar. Prava ventriculi conditio principio exigua, atque paulatim duntaxat aucta, ad menstruam plethoram, motumve, potissimum irritata fuit, eaque soluta, quievit: at vero malum indies crescens deficientium Catameniorum tulit omne pondus; eo profecto modo, quo aliis atque aliis feminis, aut caput, aut pectus, aut lumbus, aut intestinum, aut uterus, aut vesica, a cessante motu menstruo potissimum afficitur. Eamque ob causam, & antequam illa ad nos veniret, & quamdiu apud nos fuerit, ac præsertim postquam lapsus in ventrem violentus hanc partem gravius affecerit, dolor haud ultra periodicus, sed continuus fuerit, oportuit. Atque hæc si sic fiunt, secundum leges ordinarias, secundum communes fiunt observationes. Quod ideo noto, quia lege plane extraordinaria deprehendimus homines nunquam aut hæc, aut similia, in vita esse conquestos, quorum tamen cadavera & has, & his deteriores degeneraciones, seu in ventriculo, seu prope eundem, seu in visceribus aliis, dudum habuisse, pluries demonstravi.

2^{do}. Causam aliam capimus, ob quam mulier dolorem dolentem in medio Epigastrio primum periodice, tandem continuo, perpeti debuerit. Actionem ventriculi, contenta versus pylorum promovendi, perturbari magis oportuit magisque, partis hujus indies augefcente rigiditate, atque crassitudi-

ne, ab accedente primum plethora menstrua, seu universali, seu saltem uterina, postmodum ab eadem plethora jam continua. Mirum proinde hoc non est, quod amplificaretur ventriculus, quodque magis induresceret; eo quod contenta in se edulia, potum, aëremque, diutius longe debuerit retinere, antequam per eam induratum sui partem, perque arctatum transmittere potuerit pylorum. Nausearum hinc intelligimus, molestorumque flatuum, quos conquesta toties fuit, originem.

3^{to}. Ab ejusdem ventriculi cum jecore & colo, cohæsiōe, actio ejusdem digerens, miscens, movens, compingens, atque ad pylorum determinans, vehementer impedita, exposita mox symptomata multum augere debuit.

4^{to}. Sed cur plures nonnunquam tumores, catenatim veluti invicem nexos, loco instabiles, & conquesta illa est, & nos aliquando tactu percepimus?

Tactu, visuque, Tympanitidem sæpe videre videbamus, eo tantummodo desiderato, qui Tympanitidis est, sonitu. Sed lymphæ cum Tympanitide præsens, sui que præsentiam fluctuando notans, an non sua interpositione suffocavit sonitum? Credibile. Itaque cum intestinum colon, prout in cadavere paruit, ea emetitum spatia sit, in quibus duri illi tumores observabantur, merito credimus colon hoc sæpe in globos tympaniticos, & quidem nunc in medio ventre superiore, nunc dextrorsum, deorsumque expansum fuisse, sicque concatenatorum globorum perceptionem creasse tangentibus: idque profecto eo magis, quo hoc ipsum colon cum ventriculo & hepate firmitus esset connatum, hincque sua in actione plurimum turbatum.

5^{to}. A casu in ventrem gravissimo, contusio, & inflammatio ejus Coli partis, qua in gyros convolutum supra principium Recti inventum fuit, immanem

illum effecit, quem Anamnesis refert, dolorem: & quia inflammata pars, quod non perspiret, cum vicina coalescit, ac fortiter cohæret, actio omnium harum partium læsa fuit. Inde ea dolorum sævities, quando tanta vi diaphragmatis, & abdominalium musculorum, ad exitum fæcum, flatuum, & urinarum, per coalitas hæc partes promovendum, opus erat; & quando Colum in sua actione Rectum, hocque vicissim illud, in expulsiōe suæ materiæ distrahebat, ac vellicabat. Quippe dilacerationi sæpe proximas fuisse hæc mutuo adeo coalitas partes, in egerendo necesse est. Præterea externa recti intestini tunica cum illa coli connata cum esset, interior ejusdem tunica cedere impetui debuit, anoque prolabi: unde etiam, dum nonnunquam alvus & urina & flatus commodius redderentur, intestinum hoc non prolabebatur. Quoad dolorem autem in reddenda urina, licet cum ceteris Vesica haud coaluisset, actio tamen respirationis ad mingendum necessaria, dum æque in intestinorum coneretorum glomerem preffit, quam in vesicam, etiam mictus creavit dolorem.

6^{to}. Undenam strepitus ille, quem tangendo toties, primum ad coli principium, deinde paulo elevatius, idque non externe, sed profundius in abdomine, clare percepimus?

Strepitum ejusmodi raro, nisi ab aëre in crassa alicubi materiæ, aut in cellulositate, diffuso, percipere solemus; non enim memini me aut proprio experimento, aut lectis didicisse Autoribus, aëra in cavo intestino tympanitico, aliove cavo majore, strepitum edidisse: non enim strepitum vocamus Borborygmorem murmur. Unde credibile est emphysema tunc temporis inter varias intestini membranas adfuisse; idque vel ideo a morte non patuisse, quod diu ante mortem cessante strepitu, intestino-

rum membranæ, abeunte aëre, iterum collapsæ essent, & sic ne aëris quidem vestigia servare potuerint.

7^{mo}. Quid de mira illa Pseudomeninge cogitandum?

Si revocemus nobis in memoriam, quo pacto omnes illæ pseudomeninges, a transpresso sero sanguinis visceribus atque membranis circumfusæ, nascantur, haud multum laboris hæc explicatio habebit. Notavi suo loco in lymphæ, ventre eductæ, gelatam materiem, eamque copiosam, apparuisse: videtur proinde ex arteriis viscerum abdominalium exhalantibus multa materies, ejus, quæ alias crustam inflammatoriam facit, simillima, exhalasse; visceribus autem pro more minime concrevisse, quod aqua undique alluens, concretionem ad viscerum superficies prohiberet. Igitur exhalans hoc inflammatorium serum in lymphæ fluitavit; eodemque modo, quo eadem lymphæ in vitris nostris quiescendo collectum hoc serum exhibebat, etiam idem serum, in vita feminæ in aqua fluitans, videtur in diuturno decubitu fundum lymphæ petiisse, visceribus incubuisse, & sic pseudomeningem illam cum omnibus suis processibus genuisse.

Regeres cum pseudomeningibus ad viscera, membranasque adnatis, non inveniri commistum cruorem, adeoque, quæ data fuerit, solutionem, non satisfacere: respondeo quemadmodum viscerum exhalantia vasa, ut pro rore serum sanguinis inflammatum transsudent, multum dilatentur sit necesse, ita eadem, gradu dilatationis uno majoris, globulos sanguineos transmittere: qua unica ratione explicatur quoque sudor sanguineus, quo nonnulli in plena sanitate ad axillas laborent, & quo quosdam a metu ingenti, hosque inter Sanctimoniam, ab invadente milite stuprum metuentem, toto corpore perfusos fuisse,

fuisse, Historia refert. Vide *Schenckium*, aliosque. An non peripneumonicorum, pleuriticorumque sputa, lineis sanguineis notata, eodem modo explicari queant? Unde neutiquam miror amplæ huic pseudomeningi tantam adfuisse cum flavo rubedinem.

Instabis ultra consideratione mulieris temperamenti, quod a tot tantisque chronicis æruminis in Hydropem quidem convertum, a statu autem inflammatorio alienissimum fuerit. Sed refero in majoribus obstructionibus, viscerumque compressionibus, sanguinem liberis in vasis comprimi, densari, compingi, disponique ad inflammationem: qualem inflammationem videre quandoque est in sanguine Hydropicorum, qui vel secta imprudenter vena, vel narium profunditur fluxu, vel ventriculo, pulmonibusve, eructatur.

Confirmavit hanc experientiam meam ipsa hæc nostra Mulier; dum, nona & octava septimana ante mortem, ab ingente febre, eademque continua, & ab intolerabili anxietate, præsentissimo in mortis periculo versans, nec alio sublevanda auxilio, terna sanguinis missione modica ab interitu veluti resurgeret. Sanguis enim singula missione crasse compactus, crustam nobis exhibuit duram admodum, ac flavam, valdeque contractam. Tandem sputa, quovis die, pluribus ante interitum septimanis, nonnunquam partim, nonnunquam tota quanta puriformia, absque ullis Pulmonum vomicis, tuberculisque, inventis, hanc perennem diathesin sanguinis inflammatoriam ostendunt, evincunt. Verbo, membranas densas, ac flavas, sero coagulabili inflammato genitas, haud secius eorum in cadaveribus invenimus, quos lenti, quam quos acuti morbi, sustulerint.

Attentionem autem nostram excitat sputorum, alvi, atque urinæ, pluribus ante obitum septimanis,

nis, quotidiana Coctio, ac veluti Critica evacuatio; dum interim, in pejus labente de die in diem ægra, cunctæ hæ evacuationes veræ coctionis, criseosque, notis caruerint. Profecto in morbis acutis, atque in inflammatoriis, hæc *κρίσιμα μὴ κείνοντα*, ut ea *Galenus* vocabat, ne tuta crederemus, toties nos monuit *Hippocrates*, nisi reliqua bona signa una adessent. Videtur autem sic cum hac re comparatum esse: inflammatoria sanguinis Diathesis, nata a morbo acuto, morbo coquitur, vinciturque sic, ut ultra non adsit. Diathesis eadem nonnullis sanis naturalis, morbo acuto aucta, vi acuti morbi eatenus aut resolvitur, aut critice expellitur, ut id, quod ab acuto morbo antiquæ diathesi adjectum fuerat, deleatur; ea ejus portione superstite, quacum olim in *ἰδιόσυμπερσολα* tali affuerat sanitas. Nata tandem in corpore eadem diathesis tota præternaturalis, sed ita abundans, ut, quantumvis sputorum, aliarumve excretionum, ope evacuetur, nihilosecius inexhausta persistat; nihil emendationis affert, & demum corpus pessumdat. Exemplis pluribus *Ratio medendi* hoc demonstravit.

Atque ita problemati §. proxime præcedentis, cui post relatam hanc morbi, atque Anatomes, historiam, responsum distuleram, abunde me respondisse reor. Causa nimirum intelligitur, cur tumores, iique & majores, & plures, ita disparere suapte sponte queant, ut postliminio sive in vita multos annos sana, sive etiam perpetuante se morbo, sive denique in denatis corporibus, nullum sui vestigium exhibeant. Unaque ex hisce liquet, haud quaquam omnem esse insanabilem Tympaniam; quandoquidem in utraque hac ægra, in utriusque miserabili, brevique perituro corporis tabernaculo, sponte concidit.

§. VI. Anno 1765. medio Augusto Puellam 16. annorum examinavi, torosam, optimi coloris, rite

men-

menstruantem ; quæ ab aliquot retro mensibus, in plena sanitate, paulatim tumescere orsa, plurimum jam tumebat. Tumentis abdominis expansio inæqualis tympanitidem quidem referebat, ast, qui tympanitidis indicium est, sonitus deficiebat. Desiderabatur quoque ea, quæ Hydropem Ascitem designare solet, fluctuatio. Tribus postmodum Medicis, præclaris in arte Viris, mihiq̃ue, Puellæ repetentibus examen, obscurior quædam animadversa fluctuatio est. Dixi Hydrops si sit, eum cysticum esse, quam diagnofin dudum ex ejusmodi ægris, quorum cadavera postmodum incideram, didici, quamque postmodum a Cl. *Morgagni Epist. Anat. méd.* 38. §. 67. 68. 69. 70. 71. multiplici observatione confirmare vidi. Nullum enim hic dubium, utrum Cysticus esset hydrops, si revera hydrops esset, an vero illa hydropis rarioris species, quæ inter Abdominis musculos, atque Peritonæum fit: ut seq. §§. clare patebit.

Fluctuatione manifestiore indies percepta, Paracentesis decreta in consilio fuit, ac die 29. Augusti instituta, sinistro in latere, in sacci cujusdam majoris veluti fundo: dixi enim supra, ventrem inæquali extensione loca eminentiora, ac depressiora exhibuisse.

Prodiit aquæ fuscæ, turbidæ, non fætentis, copia mensurarum quinque, 20. Librarum medicarum. Nihil ultra educi potuit. Neque subsedisse venter nobis visus est. Nullus unquam fætor in singulæ Paracenteseos lymphæ, spatio 24. horarum conservata, observatus est.

Die 1. Septembris similem copiam ex prominente loco lateris dextri eduximus: inodora lymphæ fuit, sed minime turbida.

Finiente Septembri in sinistri lateris prominentia facta paracentesis, haud ultra tres mensuras evacua-

re potuit aquæ turbidæ valde, inodoræ.

Cum altero die Epigastrium universum vehementer turgescere deprehenderetur; quamvis visu, tactuque, communicare inter sese utriusque lateris aquæ viderentur; instituta quarta paracentesis est in dextro latere, paulo altius, plusque versus lineam albam, quam antea. Educere non potuimus plusquam tres lymphæ inodoræ, pellucidissimæ, ac straminei coloris, mensuras.

Iterata sic quater operatione, lymphæ, dextro de latere semper limpida, de sinistro perpetuo turbida, Libræ 64. cum aliqua confidentia ventris evacuatæ sunt. Color interim, vires, appetitusque, boni.

Sensim tamen urina inquietudinem pariebat. Toto tempore morbi in Septembrim usque, urina copia debita, conditione sana, reddita erat; jamque cum dato vino squillitico & longe profusior urina prodiret, & longe prominentius abdomen redderetur, conclusimus diuretica attenuando & ad renes determinando agentia, in hydropicas cystides, veluti legibus vix ultra subjectas circulationis, non agere ultra; agere in humores corporis sanos, in quos solos agere non debuissent: valedicendum itaque esse hisce, quæ quo operantur potentius, eo plus, humores dissolvendo, augent hydropem. Neglectus hujus observationis innumeros ægros ante diem, humano more loquendo, perdidit.

Dixi mox Cystides hydropicas legibus circulationis vix ultra subjectas esse; aliquem tamen locum adhuc superesse, unde sanies, ichorve, intra sanguinem absorberetur, urina indicavit: hæc enim Septembri mense, eoque fere integro, turbida fuit, ac crassa, opaca, ex albo quandoque leviter subcærulefcente pellicula tegebatur, sedimentumque deponebat furfureum: medio autem Septembri fætor,

isque ingens sæpe, adjunxit sese; ita ut urina quæ missa momento erat, cum aceto effervesceret. Quæ de causa conclusum est corpus potu *Limonada* dicto, quem ægra vehementer amabat, implere; Kinamque porrigere.

Parciori Corticis dosi minime auscultans fætor, tandem mense Octobri liberaliori ejus dosi disparuit omnis.

Interea totus venter tumidior fit, absque ulla, hucusque imminuta ventriculi, pectoris, viriumque integritate. Vide hic iterum *Epist. 38. Morgagnianam.*

Ventre igitur longe tumidiore, ex sacco eminentiore lateris dextri eductæ sunt XI. Libræ aquæ limpidæ, atque inodoræ: biduoque post de lævo latere aquæ fuscæ & turbidæ Libræ XIV. Posterioris paracenteseos hujus vitrum prius nonnihil fætebat, reliqua minime. Ventre æque turgescente, Puella omnes functiones comedendo, respirando, gradiendo, optime perficere pergebat.

Die 4. Jan. 1766. in consilio decretum fuit septimam instituere Paracentesin, in eoque eorum opinio prævaluit ut, lymphæ eductæ, saccus injectione aquæ hordei mellitæ elueretur, & ab adhærente ad ejusdem parietes muco vel sanie derergeretur; ut optimis Parisiensibus Chirurgis moris esse *Tomus secundus Acad. R. Ch.* fidem facit. Utque etiam cannula bene adaptata, & firmata, qua lymphæ & mucus jugiter extillare posset, in vulnere maneret. Hoc ipso die hæc omnia tentabantur: quin & vacuo Siphone aërem sæpius ex vacuo aquis sacco extrahere tentatum est.

At vero, quod ab illis, qui non abiverant in hanc sententiam, prævisum erat, ilico contigit. Elapso scilicet trihorio dolor ingens oboriebatur, ac febris valida. Hinc protinus educta cannula est, febrimque, quæ perseverabat, deinde cortice peruviano, qui

qui una posset metuendæ gangrænæ prospicere, abigere conabamur.

Die 14. Jan. Ventre ubique, ac superius maxime, turgente, octava paracentesis facta est sinistri lateris, qua non plus tribus libris turbidæ, multumque mucaginossæ materiæ, educi potuit. Tentata iterum sacci deteritio, aërisqueeductio.

Ex septima autem Paracentesi dolor ventris, febrisque continua remittens, ægrotam perpetuo vexarunt, quamvis continuo Kina uteretur. Pauca urinas minxit, easque cum copioso ruffo, rubro, sedimento; appetitu plane destituta, noctes insomnes, anxiasque transigens, quantumvis paregoricis usa, & inexplēbiliter sitiens. Ita ut, febre, bis ad 10. matutinam, tertio die ad meridiem, cum horrore, ac vomituratione, ingravescente, demum die 27. Jan. piā animam creatori redderet.

Elapsis 24. horis, cadaver aperuimus. Inducto instrumento per cicatricem Paracenteseos, aut prope illam, materiem partim purulentam, partim glutinosam, eduximus. Aperientes hunc sinistri Hypogastrii saccum secundum ejus longitudinem, deprehendimus eundem omni ex parte liberum, præterquam ad peritonæum, quocum vagis, fortibusque fibris, cohærebat. Quibus fibris, ut & iis aliorum saccorum, dissolutis, universum abdomen denudavimus, quo conspectui omnia paterent.

Sed turbatum parumper examen fuit. Quo expeditior Anatome fieret, abdomen Chirurghi perforaverant, uteductis aquis mox paterent contenta ventris. Animus autem mihi fuerat accurate explorare, utrum Hydrops Cysticus solus, an quoque Ascites adesset? quod haud inepte quis ex aqua limpida, quam ex dextro latere semper eduxeramus, suspicari posset. Jam vero elabente ex sacco pertuso aqua, corpore simul in latus, anterioraque, reclinato,

to, incertum plane fuit, utrum aqua, quæ paracentesi cadaveris prodierat, effluxisset per cannulam omnis; an vero etiam faccum inter Peritonæumque, quocum sacci laxè tantum cohærebant, furtim sese insinuasset. Impediebamur inde quoque examinare num injectio detergens non etiam parte sui effusa in ventrem esset.

Peritonæo toto usque ad margines costarum ablato, nihil ab ima pelvi, ad diaphragma usque, excepto eo, quod primo intuitu credebatur Hepar esse, nisi unicus, ast tumore vario inæqualis sacculus, ventrem videbatur explere: quæ inæqualitates in vivente nobis veluti totidem sacculi esse apparuerant: videbaturque totus ille, ingensque sacculus, suam ducere ab uno Hepate originem.

At vero propius omnia intuiti, reperiēbamus rem longe alio modo se habere: Hepar nempe intra costas delitescere totum, quodque Hepar credideramus, esse peculiarem sacculi tumorem.

Sacculus porro qui, ut supra relatum, vagis productionibus, potissimum prope umbilicum, pauloque altius, cum Peritonæo concreverat, lata valde basi versus pelvim cohærebat cum uterino systemate.

Unde faccum universum cum utero, tubis, ovariis, e ventre solvimus. Apparuit tunc evidenter adhæSIONIS sacculi principium ad mediam fundi uterini partem inchoare, cohærere deinde cum mesenterio, cum peritonæo ad ossa pubis, ad musculum psoam & iliacum internum, ad nervum; vasaque cruralia; terminari tandem digito lato a dictis musculis, dextrorsum.

Uteri collum oblongum admodum; sinistra ejus cavitas naturalis capacitatis; dextra in parte, concretis parietibus, cavitas nulla: quam ob rem nec ibi vestigia tubæ. Sed neque sinistro in latere, ubi uterus ceterum naturaliter se habebat, tuba patebat.

Ovarium sinistrum naturali duplo majus, cartilagineum, scabrum, scirrhum, una denique insigniore, pluribusque exilioribus hydatidibus, plenum.

De Tuba dextra tota, deque dextro ovario, nulla vestigia: lata modo membrana a medio uteri fundo ad inguen sese fortiter affigebat.

Porro crassa hæc membrana tres quatuorve latos digitos lata, a fundo uteri & inguine adscendens, mox expandebatur in saccum inæqualem, tuberosum, integrum abdomen replens, atque inferiore sui parte extuberante universam quoque pelvim explens, protuberantia sua inferiore obvelans crassam illam, unde originem ducebat, membranam.

Veri simile itaque fit, ipsum ovarium dextrum in hunc immanem saccum degenerasse: cujusmodi ovarii degenerationes superioribus in tomis retuli complures; maxime *Tom. II. Cap. 2. §. 3.* ubi eodem modo, quam hic, Ovarii saccus accumbendo cum utero concreescens, æque latam in origine basim referebat.

Saccus ipse hic lineam, ibi duas, alibi digitum, pollicemque crassus, hinc inde mollis, nonnullis in locis cartilagineus, in aliis scirrhus, in tria potissimum tubera dispescebatur, quorum sinistrum maximum erat, inferius minus, dextrum minimum, sed omnium solidissimum: qua de causa, uti etiam ob figuram situmque, principio nobis imposuerat ac si hepar esset, a quo saccus ipse nasceretur: color autem eo hepatis albidior, ipsumque demum altius inventum hepar, revelarunt errorem.

Notavi supra Chirurgos, ante adventum meum pungendo ventrem, magnam contenti in eo liquidi copiam profudisse. Quamobrem non potui in sacco tali loculamentum invenire, ex quo 20. libras aquæ unica vice eduxeramus; collapsa enim omnia erant. Neque in dextri lateris cavitatibus eam limpidam
lym-

lympham reperii, cujusmodi olim in singula evacuatione prodierat. Forte tempore postremo limpida haud amplius, sed turbida, sed mucaginosa, dexter hic saccus continuit aquam, vel forte, ut supra innui, limpida illa aqua ascitica fuit.

Ipse saccus, qui hucusque nobis in tres divisus apparuerat, hoc modo se habuit: quocunque in loco incideretur, membranaceis sepimentis in varia variæ amplitudinis loculamenta divisus erat. Loculamentorum horum majora, tubercula continebant, quæ aut scirrhos inæquales, politasve cartilagineas, referrent, aut hic aquam, ibi pus, alibi mucaginem, continerent. Pus enim, mucusve tenax, aut aqua, cavitates omnes sive majores, sive minores, explebat. Singularis autem nigredo, seu ex atro profunde fuscescens color, majoribus inerat cavitatibus, haud a gangræna, sed eo modo ubique apparens, uti ille, qui in oculo retinam, uveam, ciliaresque processus, convestit.

Itaque ovarium dextrum, paulatim degenerascens, in tantæ molis saccum excreverat, ovulaque cum calicibus suis in tot loculamenta mutata erant. Hæc porro ovula scirrhusa, cartilaginea, hydatice, facta sic erant in hoc monstroso ovario, quemadmodum mutata reperiiebantur proportionem minorem, (*en miniature*) in ovario sinistro: perinde ac ovarium sinistrum, in sua parvitate, veluti prototypum esset monstrosi Ovarii dextri.

Membrana autem sacci universi, membranæ cunctorum loculamentorum, tumorumque, rubris vasis, iisque permultis, scatebant, diametro auctis cum ovarii incremento. Non referebant ergo hydaticeas membranas, quæ vasis carentes, coagulato albumini ovi, in planum effuso, similes, & æque lacera-biles, esse solent. Vid. *Part. VII. Cap. 16.*

His patienter lustratis, ad contemplanda reliqua

viscera nos convertebamus. Hepar jam dixi sic intra costas delituisse, ut certo sensu pateret haud errasse *Hippocratem*, Hepar visceribus annumerando Thoracis. Permagnum autem ita erat, ut lobo majore cavum dextrum, a marginibus costarum inferiorum, ad altitudinem costæ octavæ, numero ab inferioribus inito, partemque cavi sinistri, expleret; minore vero lobo hypochondrium sinistrum ad arcum costarum usque, occuparet. Bilem vesicula copiosam satis, probeque tinctam, continebat.

Sub lobo minore Jecoris ventriculus, integræ manus magnitudine, a sacco duro complicabatur, ut modica tantum cavitate gauderet. Postque & sub eodem, lien non magnus, spinæ dorsi, quam arcui costarum, proximior. Lienem hoc loco sæpe inveni: ut dolores tumoresque lateris sinistri externo tactu patentes, perceptive, sæpe perversè Lieni adscribantur.

Intestina omnia ab incumbente sacco compressa valde. Colon ab origine arctum, parvis scybalis plenum, sinistro in hypochondrio ante ventriculum triplo amplius, denuo valde contractum inferiora petebat. Nulli in intestinis Vermes.

Cor cum pericardio bonum. Nunquam vidi pericardii extimam membranam pluribus majoribusque scatentem vasis. Cor sinistrum grumosi sanguinis multum, dextrum plurimum habuit.

Pulmo dexter omni ex parte a Pleura liber: sinister undique membranaceis productionibus, haud facile dilacerandis, cum pleura connascebatur.

Itaque vidimus Puellam tantis cum malis, vultu, oculis, viribus, respiratione, appetitu, catameniis, optima sanitatis indicia præbuisse, ad paracentesin septimam usque. *Clariss. Bianchi, Taurinensis Professor*, ejusmodi in morbis bilem scripserat aut nullam esse, aut aquosam inertemque. Hic non ita; nec

nec ita in pluribus hydropicorum cadaveribus apprehendi; ut saltem Viri clarissimi non sit universalis observatio. An bona Puellæ bilis ad tantam tot functionum contulit præstantiam? Plausibile hoc foret, nisi prioribus hujus operis Tomis cum bona copiosaque bile, has functiones languidissimas esse deprehendissemus. Vide de his plura *Tom. I. cap. 31. a pag. 299. ad 303.*

Familiale est in feminis, quæ peperere, systema uteri universum hujuscemodi morbis affici: incommoda graviditatis, inflammationes a difficili partu, a lochiis retentis, generare talia solent; sed in in-nuptis, in honestis, castisque puellis, rariora longe deprehenduntur: fieri tamen quoque in hisce, & præsentis exemplo, & aliis in *Part. hujus Operis sexta, pag. 109. § 113.* relatis, constat.

Vermium symptomata in vita passa puella non est: vermem unicum in morbo excrevit, postea nullum; quod, propter conspecta, & accurate examinata a Medico excrementa, certo novimus: nec vermis ullus in cadavere reperiendus fuit. Exemplum sic haberetur *Solitarii* lumbrici teretis, ut datur tenia *Solitaria*. At vero ut teretium raro solitarium esse numerum novimus, ita & teniarum non solitaria-rum, sed complurium, exempla nobis ex variis Au-toribus collegit *Ill. L. B. van Swieten Tom. 4. com. Cap. de morb. infant.* Et in cane Auditoribus meis illos numero xij. demonstravi. Et proferam deinde historiam integrarum teniarum numero octodecim, quam femina emisit, necdum a symptomatibus ver-mium immunis: imo adhuc particulas teniæ excer-nens.

Sed putridum urinarum, verumque earundem al-cali, qua cretum origine, qua arte ablatum est? Putrida materies ex sacci plaga quadam resorpta in-tra sanguinem, olim mox a bona Natura ad renes

demandabatur: ita ut sanguis continuo se per renes expurgaret ab eo, quod esset resorptum. Hinc eodem tempore appetitus, vires, menses, somnus, morus, veluti illibatae sanitatis. Præstitisset nihilominus putridam non adfuisse fomitem, qui metum perpetuum incuteret, ne, aucta ea, penitus corrumpere dissolverenturque humores. Interim corticis Kinæ requisita dosis, una cum acido potu, videtur progressum corruptionis stitisse, eandemque jam factam minuisse sic, ut posthac multa de se signa præbere, nisi vita ad metam properante, non potuerit. Egregia exempla Nosocomium vidit putredinis humorum in maculis rubris, purpureisque, cutis, & in mictu cruento malignorum morborum, quam feliciter stiterit, Cortex. Videtur sane in hac morborum malignitate putridum omne ex ignoto fomite sic a sanguine versus cutem, renesve, determinari, ut primo saltem tempore, humores universos corrumpere nequeat: ne autem corrumpat demum, Medici Peruviano cortice prævertere conantur.

§. VII. Longus fui, sed longus esse debui, in referenda varii Hydropis historia; morbi quippe formidolosi, ac toties eo citius letiferi, quo studiosius eidem medicari fueris annis. Equidem ego in eodem pertractando semper multus, communemque olim Praxin secutus, in specie morbi quacunque, quibuslibet selectioribus remediis, & si mitiora haud opitularentur, generosioribus, aquas pellere conatus sum: hoc vero incassum tentato, ad Paracentesin, ægris si vires necdum confractæ essent, tandem confugi. Quin etiam ipsam hanc Paracentesin, etsi hominem non curaret, nihiloscius laudabam, ut quæ alias imminens brevi interitum procrastinaret. Nunc vero in Praxi me quodammodo confescentem, ipsoque propterea usu rerum tutiora e-

doctum, Palinodiam canere, ac vulgari praxi renuntiare, monet, jubet, urgetque, proximi salus. Porro ut hujus mutatae sententiae rationes exponam, necesse erit omnes Hydropis species, seorsim singulas, suo in ortu, suo in progressu, suo denique in fine, mature examinare.

Quinque Hydropis species enumerare Medicina solet. 1^{am} Hydropem intercutem, quem & αἰνὰ σαγὰ vocant. 2^{dam} Hydropem Asciten. 3^{tiam} Peritonaealem. 4^{tam} Cysticum, seu saccatum. 5^{tam} Tympanitidem.

I. Hydrops intercus, qui aquam, aliquando gelatam materiem, imo & nonnunquam quid aërei intermistum habet, cum consuetis artis auxiliis semper tractandus sit, nos hic morari non debet.

Altera species, Ascites, nos aliquantisper detineat oportet. Aquarum moles est, in ventris, seu Peritonæi, cavo collecta. Hanc adesse novimus, causarum præcedentium primo gnari, Hæmorrhagiæ, Potuum aquosorum ingluviei, Spirituum abusus, Colicæ Pictonum, Acutorum morborum male curatorum, aut non rite judicatorum, Febrium intermittentium, similiter se habentium, Urinæ parcioris, non auctis excretionibus aliis, Coloris, oculorumque, a priore statu sano mutationis, Chloroseos, &c. si deinde cum hisce tumor in Hypogastrio, & ad Ilia, si a Venarum Iliacarum inde nata compressione nonnullus observatur crurum tumor, si variato corporis situ fluctuationem quandam observat æger, si moles corporis sensim inde crescit, si vires, si vultus, si appetitus, si urinæ excretio, si menses in feminis profluvium, quocunque modo vitiantur, Asciten agnoscimus.

Si semper hi Ascitici se nobis principio examinandos sisterent, morbum paulo facilius sæpe agnosceremus, nascentemque felicius, atque crebrius, per-

sanaremus. Cum vero annosi, atque inveterati, sæpe nos primum adeant, fere immemores modi, quo ceptus morbus, quo cretus fuerit, minus profecto certam, minusque tutam formare Diagnosin possumus.

2^{do}. Si jam venter primo examine distentior est, frustra sæpe expectamus fluctuationem, Ascitis testem: Advertit jam *Duverneyus* junior hic, veluti in vesica aqua distenta nimis, fluctuationem non percipi.

3^{tio}. Idem clarus autor, &, si quis unquam, in diagnosi Hydropis cujuscumque sagax, & exercitatus, pro suo, quo erat, candore fatetur, se aliquoties in diagnosi deceptum fuisse, dum fluctuationem percepisse se ratus, nullam in cadavere aquam, verum intestina muco & aëre plena, deprehenderet.

4^{to}. *Sydenhamus* in suo *de Hydropes* tractatu testatur nobis & Asciten adesse suis ex signis creditum fuisse, & vel meras excrescentias carnosas, vel flatus adfuisse, qui mentirentur Asciten.

5^{to}. *Sepulcreti T. Boneti Tomus alter* plurima nobis exhibet variorum exempla morborum, quos exercitati etiam Medici falso salutassent asciticos, ipsiusque graviditatis: quam ego quoque a celebrioribus artis Antistitibus pro Ascite eousque tractatam vidi, donec in lucem prodiret vivus Hydrops.

6^{to}. *Refert Acad. Reg. Sc. Par.* anni 1732. & Hydropem salutatum quendam ventris tumentis morbum fuisse, & institutam quater, licet nullus unquam humor prodiret, Paracentesin: tumore interim universo a Rene sinistro 35. Librarum pondere gallico, & paucula aqua, quæ fluctuationis sensu Medicis imposuerat, oriundo. Similem utcumque historiam Renis prioribus in Tomis retuli.

Tertia Hydropis species ea est, quæ inter Peritonæum,

næum, & Abdominales musculos colligitur; & *Hydropis Peritonæalis* nomine venit. Hujus signa Diagnostica minus evidentia esse apparent, quam vulgo credunt, & statuunt.

Egregius *Littræus*, cui in hisce, aliisque, multa debemus, regulas quasdam *Ac. R. Sc. Par. an. 1707.* condidit, quo fiamus præsentia hujus morbi certiores. 1^{mo}. *Si Hydropis hæc species non nisi plurium annorum spatio (plusieurs années) formata fuerit, & progressum, maxime in initio, lentissimum fecerit.*

Sed & Cystici Hydropis lentissimum incrementum quandoque est. Mulier, §. III. hujus ejusdem Capituli, quinquennium numerabat, ex quo intumescere cepit abdomen, paulatimque sibi augescere visum fuit. Constitit autem manifesto eandem non Peritonæali, sed Cystico laborasse hydrope: e contrario *Chomel, Acad. R. Sc. P. anni 1707.* Peritonæalem Hydropem puerperæ refert, intra 15. dies, a suo principio numeratos, ita crevisse, ut venter æque jam esset, quam ante partum, tumidus. Ergo regula fallit, cum idem lentoris incrementum morbi & in quarta ejus specie obtineat, & ipsum hoc signum in eadem specie desit.

2^{do}. *Si & circumscriptus tumor est, & tumoris figura mutato corporis situ, vix mutetur.* *Camerarius* Pater tamen, & *Drelincurtius*, & alii complures, tumorem circumscriptum, acuminatum, divisumque; suis in ægris non invenerunt, sed ventrem æqualiter tumidum. Præterea ovarii cysticus Hydrops, dum ventrem nondum integrum mole sua explet, circumscripti tumoris externi figuram habet, tactuque percipitur circumscriptus: quod si simul Peritonæo accreverit, ut pluries vidi, situ corporis mutato, non ipse mutatur. Ergo & hoc alterum signum Hydropis Peritonæalis fallit.

3^{tio}. *Littræus vult ut in conscripto tumore fluctuatio;*

extra limites vero ejusdem nulla perceptio fluctuationis sit.

Attamen *Nuck*, *Hochstetter*, *Camerarius* Pater, negant omnem Peritonæalis Hydropis fluctuationem; saltem *Nuckius* absentiam fluctuationis inter bona signa connumerat.

4^{to}. *Si crura aliæve corporis partes non extumescent, nisi provecto jam multum morbo.* Quamquam plures ita censeant, dico tamen primo *Gabrilipii* feminam ab initio tumidis extitisse cruribus: secundo, saltem hanc 3. speciem a subsequente 4^{ta}. non discriminari, in qua idem signum habetur.

5^{to}. *Si præter ponderis molestiam vix quid incommodi toleret ægrotans.* Pariter, ut ad præcedens, respondeo, & *Nuckii* feminam vehementer sitivisse, vehementerque potantem, urinam parce misisse; & iterum ob idem signum hanc speciem morbi non interstingui a specie sequenti, qui idem signum scribitur habere.

6^{to}. *Si mox a punctura, antequam aqua emittitur, sonda longa, per Cannulam induc̃ta, per omnem ventris capacitatem duci nequeat.* Verum idem vidi Chirurgos experiri in tumore quocunque Cystico, five minore, five etiam ventrem explente totum, quando divisus in partes, variaque loculamenta est. Dices forte instrumentum triquetrum in Hydrope Peritonæali mox penetrare in cavum; in Hydrope vero faccato longum emetiri debere spatium, antequam integumenta, musculos, Peritonæum, ipsumque penetraverit saccum, adeoque vel sic distinctionis haberi notam. Sed regero, experientia edoctus, instrumentum in gracili ventre, & sæpe gracili Cystidis plaga, mox penetrare, adeoque hoc ad distinctionem non sufficere. Vide quam tenuis cystidis membrana esset in *Historia Morandi* Ac. R. Sc. Par. anni 1719.

7^{mo}. Si per eandem sondam non eas percipiamus inæqualitates, quas intestina, cæteræque formant abdominis partes. Hoc signum aliquid probaret, nisi saccos inveniremus tenues, ac fere politos interna sua superficie, in quibus proinde idem sonda doceret.

8^{vo}. Si post Paracentesin paucum admodum aquæ in cavo restitaverit. Sed vix remanere quidquam in Ascite, & in Cystico, aliquando deprehendimus.

9^{no}. Si post educ̄tas aquas resupinato corpore liquor per cannulam injectus, per eandem extemplo exsiliat. Idem in Cystico adverti.

Cum præter hæc novem, alia signa apud Autores non enumerentur, hæcque ipsa fallacia esse demonstrantur, imo hanc speciem morbi cum subsequente confundant, concludi fas est, Diagnosin Hydropis Peritonæalis incertam admodum esse.

Quamquam autem novem tantummodo signa, ut mox dixi, eaque incerta valde, enumerari soleant, an decimi signi loco numeranda non esset iniqua sexus feminei fors, in quem fere unicum hæc Hydropis species cadat? Quantum enim pro mea virili historiam medicam discusserim, necdum plus unico viro, quem invaserit, se obviam mihi fecit; scilicet *Abornii* Adolescens, cujus etiam meminit laudata toties *Morgagni* Epistola.

Hoc sic se habente, haud esset, Viro tumidum gerente abdomen, ulla fere unquam de Peritonæali Hydrope formanda suspicio. Sed undenam solis feminis familiaris? Legendus hic omnino est incomparabilis *Winslow* in *Acad. Reg. Sc. Par. an. 1741. a pag. 76. ad 80. & a pag. 234. ad 250. Edit. in 8^{vo}*. super durioribus atque rigidioribus Thoracibus, qui inferiores feminarum costas deprimendo, comprimendoque Hypochondria, ad hæcce, & alia pessima mala generanda, apti nati esse videntur. Sive enim inde compressa vasa lymphatica in nodulos, quos de-

texis

tegit Anatome, primo assurgunt, ac dein crepando hunc Hydropem generant; sive potius a tumoribus præ thoracum compressione in cellulositate natis, tandemque sic auctis, ut a Peritonæo muscoli abdominales secedant; Vasa lymphatica, a Peritonæo ad hos musculos pertinentia, rumpuntur, & sic lymphæ in hanc intercapedinem illapsa, eandem auget: abunde intelligimus thoracum pressione gigni hanc Hydropis speciem sæpe & posse, & debere. Præterquam quod, præter alias *Cysticorum* tumorum, de quibus mox, causas, etiam hac thoracum pressione eorundem ortus, atque progressus, haud difficulter intelligatur: qua de re legi meretur *Targioni Tozzetti prima raccolta di osserv. mediche*.

Describitur 4^{ta}. *Hydropis species, cystica*, seu *saccata*, dicta, quæ a variis ventris visceribus, partibusque, originem trahere suam potest.

Ac 1^{mo}. quidem ex Ovario alterutro, quod, quemadmodum pluries demonstravi, & in variis hujus operis partibus descripsi, vel magnam ventris partem explere, vel totum, potest.

Secundo, a Tuba alterutra: quemadmodum quoque antea descripsi.

Tertio, ab ipso utero, ut observarunt Autores.

Quarta ab Hydatidibus natis in Hepate insignioribus, Hepatis molem monstrose extendentibus; quales Auditoribus meis publice demonstravi: vel etiam ab Hydatidibus numerosissimis ex hepate, ex liene, ex utero, alioque quocumque viscere propululantibus, vel & inter omenti lamina, in Peritonæo, aut quoque in cavo Omentum inter, Peritonæumque, formato, inventis.

Signa Hydropis Cystidis nunc investigemus accurate. Ore omnium veluti scriptorum, *Mauchartus, Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 14.* & *Nuckius in Aden:* hæc signa collecta dederunt.

„ Quæ Hydropicæ, scribit *Mauchartus*, nec pal-
 „ lent, sed roseum potius genarum servant deco-
 „ rem, nec pedes habent tumidos, ut potius, aucto
 „ licet indies abdomine, gracilescant cum reliquis
 „ artubus & corpore: hæ si diu, absque notabili
 „ actionum læsione sarcinam hanc circumferant,
 „ appetitum habeant bonum, non admodum sitiant,
 „ nec tussiant, alvus autem faciat officium, urina
 „ naturalis sit, & moles abdominis nec purganti-
 „ bus, nec diureticis obediat, & præcipue malum
 „ a partu difficili, puerperio infelici, molæ gesta-
 „ tione, aut abortu ducat originem, nec signa Ca-
 „ chexiæ concurrant, Hydrope ovarii, seu Saccato,
 „ vel Cystico dicto, sæpe tenentur. ”

Et *Nuckius*: „ Ego, inquit, experientia didici
 „ illas, quarum facies colore grato est rosea, quæ
 „ satis bene comedunt, bibunt, alvum deponunt,
 „ urinamque sine notabili molestia excernunt, qua-
 „ rum corpora nec purgantibus, nec diureticis, nec
 „ diaphoreticis, multum auscultant, illas, inquam,
 „ ordinario affectu uteri, tubarum, vel ovariorum,
 „ laborare Hydropico, lymphamque peculiari sac-
 „ culo inclusam nulla arte curari posse. ”

Obiter advertamus scriptorum horum priorem de
 solo ovarii Hydrope agere, posteriorem de eo, &
 ovarii, & tubæ, & uteri: priorem malum deducere
 a partu difficili, puerperio infelici, molæ gestatione,
 aut abortu; non excludere tamen ab hoc morbo
 virgines bene menstruantes, quales vidimus, cum
 non dicat has *solas* affici, sed *præcipue*.

Advertamus secundo nullam in utraque hac de-
 scriptione fluctuationis fieri mentionem, quam, ut
 ut sæpe abest, obscuriorem ego deprehendi tamen,
 & *Clar. Targionius* in sua matrona invenit manifestam.
 Ergone & abest & adest, ut in Peritonæali? ob id-
 que nihil in Diagnosi juvat?

Si nunc animo perpendamus pleraque signa in hoc Cystico Hydrope veluti Diagnostica, imo Pathognomica tradita, convenire cum iis, quæ in Hydrope Peritonæali signorum Diagnosticorum, atque Pathognomicorum nomine cluebant, convincimur præter conjecturam, aut saltem præter probabilitatem, nihil reliqui fieri.

Sed ad alia quam plura attendamus oportet. Dantur *veri* Cystici tumores, dantur & *spurii*; & sic quidem, ut crebro signa nobis desint, quibus verum a spurio discriminemus, spuriumque a vero. Neque veluti gratis me hæc asserentem ii incusabunt, qui hac in re pluries se sua in praxi norint esse deceptos. Videantur quæ *celeberrimum Valsavam* observasse clarus per omnia referat *Morgagnus*. Tumido in vita existente abdomine, a morte tumor invenitur pondere 25. librarum, e mesenterio enatus, processibus suis Jecur & Lienem premens, infra cum tumido teste sinistro communicans, substantiæ cancerosæ.

Mulieri adest in vita ingens medio in ventre tumor: in denata illius basis invenitur ad mesenterium, ipseque cum colo unitus, hic firma, ibi mollior. *Marcellus Donatus* ejusmodi tumoris meminit, pure repleti.

Post tumidum admodum in vita ventrem, tumorem cadaver exhibuit prægrande hominis caput æquans, is natus ex uteri postica parte, carnosa substantia durior, duos in saccos divisus, quorum alter vacuus, sevo alter plenus. Primum liber tumor, postmodum utpote cum vicinis concreescens, immobilis fuerat.

Tumor ingens, immanis, totius non Epigastrii, quod notandum, sed Hypogastrii, sæpius de die variæ magnitudinis, diu ægrum torquet. Invenit *Valsalva* molis ingentis ventriculum locatum in Hy-

pogastrio. Similem refert *Mangetus* Anatomien. *III.* *Morgagni* immensum talem ventriculum deprehendit, qui etiam vacuus, vix a pubis distaret ossibus. *III.* *Macneven* o *Kelly* ab *Agrim* in *Diff. de raro Ventriculæ casu*, 1760. edita, ventriculum demonstravit, Scirrho Pylorum fere obturante, eam in molem amplificatum, ut, sacci instar, universum abdomen exple-ret, suoque fundo inter Rectum atque Vesicam sese insinuans, causam tenesmi extitisset, frequentisque stranguriæ. Ingens adeo hic ventriculus erat, ut, referente Clarissimo Autore, „ filum arcui majori „ circumductum, antequam evacuaretur, ulnam „ *Bohemicam*, cum tribus quadrantibus & duobus „ pollicibus, æquaret: minor arcus tres daret ulnæ „ quadrantes cum uno pollice. ” Et, quem apud *Riverium Antissiodorensis* Medicus *Jodon* describit, ventriculus, quantane mole ventrem extenderit, qui nonaginta librarum pondere liquidum intra sese comprehendere, inventus est? *Moinichenius* Ventri-culum vidit sic universum explentem abdomen, ut coöperiret intestina omnia. Profecto similes tumo-res, antequam ventrem penitus impleant, Cystico-rum more se habere, nobisque imponere possunt; & grandescentes demum sic, ut & expleant totum ventris cavum, & liquore turgeant, fluctuatione sua Asciten mentiri queunt.

Intestina concreta mutuo inter sese, ac congloba-ta, sensum tumoris inæqualis saccati Medicis exhi-buerunt. Monachus creditur Ascite mediocri labo-rare, una cum tumore forte cystico, quo pressio flatus per inferiora excludebantur. In cadavere in-venitur tumor a conglobatis intestinis tenuibus & partim quoque crassis, ope crassorum atque cartila-gineorum ligamentorum. Qui hanc Historiam refert *Morgagnus*, addit se in alio principium hujus tumoris una cum Ascite invenisse. Anni sunt 23. quod pu-blicæ

blicæ lucis fecerim historiam feminæ, cui Paracentesin tres Medici feceramus, veluti Hydrope Cystico laboranti; in cadavere invenimus ope Omenti monstrosi, geminos digitos crassi, Ventriculum, Jecur, Colon, Jejunum, Duodenum, in unam veluti fasciam coivisse & concrevisse. Rubellus liquor, quem pondere 16. vel 17. librarum Paracentesi eduxeramus, & qui integro triduo post hanc foramine extillaverat, in unico ventris cavo, quod in sinistro latere inveniebatur, non saccato, hæserat.

Cysticum tumorem mentita vesica urinaria est, quam *Ill. Morgagni* invenit immensam in bursam esse amplificatam, ac Peritonæo connatam: ex vesicæ quippe orificio corpora quædam alba excreverant in vesicam; unde perpetuum quidem urinæ stillicidium, sed etiam urinæ plurimæ diuturnior in eadem mora: quo sensim factum, ut in stupendam hanc molem Vesica excrevisset, in parietibus suis digito crassior. In *Boneti Sepulcreto* tumor ventris ingens, isque Cysticus, reperitur, ab abscessu ingenti, inter Vesicæ tunicas anteriores oriundo.

Part. IV. Rat. Med. demonstrationem publicam communicavi Jecinoris atque Lienis, substantiæ quidem optimæ, sed molis adeo incredibilis, ut viscera hæc utraque universum ventrem, Hydropis saccati modo explerent, parva modo parte versus pubem excepta.

Part. VI. exhibui immensæ molis omentum, omnia explens, & universa abdominis viscera fere obvelans. Similia & *Ruischius* descripsit.

Ren invenitur apud *celebr. Morgagni* cujus portentosa mole cuncta ventris viscera premerentur in Peritonæum. Medici *Parisienses* homini cuiquam tentaverant quater ventris aquas Paracentesi educere; nec eduxerant quidquam. Ren demum in cadavere

invenitur 35. librarum Gallicarum. Semel quoque ejusmodi Renem publice demonstravi.

Uterus, vel in cavo suo hydropicus, vel pure, ichore, scirrho, in substantia sua horrendæ molis, aut graviditatem mentitus sæpe est, aut Hydropem. Omitto tumidos ventres a vermibus, ab Aneurismate, a systemate venæ portarum obstructo, &c.

Sed & ipsa ovaria, ut ut Hydropem cysticum verum formant, ita non minus frequenter spurium, ut ante jam monui; utpote aut pro majore parte, aut tota, sive atheromatosa, sive steatomatosa, sive cartilaginea, sive scirrhusa, sive cancrosa, &c.

Ex quibus omnibus mature consideratis sponte, opinor, liquet, & Diagnosin 3. & 4. speciei Hydropis plerumque dubiam haberi, & Paracentesin, rariore quidem casu proficuum, plerumque vero aut periculofam, aut letalem esse.

Quinta Hydropis species est Tympania. Tumor scilicet ventris natus ut plurimum ab aëre & materia chylosa, mucosa, stercorea, ventriculum & intestina vehementer extendente. Negandum tamen non est constituisse experimentis, quæ rite capta suppono, rarissimis tamen, Tympanitidem nasci posse, si aër Peritonæum inter ventrisque viscera contineatur, aut si aër & intestina distendat, & ventris cavum, aut si & aër simul & aqua cavo in ventre reperitur, aut denique aër intestina tumefaciat, & aqua abdomen.

Signum 1^{um}. Tympanias Medici ponunt ventris minorem, quam in Ascite, tumorem: hoc signum fallax esse demonstravit Tympaniticus, cujus historiam dedi *Part. 2. Rat. Med.*

2^{do}. Ajunt fluctuationem non percipi. Hoc certe non ita generale signum est, quin candidus *Duvernèyus* junior fateatur se aliquoties deceptum fuisse, dum fluctuationem se percipere credidisset, & post-

liminio deprehendisset, loco lymphæ, aëre, ac multa glutinosa materie, repleta intestina fuisse.

3^{tio}. Sonitum Tympani madentis, aut obducti, statuunt Tympanitidis signum esse. Quanquam sæpe numero id verum est, fateri tamen debemus hunc sonitum, neque perraro, adeo esse obscurum, ut utrum adsit, nec ne, jure dubites. Symbolam tamen hæc tria enumerata signa conferunt, si cum hisce homo est ad stateram levis; cum e contrario in Ascite, & Hydrope quocunque alio, ponderis insignis ægri sint ob colluviem aquæ.

Verum neque hoc quidem ultimum citra exceptionem in diuturniore Tympanitide admittebat Vir præstantissimus, hac elapsa æstate nobis morte ereptus, *Werlhofius*. Et dum amplissima Tympaniticorum intestina *Duverneyus* crassa materie mediam partem repleta videret, an hoc signum levitatis ponderis admittere potuit? Ad rem hic *Morgagni*, „*Hur-*“, „*terus*“, inquit, in Tympanitico puero cum mira-“, „retur crassa præprimis intestina distenta adeo, ut“, „Colon sua mole jecinori vim attulisset, & fini-“, „strorsum compulisset, materiem intus invenit tan-“, „ta copia, quanta id facere potuerat, pultiformem,“, „spumescentem, & ex albo flavescentem: quæ res“, „in morbum, quem adstricta alvus comitatur, tunc,“, „opinor, maxime conjicienda est, cum aut paulo“, „antequam morbus evidenter inciperet, multa æ-“, „gri ingesserunt, aut non perpauca, postquam in-“, „cepit, porro ingerere perrexerunt.” Adeoque non erunt tales, ratione suæ molis, pondere leviores.

Et quoad penultimum, de ventre resonante; in *Casparo Lombria*, Patricio Veneto, *Ill. Morgagni* describit ventrem tumidum *Tympani instar resonasse*, dum tamen in Anatome „Venter aquæ foetidæ, ex“, „viridi flavæ, copiam habuit, quantam maximam“, „præter omnem modum distentus habere potuit.”

Nec

Nec modo aliquando deest hoc signum in tympania, verum etiam adest in Opistotono sic ut Aretæus Cappadox Lib. 1. de C. & S. Ac. cap. VI. illud inter signa hujus morbi diagnostica ponat: *περπετέες κοιλίην ἢ θώρακα . . . ὑπὲρ γαστρὸν ὑπὲρ τεταρτύνον, ἢ εἰ ὑπὲρ κροῖς, ἐνηχῆν.* Opistotonos autem nihil commune cum tympanitide habet. Sic ut etiam resonantia tympani non monstret perpetuo tympanias præsentiam.

Atque ita demum Hydropis, singulas suas in species divisi, signa tantum probabilia invenimus, quæ sane & alterum, & tertium poscunt, antequam quid certi aut statuamus, aut pronuntiemus, examen: quamquam & aliquando tunc adhuc hæsitare Medici prudentis sit. Quod enim centies olim, quod nostris toties contigit temporibus, ut Viris, vere in arte præclaris, hæc res turpiter imposuerit, idem & aliis, & nobis omnibus, potest contingere. Quare nihil indecentius turpiusque in Medicorum consilio est, quam quod suam quisque sententiam acriter, crebroque in aliter sentientes ignominiose, proferat ea in re, de qua nemo certitudinem, ad summum vero meram habeat probabilitatem. Exemplo nobis hic ipse sit præclarus *Morgagni* qui *Ep. A. M.* 39. in referenda consultatione quinque Medicorum, super tumido ventre *Rev^{mi} Brixiani* Antistitis habita, vel ob id solito longe diffusior esse videtur, quo discerent Medici omnes & in ægrorum salutem, & in mutui tutamen honoris, suam quique mentem, suam quique proferre sententiam. Dum ipse quartus perorans, suam sententiam dixerat, „ Veruntamen, „ addebat, non hæc a me dici, quasi aliorum sententiæ conjecturam præferrem meam, quam omnium judicio subjicerem, nihil ipse ut in re ardua, & præobscura, definiens, ideoque, nec „ quod aliis visum esset, contemnens.”

Diagnosi variarum Hydropis specierum plerumque incerta, incerta sæpe quoque prognosis erit; minus tamen crebro, quam diagnosi: sæpe enim calamitatem ægrotantium, vitæque discrimen, agnoscimus ex functionum læsione, cæterisque prognosticis signis, licet genuinam necdum capiamus naturam speciemque morbi.

De curatione nunc pauca videamus.

Ac primo quidem in ejus Hydropis cura, qui consultis cunctis experientiæ regulis nobis Ascites esse appareat, isque verus, cum alia quacunque specie non confusus; in hujus, inquam, cura, indicans, indicatio, & indicata, omnium optime invenientur in *Immortalis Boerhaavii Capite de Hydrope*: potissimum si una conferantur, quæ ex numerosis Autoribus, ac multiplici sua praxi & experientia, ad hoc caput, pulchro concinnoque ordine, *Ill. L. B. van Swieten* commentatus est: ea tamen lege, ut si æger ab auxiliis selectissimis non emendetur, imo pejoretur potius, serio perpendamus, num forsitan hydrops hic aut non complicatus sit cum alia ejus specie, aut inveteratior, quam ut solis internis levetur, abigaturque auxiliis.

De Paracentesi tunc deliberandum est, ne, si sit instituenda, ea demum ægro incurabili facto, in artis vituperium instituatur. Quæ si levet ægrum, rarius unica vice salutem affert, unde pluries repetenda est.

Novi equidem claros in *Anglia* Viros conatos fuisse, injectione in ventrem adstringente ac roborante, composita ex aqua Bristolensi & vino rubro, calide injecta, reditum præcavere aquarum post paracentesin, sed cum bona illorum venia necdum imitari illos ausus sum. In sua enim historia candide enarrant, ægram sub ipsa injectione, pungentes pectore percepisse dolores, perque omnia viscera lanci-

nationes, habuisse respirationem difficilem, pulsum vacillantem, redeuntem syncopen, aphoniam: quæ profecto, licet ægra reconvaluerit, quam parum a vera morte abfuerint, cuique liquet. Quantane hinc inquietudo! Quanta, si mors sequeretur, Artis nostræ exsurgeret infamia! Si tamen exempla complura hanc curam confirmarent abunde, sequeremur eam audaciores. Solemus autem curarum eximiarum posteriores, quæ priores confirment, sæpe frustra desiderare repetitiones, ac si quapiam duntaxat fortuna prima vice contigissent: ad quod credendum eo magis adducor, quo crebrius viderim, quanti laboris sæpe sit in locis externis, v. g. in Tibia, sic vasa lymphatica constringere, ut nunquam ultro suam lympham effundant.

Quæ porro reliqua de Ascitis cura monenda sint, hæc in curatione cæterarum specierum sponte patebunt.

Quæritur igitur quænam curatio 2^{dæ} speciei Hydropis sit, scil. Hydropis peritonæalis?

Viri doctissimi, *Tulp*, *Van Mekeren*, *Nuck*, *Coster*, *Walæus*, commendarunt paracentesin. Censet *Nuckius* Peritonæum, lymphæeducta, brevi cum abdominalibus musculis coalescere, & ora vasorum lymphaticorum, ductuumque glandularum excretoriorum, olim abrupta, jam hoc coalitu Peritonæi cum musculis sic claudi, ut omnis sit ablata hydro-
pis causa.

Et hanc curam sese ab ipsa didicisse Natura quidam scribunt; contemplati in *Abornii* historia, *Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100.* quo pacto Natura bis exigua a se foramine facto levamen attulerit, felicem tertio sanationem, & quo pacto in femina, cujus causa *Gl. Chomel Act. Ac. Reg. Sc. ann. 1728.* suam dissertationem adornavit, Natura aperiundo umbilicum, Medicis ostenderit viam salutis: quomodo præterea

Doctiff. Brehm. Aët. N. C. Tom. IX. Obs. 79. feminam solo per umbilicum facto sponte, die alterno, sub alvi exoneratione, aquarum copiosissimarum effluvio, Natura curaverit.

Verum enim vero licet Natura aliquoties hac via attulerit salutem, intulit quandoque via eadem interitum, ut *Hagedorn in N. C. Cent. 2.* demonstravit.

Secundo, in laudatis hisce historiis, ita fortunatis, dubitatur, num revera, Peritonæalis Hydrops adesset?

Tertio, licet Natura sic revera hunc morbum curasse statuatur, hoc non impedit, quo minus Paracenteseos negotium magnis implicitum difficultatibus agnoscamus. Si præter aquam nihil vitii locus habet, fortunata aquarum eductio esse potest. Verum cadavera toties, post eductas aquas, tumores nobis revelant pravos, ulcerosos, cancrofos, quos occultaverat lymphæ moles. Hinc *Perill. Morgagni Ep. A. M. 38.* „ Ac priusquam, ait, a te suscipiatur æger, exquiras diligenter velim, num durities, aut tumor aliquis antea fuerit, quem nunc, magna abdominis extensio occultet: præterea, num dolor, non eum dico, quem ipsa illa distensio parit, sed ulcerosus, testis erosionis, ægrum torqueat, aut certa aliqua in parte arctius a te contrectati abdominis excitetur.” Ratio cur Paracentesis tunc nedum juvet, sed mortem præcipitet, aër est, qui putredinem accessu suo exulceratis affert partibus: imo & absque accessu aëris paracentesis non levat, eo quod exulceratæ partes pergant more suo corrumpi, augeri, quodque ex erosione, apertisque lymphaticis vasis, scaturigine scilicet prioris hydropis, novus hydrops regeneretur. Equidem Autores nonnulli methodum commendaverunt ejusmodi exulcerationes depurandi & curandi, verum quid de ea cogitandum sit, mox patebit insequentibus.

Pro-

Profecto si ab una parte cum tentatæ curationis periculum, tum acceleratam ab illa mortem, intueamur; ab altera vero parte morbi sibi demissi cum tolerabilitatem, tum etiam diuturnitatem; ne quam curam unquam, siue in hac, siue in sequenti specie, suscipiamus, facile persuademur. *Tulpii* femina, cujus mortuæ venter 110. libras aquæ inter Peritonæum & musculos gerebat, tulit hoc malum integro generosa septennio, sic, ut potuerit, perinde atque sanissima, deambulare, peregre proficisci, imo & *Cliviensium* conscendere turrim. Femina *Brehmii* morbum tulit 14. annis. Virgo *Munnickii* annorum 18. spatio. In *Actis Anglicanis* mulier alia morbum 30. annis tulit, alia annis 44.

Consideranda 3^{tio}. Hydropis, quem saccatum ajunt, cura. Et Paracentesi hanc perficiendam esse Medici arbitrantur: quin & nonnullæ enarrantur, paucae tamen, curationis ejusmodi fortunatæ. Vid. laud. mox *Act. Ac. Reg. Sc. ann. 1728*.

Verum enim vero, cum antea constiterit, quam difficulter diagnosi vera hujus morbi capiatur, cumque ab altera parte laudatæ curationes sanitatem reddentes, num res ita se habuerit, anatomica demonstratione haud potuerint evincere, curationes eadem id non probant, quod earum intendunt Auctores.

Alios proinde consulamus. Egregius *Duverney* junior, in *Actis iisdem anni 1707*. multus est in docenda arte ea, qua, post Paracentesin, ope injectionum, saccorum exulcerationes depurentur, postea etiam comprimantur ac vinciantur, ipsique si adsint tumores, incidantur, suppurandoque consumantur. *Acad. Chir. Reg. Par.* in suo altero tomo consimilia suadet.

E contrario 1^{mo}. innumera exempla monstrant, præter eum, quem pertuderis, saccos dari plures:

fic ut vel aqua, vel pure, vel glutine, ex sacco uno educto, & alii & complures, sacci adsint, qui nihil communicantes cum priore, minime concidunt; interea dum aër in aperto priore omnia disponat ad corruptionem.

2^{do}. Plures etiam si pertundantur Cystides, quid demum id proderit? Scimus enim sepimentis, inter sese neutiquam communicantibus, suam singulo in sacco contineri, ut plurimum, materiem: unde non raro a paracentesi vel nullus, vel parvus admodum materie effluxus.

3^{tio}. Et unicus modo sacculus sit, isque sepimentis non divisus, quid inde? Certine sumus, si ille aut nihil, aut partim tantum, cum peritonæo concrevit, nec Omentum interesse, nec intestinum, quod infeliciter forte pertundatur? Aut possumusne asseverare de aperto sacco non effluxuram in cavum ventrem materiæ corruptæ portionem, quæ letum inferat brevi?

Imo evitari se hoc ajunt posse, feminam locando in ventrem pronam, quo totum cystidis pondus in Peritonæum gravitet. Verum *Ill. Morgagni* id principio possibile quidem esse concedit, minus vero, quando sacculus nunc ab evacuatione flaccidior, minus apprimitur ad peritonæum: neque etiam hunc effluxum tunc impediri, quando filamenta in liquore natantia cannulam obturaverint, liquore tunc juxta cannulam in ventrem transsudante. Et demum aër, quacunque adhibita cura furtive intrans, sacco minabitur gangrænam. Quotiesne præterea sacculus pauculorum spatiorum dierum æque, atque antea turget, & pejorem sequenti Paracentesi materiem fundit? Frequenti enim cadaverum apertura didicimus collabentis sacculi aperturam coire, ut ex eodem denovo repleto nihil in ventrem effundatur: fin autem quandoque non coiverit, ut perpetuum fiat corrup-

æ materiæ in ventrem stillicidium, sicque iterum ob aliam, quam hucusque exposui, causam ægra pereat necesse est.

Sed cannulam, inquiunt, in apertura relinqueamus, ut faccus continua novæ materiæ evacuatione, concidat tandem, materieique, sacci collapsu, coa-lituque, scaturigo annihiletur. Respondeo, ut olim, ita & nunc, cannulam irritando, aëremque continuo admittendo, gangrænam mortemque accelerare; ut allato superius exemplo in nostra puella constitit.

Hinc necesse foret faccum posse consumi. *Lit-træus* quædam hunc in finem proposuit: *Cyprianus* etiam aliquid tentare ausus fuit, sed in occasione tam rarissima, ut mille, milleque Medici, eandem nunquam aut fuerint adepti, aut adepturi sint. Vide ejus tractatum impressum post Librum, cui titulus: *Belloste Chirurgien de l'Hopital*. Chirurgi Parisienses in *Actis Acad. suæ*, Ovarii exstirpationem audacter proposuerunt, eo quo brutæ femellæ castrantur modo, hæc autem, speculatione ingeniosa genita, non videntur per tot annos, qui exsequerentur, habuisse. Vide quæ *Part. IV.* de hac re differui.

Duverneyus tamen judicabat, eduçta materia, col-labi faccum, collapsosque inter sese coire parietes, eoque modo par feminarum se integræ reddidisse sanitati. Cum vero vixerint postmodum ambæ, neque apertæ a morte fuerint, de natura illarum morbi, incertam adeo diagnosin habentis, jure merito dubitamus.

Et quidni dubitemus? Ipso scilicet hoc claro Autore sponte, & ingenue, fatente: „ Je n'en ai „ point vu guerir: au contraire plusieurs femmes, „ qui jouissoient d'une assez bonne santé, & qui „ n'avoient point d'autre incommodité, que celle de

„ porter un gros ventre, font péri en peu de tems,
 „ pour avoir voulu s'en defaire.”

Nec *Nuckii*, licet speculative Paracentesis proposuisset, alia sententia fuit, eas nempe, quæ Cystico Hydrope laborarent, nulla arte curari posse, candide asserentis. Adstipulatur *Targionius*.

Nullane igitur in Cystico Hydrope paracentesis locum habet? Nullane auxilia alia? Quod *Duvernèyus*, & *Nuckius*, & *Targionius* mox, idem ego, idem mecum complures testantur; omnes scilicet feminas, quibus, in hac morbi specie, aut instituta paracentesis fuerit, aut multa antihydrica remedia exhibita, morbum brevi habuisse calamitosiorem, citiusque letalem.

Interim bonum vitæ regimen, nimique qui nocere posset, motus, nec non violentarum animæ passionum, sollicita evitatio; Diæta quoque salutaris, aërque salubris, conferent multum. Rifu crepuit Cystis in *Cl. Morgagni* Matrona, unde pessimus natus Ascites. Feminæ meæ, de qua *Part. IV.* a motu nimio per plateas, saccus crepuit, & funestus quoque sequutus est Hydrops.

Quid si probabilitas magna est & Cysticum Hydropem adesse, & Asciten? Servatis regulis generalibus, Paracentesis profutura videtur, ut saltem saccus, eductis aquis maiore libertate gaudeat. Quid de remediis demum internis? Si ceterum femina valet, abstineat ab illis; cum sive per diuresin, sive per alvum, sive per sudores, hæc agant, semper turbabunt corpus, alias bene se habens, & citra ullam sacci, extra leges circulationis hærentis, emendationem, vires ægræ frustra dilapidabuntur. Sin vero femina male habeat, palliative, pro re nata, adjuvetur.

Quintæ denique speciei Hydropis, Tympanitidis dictæ, curam, moderata frictione, medicamine at-

que

que alimonia vires restaurantibus, inertesque intesti-
norum fibras apte exstimulantibus, tentare solemus:
interpolamusque purgantia, quæ, dum in morbo
nondum conclamato, desides intestinorum fibras in
actionem cieant, aërem, contentamque in intestinis
materiem eliminando efficiunt, ut area morbi finibus
conscribatur arctioribus, atque ita morbi causa mi-
nuatur, ac forte tollatur. Cortex Peruvianus, qui
multos haud minus alvo laxat, quam viribus restau-
rat, addita frictione, affert aliquando plurimum
boni.



C A P U T XVII.

Anatomica quædam, & expositio Tabularum.

Viscerum, ac potissimum abdominalium, situm,
configurationemque, in singula cadaverum a-
pertura, ut Auditores mei accurate notent, hortari
soleo; ut exinde intelligant, quam crebro 1^{mo} vis-
cera hæc eum non occupent locum, quem vulgo
credimus eadem occupare. 2^{do} Quam sæpe contin-
gat, ut eorundem moles, longitudine, latitudine,
amplitudine, capacitate, connexionem, vel partim,
vel integre, aucta, imminutave, reperiatur. 3^{tio}
Quam fallax nostrum iudicium sæpe in morbis sit,
dum v. g. Hepar in dextro Hypochondrio quæri-
mus, ubi idem intra costas totum delitescit: dum
Hepar in dextro tantummodo latere locari arbitrati,
non raro idem vel totum Hypochondrium sinistrum,
vel magnam ejusdem occupare partem reperimus:
dum Hepar solito in loco esse creditur, idque tamen
invenitur a Diaphragmate ad Umbilicum, imo & ad
longe inferiora, ventrem occupare: dum splen in

extrema parte sinistri Hypochondrii, sub arcu costarum, quæritur; ubi interea sæpe aut nihil omnino infra costas eminet, aut versus dorsi spinam locatur, aut in abdomine infra Hepar depressus invenitur, aut intra lobum minorem Hepatis, jam maximum, involutus: dum dolente ægro in læva, atque media Epigastrii plaga, ventriculus accusatur, isque interea sæpe aut post jecur dorsum versus, aut post tympaniticum Colon, aut totus fere in dextro Hypochondrio, aut elongato Oesophago infra crassum Jecur ad umbilicum protrusus sive horizontaliter, sive etiam perpendiculariter locatus est, aut molē ingens totum sæpe Epigastrium sic implet, ut tangat utrinque infimarum costarum arcus, aut totus deprimatur infra umbilicum, aut tandem explet sic universum ventrem, ut aperto Peritonæo omnia viscera a Diaphragmate adusque pubem contegat: quam e contrario autem aliquando adeo parvus sit, ut vix uncias quatuor, tres, imo duas, capiat, & parvi contracti intestinuli formam habeat: dum intestinum Colon in colica accusamus, ubi illud in loco dolente minime jacet, & e contrario veri colici dolores iis in plagis hominem torquent, in quibus nemo fere Colon quæreret: dum ipsum hoc intestinum supra Jecur, Ventriculum, ac Lienem decurrens, imo cartilaginibus costarum spuriarum ac mucronata cartilagine tectum, aliarum potius partium morbos refert, quam suos.

Ipsa autem prava conformatio, quam pro parte jam in recensione loci, quem occupant, alieni, magnitudine aucta, minutave, vidimus, mirificum sæpe adspectum præbet, docetque homines multas causas proëgumenas morborum intra sese gerere, ut puta, Colicæ variæ, imo etiam Pictaviensis, Ileï, Tympanitidis, &c. quorum alii ejusmodi morbos pluries in vita vario perpetiuntur insultu, alii rarius,

alii vero nihil omnino: docet præterea morbos complures immedicabiles sæpenumero esse, quia eorundem causa prædisponens tolli nequit; Medici tunc esse, ut in causas evigilet excitantes, quibus averuncatis, haud raro Diathesis sopietur sic, ac si corpori non inesset. Tandem dum partium degenerationes, sæpe enormes, obfirmatas, ac proinde antiquas, eorum cadavera revelant, qui in vita sua signa harum degenerationum præ sese non tulissent, docet hæc eadem denatorum inspectio aut 1^{mo}. partes misere affectas, non quo loco hæreant, gignereque morbos debeant, sed in diffitis multum plagis seu nervorum commercio, seu quadam arcana lege, corpora lacescere: aut 2^{do}. grandes morborum causas Mortalium inesse Visceribus, quæ in actum prorumpant nunquam.

Discimus igitur ex his omnibus prudentiam in Diagnosi formanda: discimus cur sæpe eandemprehendamus fallacem: discimus Prognosin majoris quandoque non esse certitudinis, & proinde curam ea prudentia & cautela incipiendam, promovendamque esse, ut, quando auxiliorum admotorum effectus intentioni non respondent, imo morbum exasperant, serio inquireamus, an forsitan causa in his, de quibus hic sermo est, quærenda, reperiundaque non sit?

Tabulæ hic adpositæ multa eorum, quæ dixi, explanabunt. Sunt in iis, quæ ad varias historias hujus *Part. XI.* pertinent; sunt quæ minime: hæc prout sunt, repræsentabuntur, & explicabuntur; illa paginam libri notabunt, in qua historia eorundem enarratur.



T A B U L A I.

F I G U R A A.

Intestinum colon juvenis 18. ann. qui Hydrope Ascite, sed potissimum pectoris, & pericardii periit.

- A. Cæci amplus faccus.
- B. Flexus Hepaticus.
- C. Reflexus supra se.
- D. Tertius flexus.
- E. Quartus flexus.
- F. Quintus.
- G. Hucusque intestinum tympaniticum, jam post volvulum suum gracilescit, & format flexum Lienalem, flexum scilicet sextum.
- H. Flexus septimus, ab eoque ad renem pergit.
- I. Flexus octavus a rene ad latus abdominis.
- K. Flexus nonus.
- L. Flexus decimus.
- M. Saccus magnus tympaniticus.
- N. Principium Recti.

Juvenis hic triennio ante mortem Dysenteria laboraverat. An infirmatum inde Colon, in hæc degeneraciones abiverat? Intestinum, quo loco contractum, in eo crassum valde sua in substantia erat. Historiam reliquam ob sui mirabilitatem in aliam occasionem reservo. Cæterum morbi ex hac mala conformatione non extiterunt.

F I G U R A B.

Viri 26. annorum est, qui sex subsequens sibi annorum spatio febre, partim tertiana, partim quartana, laboraverat, a septem autem ultimis vitæ annis non amplius, sed quidem tussi frequentiore, ac semel Hæmoptoë; jam vero præter tussim quandam a biennio sanus, demum in febrim ardentem incidit, ejusque 21. die periit.

A. Flexus coli hepaticus.

B. Flexus lienaris, a quo usque ad C. tympanitica expansio.

C. Subita Coli contractio usque ad D.

D. Flexus iliacus, mox abeuns in tympaniticum saccum.

E. Subita & priore arctior contractio ad F. usque.

F. Tertius sacculus tympaniticus.

G. Contractio coli tertia brevissima.

H. Quartus tympaniticus sacculus.

I. Contractio quarta.

K. Rectum intestinum dilatatus.

Homo hic nunquam ventris incommodis, quantum ex tota anamnestica historia sciri potuit, laboravit. An forte puerorum juvenumque consuetudo, alvum cohibendi, occasionem formandorum ejusmodi sacculorum præbere possit? Sic ut loca fæcibus aëreque repleta, expandantur, & irritatio inde nata contrahat loca intermedia, non expansa?




FIG. C.

Colon intestinum pueri novennis spina ventosa pessima mortui.

- A. Intestinum cæcum profundis cellulis a parte externa incisum ita, ut fæces per angusta admodum spatia se penetrare debuerint.
- B. Appendiculus cæci.
- C. Flexus primus coli sub hepate.
- D. Flexus levis alter.
- E. Flexus tertius. Tumor intestini hic loci inter Hepar & Peritonæum extabat, & potuerat in vivente puero, ceu tumore magno hepatis existente, imponere, & pro dolore colico, hepatis fingere dolorem. Prætera Colon hic sæpe turgens, & hepar fricans, comprimens, ac veluti contundens, potuisset inflammationem, indurationem, scirrhum hepatis efficere.
- F. Flexus coli quartus. Locus, quem hic sub hepate ad usque F. & ab F. ad mediam partem spatii F. P. Colon occupat, cum sit intestinorum tenuium consueta sedes, imponere posset pro dolore colico iliacum mentiendo.
- G. Coli flexus quintus admodum altus.
- H. Sextus & septimus flexus parvus coli.
- I. Octavus flexus.
- K. Nonus ubi Rectum L. format.
- M. N. P. Hepar magnum, ad umbilicum fere per-
tingens, magnam quoque sinistri hypochondrii
explens partem. Igitur cum hoc frequenter je-
cur faciat, erramus dum hepatis morbos in dex-
tro duntaxat hypochondrio quærimus. Lien,
qui hic apte exhiberi non potuit, ingens quoque
erat, & digitum latum infra arcum costæ ultimæ
pro-

prominebat. Utriusque autem visceris bona substantia fuit.

D. Ventriculus sub hepate, infraque idem, fere perpendicularis, & ultra umbilicum extensus, si doluisset parte dextra sua, non fui, sed tenuium potius intestinorum dolorem mentitus fuisset.

F I G. D.

Intestinum Colon hominis sexagenarii, qui asthmate pessimo diu laborans, de futuro mox Paroxysmo, ex anxietate & dolore ventris, præmoneri solitus erat. Sed quod in ventre præsentiebat, non nisi causa excitans asthmatis fuit, causa prædisponente in Thorace abundanter inventa, de qua alia occasione.

- A. Cæcum intestinum tympaniticum.
- B. Intestinum Ileum contractissimum antequam in Cæcum abiret.
- C. Processus Vermicularis ad lacunar tympaniticæ cæci.
- D. Coli principium angustum, ad E. angustius, ubi sub sui portione F. G. decurrit.
- F. Circumflexio coli hic iterum dilatati.
- G. Reflexum colum angustissimum.
- H. Flexus coli hepaticus, qui jam tertius est.
- I. Brevis ultra I. Contractio firma coli notabilis. Ab I. ad O. colon est naturaliter expansum.
- K. Levis ejusdem descensus.
- L. Flexus lienaris.
- M. Flexus quintus.
- N. Flexus sextus.
- O. Contractio magna coli, brevis tamen.
- P. Dilatatio ejusdem.
- Q. Angustatio.

R. Dilatatio.

S. Angustatio.

T. Dilatatio.

V. Ejusdem denuo angustatio antequam in Rectum abeat.

Notemus hic maxime coli a K. ad L. adscensum supra jecur, id est inter jecur & peritonæum; ileique intestini ad B. coarctationem, & colique universi vicissitudinariam expansionem, & coarctationem. Cum enim æger futurum paroxysmum dolore & anxietate ventris præsentiret, eumque non eodem semper in loco: cum præterea æger nunquam diutius liber ab asthmate esset, quam alvo per epicrasin perpetuo soluta; an ergo colo toties a materia fæcali ad omnes has angustias irritato & convulso, asthma nervorum iterasset consensu? An idem irritatum ac tumidum, interque K. & L. inter peritonæum & hepar locatum, Hepar irritavit, quod certe *Doeberiano* experimento irritabile viscus est; hepar autem, diaphragmati connatum, ipsum diaphragma irritando paroxysmum genuerit? Aut potius colon inter K. & L. hepatis vim inferens, illud sursum trahit, sic ut diaphragmate irritato, & sursum pulso, cor & pulmones misere affecti redintegrarent paroxysmum?




FIG. E.

Exhibet Ventriculum, & intestinum Colon Juvenis, Ileo morbo defuncti: vide Cap. XV. §. I. ubi Morbus & Anatome describuntur.


A. Cæcum valde tumidum.

B. Colon a principio valde amplum, levem contractionem ad B. habet, ac toto suo transversocursu ventriculi basi incumbens.

C. Co-

- C. Colon adscendens circum ventriculum.
 D. Colon hic sub ventriculo ad œsophagum per-
 tingit.
 E. Idem a D. & ultra E. sub ejusdem portione
 C. D. comprimitur. In ipso cadavere C. D.
 multo magis supra D. E. extensum erat, & ven-
 triculus magis supra C. D. incumbibat.
 F. Angustius colon.
 G. Flexus paulo amplioris coli iliacus, isque to-
 tius coli tertius.
 H. Flexus quartus.
 I. Quintus.
 K. Sextus.

Hi tres flexus a sese versus latera reclinati repræ-
 sentantur, quo distinctius appareant: cæterum in
 cadavere supra se invicem positi erant, & crusta
 crassa flava inter se mutuo connexi, quæ eadem
 crusta partes C. D. & D. E. inter sese congluti-
 nabat. De causa Ilei morbi vide textum ipsum,
 Cap. XV. §. I.



F I G. F.

Intestinum Colon hominis, cujus morbus & A-
 natome Cap. XIV. §. II. habetur.

- A. Cæcum intestinum.
 B. Flexus coli primus.
 C. Colon compressum valde sub portione ejus E.
 D. Flexus coli secundus.
 E. Flexus tertius.
 F. Compressum iterum colon sub flexu D.
 H. Colon prope umbilicum, una cum ventriculo,
 hærebat; arctius autem multo contractum, quam
 vitiosa hic figura exhibet.
 G. Flexus quartus.

I. Flexus quintus.

K. Flexus sextus. Causæ hic apparent multorum in intestinis morborum, qui tamen in homine non affuerunt.



T A B U L A II.

FIG. I. II. III.

Notas hic adjicio nullas, siquidem eæ insertæ sunt in historia ipsa capitis XV. §. II.




FIG. IV.

Exhibet ventrem Hydropicæ feminæ cap. XVI. §. IV. cujus notas quoque singulas historia continet.






T A B U L A III.

FIG. I.

Exhibet Jecur, Splenem, & Colum intestinum Juvenulæ 28. annorum, ab ipsis incunabulis per omnem vitam valetudinariæ, quæ demum in sua secunda Hæmoptoë in Nosocomium deferrebat. Ab altera Hæmoptoës die dira Ophthalmia 67. diebus laboravit: a die 52. morbi, quem a secunda Hæmoptoë numero, usque ad 67. diem, cordis passa est palpitationes: a die 22. morbi, usque ad 93. diem febrim fere quotidianam, cum frigore diuturno incipientem: ab hoc vero die usque ad 154. diem

TABULA I.



diem, qui & mortis fuit, febrim hecticam quotidie exacerbantem, fere sine frigore: a frigore die morbi 93. cessante, diarrhoeam quæ ad mortem, 15. diebus exceptis duravit: a die 108. morbi, ad ipsam usque mortem, sputa aut semipurulenta, aut purulenta. Digna est historia, quæ integra alia occasione referatur, nunc tantum quæ ad rem præsentem.

A. Hepatis lobus major.

B. Lobus ejus minor.

C. Lien parvus seminudus hic sub margine costarum conspicuus.

D. Hepatis lobus minor, ab arcu lævarum costarum retroflexus & lienem intra sese comprehens, atque ad medium sub ventriculo epigastrium denuo pertingens.

E. Lien involutus totus reflexo jecinoris minori lobo.

F. Arcus punctis notatus, quo quidquid jecoris ac splenis infra marginem costarum eminuerit, notatur.

G. Intestinum cæcum, in sinistro Hypogastrio, eoque medio, locatum, quod fæcibus, flatibusque turgens, alvum cohibere potuit; potuit & vaginam uteri, uterum, & vesicam urinariam sæpe turbare. Potest Recti, Vesicæque dolores, validosque creare tenesmos, qui huic forsitan causæ minus adscriberentur. Equidem vix ejusmodi effectus inde ægra nostra passa est, ut sæpius malorum in corpore causæ existunt, quæ raro, aut nunquam, in effectum prorumpunt; prorumpere tamen possunt, ac sæpe prorumpunt.

H. Flexus coli primus. Notemus hic coli longitudinem, quod jam pedis, & ultra, absolvit longitudinem, antequam in aliis nasci soleat, quodque præterea duodecim suis flexibus multum

percurrit spatii. Sic ut, mensura capta, inventum fuerit hoc colon dupla fere parte consuetam excedere longitudinem. Potuisset tardior hinc alvus nasci, potuisset Colica frequens, eaque flatulenta, stercorea, Pictonica; potuisset Ileus in longo atque adeo tortuoso intestino facile oriri.

I. Flexus hepaticus.

K. Umbilicus hic notatur, ut iterum pateat colicos dolores ibi nasci, ubi eorum adesse minime creditur.

L. Colon hic præter naturam expansum, ut alibi præternaturaliter tenue.

M. Flexus lienaris.

N. Flexus quintus.

O. Flexus sextus.

P. Septimus.

Q. Octavus.

R. Nonus.

S. Decimus.

T. Undecimus.

U. Duodecimus.

W. Intestinum rectum.




FIG. II. TAB. III.

Exposita hæc est suo loco Cap. XV. §. III.



FIG. III.

Est intestinum Colon hominis quadragenarii, qui laborans carie antri Higmoriani, ex corrupto dente nata, quæ fundum orbitæ jam exederat, oculum-
que

TABULA II.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.





Fig. IV.



que totum de orbita extruserat, demum in Nosocomium venit, in eoque anno 1760. obiit. Notandum hic est virum hunc nulla incommoda ventris sustinuisse, alvum autem per omnem fere vitam singulo 3. aut 4. aut ultra die, eamque duram, scybalosam, tantum deponere potuisse, eoque modo eandem, mensis spatio, quo apud nos fuit, deposuisse.

AA. Inter duo AA. solum Cæcum intestinum est hic adeo dilatatum, & elongatum. Situs cæci usque in sinistrum hypogastrium productus, ut in Fig. I. hujus Tabulæ; verum non ita noxius intestino Recto &c. quia eo altior.

B. Processus cæci vermiformis.

C. Principium Coli intestini, ubi ingressus intestini Ilei in colon & cæcum.

D. Alter flexus crassorum intestinorum seu primus coli, hepaticus.

E. Flexus lienaris.

F. Reflexus in dextrum hypochondrium usque.

G. Flexus lienaris alter sub priore compressus.

H. Reflexus in superiora sub parte F. G., ut punctis notatur, ab eodemque valde compressus. Cellulositate fortissima ubique, & undique, hic flexus accretus erat, maxime autem ad superiora & latus externum Renis.

I. Reflexus coli versus inferiora.

K. Flexus ejusdem iliacus.


L. Flexus exiguus in superiora.

M. Ultimus flexus Rectum formans.

N. Rectum. Decem flexus numeravimus.

Thoracem primo aperientes, mirabamur diaphragma plurimum in sinistro thorace protuberare, sed postmodum tantam intestini reflexi toties molem intuiti, mirari destitimus. Ipsum hoc causa morborum in vitalibus partibus multiplicium existere posset, quos protopathicos falso crederemus.

An morbus aliquando incurabilis, in quo cum fervore quasi aquæ ebullientis, borborygmorumque sonorum, simili quandoque causæ tribuendus?



F I G. IV.

Ventriculus, Cæcum, & Colon, mulieris, cujus historia data *Rat. Med. Tom. II. Cap. XV. §. 1.*

- A. Ventriculus media sua sinistiore parte magnus.
- B. Idem ex magna amplitudine mox contractissimus.
- C. Pylorus. Via inter B. & C. paucillum aperta duntaxat, præ corrugatione villosæ maxime tunicæ.
- D. Duodeni principium.
- E. Cæcum intestinum cum inserto Ileo, & cum suo vermiculari processu: Amplissimum hoc, ut & coli principium.
- f. Flexus coli primus.
- F. Flexus ejus alter, hepaticus.
- G. Flexus tertius.
- H. Quartus.
- I. Quintus, lienalis.
- K. L. M. Ne figuram literæ turbarent, has tres a latere interno adscripsi: ab I. ad K. flexus sextus: ad L. hoc sic flexum intestinum, flexum suum, eumque septimum, continuando, sub se ipso decurrit, & ad M. emergit, & format mox flexum octavum.
- N. Flexus nonus.
- O. Flexus decimus.
- P. Ultimus.

Hic verum volvulum intestinale videmus, cujus tamen symptomata in vita non apparuerunt: quin imo laxior feminae alvus, pluriesque, etiam sub vitæ finem, diarrhœica diu fuit. Ubi tamen Ileus

lecta

Fig. I.

TABULA III.




Fig. II.




Fig. III.






Fig. IV.





letalis inde natus est, videmus fidem adhibendam Autoribus, qui tale quid se invenisse scripserint. Cur in cunctis his figuris, quasque habeo, aliis, longe frequentius est coli intestini adaucta moles & altitudo sinistrorsum, quam in latere dextro? An impediēte magna mole Hepatis, intestinum hoc flatu distentum, adeoque & ampliare, & elongare sese annitens, locum aptiorem nanciscitur, liene sæpe ab arcu costarum sinistrarum remoto, & ventriculo in sua inanitate minus hoc quasi vacuum replente? An ideo in sinistro Hypochondrio illa incommoda frequentiora, de quibus in Fig. mox hanc præcedente, sub finem, egi?



T A B U L A I V.

Intestinum cæcum, cum coli principio, hominis, cujus Tympanitidis atque Ilei morbi historiam dedi *Tomo I. Cap. XI.* Ob rei mirabilitatem totam intestinorum cum tenuium tum crassorum, molem servavi: cum autem in hac *XI. Parte* toties de Tympania & Ileo sermo sit, addo hic effigiem coli, & principii Ilei, eadem exacte magnitudine, non qua olim fuit; nam indies magis corrugatur, & plicatur, sed qua nunc est.


Quo quis de hac figura rite judicet, oportet cum recenti intestino candem conferre; exsiccatione enim multa mutantur. Figura *Tulpii*, & *Heisteri*, & *Morgagni*, exhibent intestinum recens, ut & illa magni *Albini Exerc. Acad. Tom. III. Tab. V.* quæ instar omnium est. *Bidloi* autem figura de inflato atque exsiccato intestino desumpta est. Mea est intestinorum morbo inflatorum, dein post exsiccationem cum spiritu Therieb. sæpe illitorum, contra teredi-

nem, quæ nihilominus pluribus in partibus hæc intestina jam corrodit.

In recenti intestino quævis statu naturali se habentes conspiciuntur partes: in inflato, atque exsiccato, plus minus degenerascunt. Sed ipsæ hæ degenerascentes partes rerum intellectum faciunt, illustrentque, ortum exhibendo, & nexum valvulæ, habernarumque ejus, & modum quo coli cellulæ formentur, ligamentorum rationem, decursumque: actum demum machinæ hujus admirandæ structuram, usumque capiemus, quando nihil ex recenti citra exsiccata, nihilque ex hac absque illa, concluderimus. Sed & ipsa, quam exhibeo, figura, in Pathologicis conferet ad explicandum vomitum, haud fæcum duntaxat, quæ, ut vidimus, ex ipso intestino Ileo prodire queunt, verum etiam clysmatum, atque suppositoriorum, quæ in Rectum intestinum immissa impositæ fuerant: tympanitica scilicet intestinorum dispositione, valvularum rictum ita distrahente, ut quæcumque in intestinis Crassis hospitabantur, commode nunc in Tenuia transeant. Quapropter haud absque ratione celeb. *Haguenotus Acad. Reg. Sc. Par. anni 1713.* censuit iteratis nimium Clysteribus, vix effluentibus, Colon, Cæcumque dilatari, sic ut valvulæ ora diducantur, formentque hiatum: id quod profecto in hujus morbi pertractatione summopere est attendendum. An in omni stercoreum cum Clysmatibus vomitu quid simile contingeret? Nunquid vomitus enematum, Colique fæcum, non fieret, minus expanso Cæco, adeoque valvula se naturali modo claudente? Verum contra, Coli valvulam, non expanso multum Cæco, superavit aqua in humano cadavere in anum injecta per Machinam Italicam. *Rat. Med. Tom. II. Cap. 23.* Ergone violentia jactus per hanc machinam exercitata, ea longe superior, quæ ab enemate, inverfo-

que

que Peristaltico motu fit, valvulam cedere cogit? Et an valvulæ resistantia tanta est, ut, sine violenta expansione Cæci ac Coli intestini, vi enormi hujus machinæ, ut cedat, indiget? Imo ut etiam bis validissimam ejusdem potentiam eluserit? Cæterum ut quæcumque partes musculosæ duplo, decuplo, uno, quam alio in homine valentiores ad agendum, resistendumque sunt, idem de nostra valvula statuamus oportet. Superari autem cum vitæ integritate posse, & exemplo eorum, qui olim post enematum vomitum in sanitatem redierint, & eorum hominum, canumque, qui aquam in anum injectam vomitu reddiderint, constat.



Explicatio Figuræ.

A. Fundus sacci Cæci.

B. B. Sacci dilatatio, cujus in maxima amplitudine diameter sex pollicum *Viennensium* est, qui faciunt *Rhenolandicæ* pollices sex, cum linea una & duabus tertiis; pollices *Parisienses* sex, minus duabus lineis; *Londinenses* sex cum tribus lineis; *Palma di Roma* octo & fere dimidium. Utor porro pede *Viennensi* perpetuo.

C. C. C. C. Ligamentum primum, & alterum, quod proprie unicum origine est, una cum tertio ligamento, dicto Mesocolico: etenim in parte averfa sacci Cæci, quæ hic demonstrari non potest, tria hæc ligamenta in hoc intestini cæci sacco una nascuntur, inque tria tunc dividuntur, quorum primum & alterum conspectui hic se offerunt, tertium Mesocolicum eadem, qua duo priora, origine natum, solitarium decurrit antequam Mesocolon intestino adnascitur, & non modo contrahit, sed efficit ut in interna coli parte striæ appareat, quæ ad Lit. D. vifitur.

D.

D. Ad hoc ligamentum valvula terminatur.

EEEE. Fenestra excissa ex cœco & colo, ut interiora pateant.

eeeeeeeeee. Circumferentia valvulæ coli magnitudinem, adeoque & veram amplitudinem intestini Ilei, cujus unius proles valvula est, determinans. Summa inferioris valvulæ partis altitudo est pollicis cum quatuor lineis, superioris autem est undecim linearum.

ffffffffff. Totidem frœna, seu habenæ, quæ valvulam moderantur.

G. Valvula ordinaria coli, quales numerosas, & aliquas hac duplo eminentiores, tria coli ligamenta, intestinum contrahendo, formant.

H. Hiatus tympaniticus valvulæ, dextra aspicientium parte paulo rotundior; læva, paulo acutior: in latitudine pollicis & octo cum dimidia linearum, in majore altitudine linearum septem.

I. Apertura Appendiculi vermiformis.

KKKKK. Colon intestinum hic adeo leviter contractum, ut inter primum alterumque ligamentum fere vesicam repræsentet, cum relictis tantummodo contractionis vestigiis. Cur tamen longe contractius est versus BB? Ill. Vir *Hallerus Elem. Phys. Tom. VI. pag. 143.* „Major, inquit, solet esse cellula, quæ inter nudum „anterius ligamentum est, & Mesocolicum.” Sed hic etiam inter ligamentum alterum, Omentale Illustri *Hallero* dictum, & Mesocolicum, sic se habet.

Locus Tabularum hujus Partis:

Prima respondeat.

Pag. 456

Secunda.

458

Tertia.

462

Quarta ponatur in Fine.

TABULA IV.

